

단원 형성 평가

1. 두 점 $A(-3, -5)$, $B(a, 1)$ 사이의 거리가 $2\sqrt{13}$ 일 때, a 의 값을 구하여라. [배점 3, 중하]

▶ 답 :

▶ 답 :

▷ 정답 : $a = 1$

▷ 정답 : $a = -7$

해설

$$\overline{AB} = \sqrt{(-3-a)^2 + (-5-1)^2} = 2\sqrt{13} \text{ 이므로}$$

$$\sqrt{9+6a+a^2+36} = 2\sqrt{13}$$


$$\text{양변을 제곱하면 } a^2 + 6a + 45 = 52$$

$$a^2 + 6a - 7 = 0$$

$$(a-1)(a+7) = 0$$

따라서 $a = 1$ 또는 $a = -7$ 이다.

2. 다음 그림과 같이 정사각형 ABCD의 각 변의 중점들을 연결하여 정사각형 MNPQ를 그렸다. 정사각형 MNPQ의 한 변의 길이가 3cm일 때, 정사각형 ABCD의 넓이를 구하여라.



[배점 3, 중하]

▶ 답 :

▷ 정답 : 18 cm^2

해설


$\overline{MQ}$ 의 길이가 3cm이므로

$\overline{MD}$ 의 길이는 $\frac{3}{2}\sqrt{2} \text{ cm}$ 가 된다.

그러므로 정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 $3\sqrt{2} \text{ cm}$ 가 된다.

정사각형 ABCD의 넓이는 $3\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = 18(\text{cm}^2)$

3. 다음 그림과 같이 대각선의 길이가 $3\sqrt{2}$ 인 정사각형 안에 내접하는 원이 있다. 이 때, 색칠한 부분의 넓이는?



[배점 4, 중중]

① $3\pi - 3\sqrt{2}$

② $3 - \frac{3}{2}\pi$

③ $9 - \frac{9}{4}\pi$

④ $9 - \frac{3}{2}\pi$

⑤ $3 - \frac{1}{2}\pi$


해설

대각선의 길이가 $3\sqrt{2}$ 인 정사각형의 한 변의 길이는 3이고, 한 변의 길이는 내접원의 지름과 같으므로 원의 반지름의 길이는 $\frac{3}{2}$ 이다.

따라서 색칠한 부분의 넓이는 정사각형의 넓이에서 원의 넓이를 뺀 것과 같으므로

$$3 \times 3 - \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} \times \pi = 9 - \frac{9}{4}\pi \text{ 이다.}$$

4. 다음 그림과 같이 모선의 길이가 20cm, 밑면의 원의 반지름의 길이가 5cm인 원뿔의 밑면의 한 점 A에서 옆면을 지나 다시 점 A로 되돌아오는 최단 거리를 구하여라.




[배점 4, 중중]

▶ 답 :

▶ 정답 : 20 cm


해설

전개도에서 부채꼴의 중심각의 크기는 $\frac{5}{20} \times 360^\circ = 90^\circ$,



최단 거리 $\overline{AA'} = 20\sqrt{2}$ cm 이다.

5. 다음 그림과 같은 전개도로 사각뿔을 만들 때, 이 사각뿔의 높이를 구하여라.



[배점 4, 중중]

▶ 답 :


▶ 정답 : $5\sqrt{2}$

해설


정사각형의 대각선의 길이는 $10\sqrt{2}$

$$h^2 + (5\sqrt{2})^2 = 10^2$$

$$\therefore h = 5\sqrt{2}$$



6. 다음 직사각형 ABCD의 두 꼭짓점 A, C에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 할 때, □AECF의 넓이는?



[배점 5, 중상]

- ① $\frac{8}{5} \text{ cm}^2$ ② $\frac{84}{25} \text{ cm}^2$ ③ 12 cm^2
 ④ $11\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ⑤ $12\sqrt{3} \text{ cm}^2$

해설

$$\overline{BD} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 (\text{cm})$$

$$5 \times \overline{AE} = 3 \times 4$$


$$\therefore \overline{AE} = \frac{12}{5} \text{ cm}$$

$$\overline{BE} = \sqrt{3^2 - \left(\frac{12}{5}\right)^2} = \frac{9}{5} (\text{cm})$$

$$\overline{BE} = \overline{DF} \text{ 이므로 } \overline{EF} = 5 - 2 \times \frac{9}{5} = \frac{7}{5} (\text{cm})$$

$$\therefore \square AECF = \frac{12}{5} \times \frac{7}{5} = \frac{84}{25} (\text{cm}^2)$$

7. 다음 그림은 정사각형을 두 개 연결해놓은 그림이다.
정사각형 ABCD의 넓이는 12cm^2 , 정사각형 ECFG의 넓이는 48cm^2 일 때, $\overline{BG}$ 의 길이를 구하여라.



[배점 5, 중상]

▶ 답 :

▶ 정답 : $2\sqrt{39}\text{cm}$

해설


정사각형 ABCD의 넓이가 12cm^2 이므로 $\overline{BC}$ 의 길이는 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}(\text{cm})$ 이다.

정사각형 ECFG의 넓이가 48cm^2 이므로 $\overline{CF}$ 의 길이는 $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}(\text{cm})$ 이다.

$\overline{BF} = 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 6\sqrt{3}(\text{cm})$, $\overline{GF} = 4\sqrt{3}(\text{cm})$

$\overline{BG} = \sqrt{(6\sqrt{3})^2 + (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{108 + 48} = \sqrt{156} = 2\sqrt{39}(\text{cm})$

8. 다음 그림과 같이 직육면체의 점 A에서 모서리 BC, FG를 지나 점 H에 이르는 최단거리가 $2\sqrt{58}\text{cm}$ 라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라.




[배점 5, 중상]

- ① 3cm ② 4cm ③ 5cm
④ 6cm ⑤ 7cm

해설

전개도를 그려보면



$$\overline{DH} = \sqrt{(2\sqrt{58})^2 - 6^2}$$


$$= \sqrt{232 - 36}$$

$$= \sqrt{196}$$

$$= 14(\text{cm})$$

$$\therefore \overline{AB} = (14 - 4) \div 2 = 5(\text{cm})$$

9. 다음 그림과 같이
모서리의 길이가 모두 8cm
인 정사각뿔에서 $\overline{VC}$, $\overline{VD}$ 의
중점을 각각 E, F라고 할 때,
 $\square ABEF$ 의 넓이를 구하면?



[배점 5, 중상]

- ① $11\sqrt{10}\text{cm}^2$ ② $12\sqrt{3}\text{cm}^2$
③ $12\sqrt{6}\text{cm}^2$ ④ $12\sqrt{11}\text{cm}^2$
⑤ $24\sqrt{3}\text{cm}^2$ ⑥

해설


$\overline{AF} = \overline{BE}$, $\overline{EF} \parallel \overline{AB}$ 이므로 $\square ABEF$ 는 등변사다리꼴이다.

$\overline{AB} = 8\text{cm}$, $\overline{EF} = \frac{1}{2}\overline{AB} = 4\text{cm}$ ($\because$ 중점연결 정리)

$\overline{BE}$, $\overline{AF}$ 는 한 변의 길이가 8cm 인 정삼각형의 높이이므로 $\overline{BE} = \overline{AF} = 4\sqrt{3}\text{cm}$

사다리꼴의 높이 $\overline{EH} = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 - 2^2} = 2\sqrt{11}(\text{cm})$ 이다.

$\therefore \square ABEF = (8+4) \times 2\sqrt{11} \times \frac{1}{2} = 12\sqrt{11}(\text{cm}^2)$




10. 다음 그림의 오각형

ABCDE 에서 $\angle A =$

$\angle B = 120^\circ$, $\angle C = 90^\circ$

$\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{DE} =$

$\overline{AE} = 6$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.



▶ 답:

▶ 정답: $18\sqrt{3}$

해설

$\overline{BC} = \overline{AE}$, $\angle A = \angle B$

이므로 $\square ABCE$ 는 등변사다리꼴이다.

점 A, B 에서 $\overline{CE}$ 에 내린 수선의 발을 각각 P, Q 라 하면

$\overline{CP} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ 이고 $\overline{BP} = \frac{\sqrt{3}}{2}\overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AE} = \overline{DE} = 6$ 이므로

$\therefore \overline{CP} = \frac{1}{2} \times 6 = 3$, $\overline{BP} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = 3\sqrt{3}$

$\therefore \overline{CE} = \overline{CP} + \overline{PQ} + \overline{QE} = 3 + 6 + 3 = 12$


따라서 색칠한 부분의 넓이는 오각형 ABCDE 의 넓이에서 삼각형 ACD 의 넓이를 뺀 값이다.

$\therefore \triangle CDE + \square ABCE - \triangle ACD$

$= \frac{1}{2} \times 6 \times 6\sqrt{3} + \frac{1}{2} \times (6+12) \times 3\sqrt{3} - \frac{1}{2}$

$\times 6\sqrt{3} \times (6+3)$

$= 18\sqrt{3}$



11. 원 O 에 내접하는 정팔각형의 넓이가 $32\sqrt{2}$ 일 때, 원 O 의 반지름의 길이를 구하여라. [배점 5, 상하]

▶ 답:

▶ 정답: 4

해설

원의 중심 O 에서 정팔각형의 이웃하는 두 꼭짓점에 선을 긋고 각각 A, B 라 했을 때,

$\angle AOB = 360^\circ \div 8 = 45^\circ$ 이다.

또 점 A 에서 $\overline{OB}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하면

$\triangle AOH$ 에서 (반지름의 길이) : $\overline{AH} = \sqrt{2} : 1$


$\therefore \overline{AH} = \frac{(\text{반지름의 길이})}{\sqrt{2}}$

반지름의 길이를 r 이라 하면, $\triangle AOB = \frac{1}{2} \times \overline{OB} \times \overline{AH} = \frac{1}{2} r \times \frac{r}{\sqrt{2}} = \frac{r^2}{4} \sqrt{2}$

따라서 정팔각형의 넓이는 $\frac{r^2}{4} \sqrt{2} \times 8 = 2\sqrt{2}r^2 = 32\sqrt{2}$ 이므로

$r = 4$ 이다.

12. 다음 그림과 같은 전개도를 가지는 삼각뿔의 부피를 구하여라.




▶ 답 :

▷ 정답 : 6


해설

$3^2 + 4^2 = 5^2$ 이므로
 $\triangle ADB$ 와 $\triangle BEC$ 는
 $\angle ABD = \angle CBE = 90^\circ$
 인 직각삼각형이다.



$$\begin{aligned} (\text{삼각뿔의 부피}) &= \frac{1}{3} \times \triangle ABC \times \overline{DB} \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 3^2 \times 4 = 6 \end{aligned}$$

13. 다음 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 4cm 인 정사각뿔에서 P, Q 는 각각 $\overline{OC}$, $\overline{OD}$ 의 중점일 때, $\square QABP$ 의 넓이를 구하여라.



▶ 답 :

▷ 정답 : $3\sqrt{11} \text{ cm}^2$

해설

$\square QABP$ 는 $\overline{QP} \parallel \overline{AB}$ 인

사다리꼴


$$\overline{QP} = \frac{\overline{AB}}{2} = 2 \text{ (cm)}$$

$\triangle PHB$ 에서 $\overline{PB} =$


$$2\sqrt{3} \text{ (cm)}, \overline{HB} = 1 \text{ (cm)}$$

$$\therefore \overline{PH} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 - 1^2} = \sqrt{11} \text{ (cm)}$$

$$\square QABP = (2 + 4) \times \sqrt{11} \times \frac{1}{2} = 3\sqrt{11} \text{ (cm}^2\text{)}$$



14. 다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 12cm 인 정사면체 안에 정사면체의 4 개의 면에 접하는 구를 O 라고 하고 사면체의 3 개의 면에 접하고 구 O 와 외접하는 구를 P 라고 할 때, 구 P 의 부피를 구하여라.



[배점 6, 상중]

▶ 답 :

▷ 정답 : $\sqrt{6}\pi \text{ cm}^3$

해설

구 O의 반지름을 r , 구 P의 반지름을 r' 이라고 하면 점 H는 $\triangle BCD$ 의 무게중심이므로

$$\overline{DH} = \frac{2}{3}\overline{DM} = \frac{2}{3} \times 6\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \text{ (cm)}$$



$$\text{따라서, } \overline{AH} = \sqrt{12^2 - (4\sqrt{3})^2} = 4\sqrt{6} \text{ (cm)}$$

(정사면체 A-BCD의 부피)

$$= \frac{1}{3} \times 12 \times 6\sqrt{3} \times \frac{1}{2} \times 4\sqrt{6}$$

$$= 4 \times \frac{1}{3} \times 12 \times 6\sqrt{3} \times \frac{1}{2} \times r$$

$$\therefore r = \sqrt{6} \text{ (cm)}$$



$$\overline{OB} = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 + (\sqrt{6})^2} = 3\sqrt{6} \text{ (cm)}$$

$\triangle OPN \sim \triangle OBH$ 이므로

$$\overline{OP} : \overline{OB} = \overline{ON} : \overline{OH}$$

$$(r' + \sqrt{6}) : 3\sqrt{6} = (\sqrt{6} - r') : \sqrt{6}$$

$$\sqrt{6}r' + 6 = 18 - 3\sqrt{6}r'$$

$$4\sqrt{6}r' = 12$$

$$\therefore r' = \frac{\sqrt{6}}{2} \text{ (cm)}$$

$$\therefore (\text{구 P의 부피}) = \frac{4}{3}\pi \times \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^3 = \sqrt{6}\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

해설

(i) 세 변의 길이가 $2\sqrt{2}$, $2\sqrt{5}$, $2\sqrt{5}$ 인 이등변삼각형

: 길이가 $2\sqrt{2}$ 인 변은 윗면과 아랫면에서 각각 2 개씩, 모두 4 개가 생기고, 그 각각의 경우에 대하여 2 개씩의 삼각형이 만들어지므로 모두 $4 \times 2 = 8$ (가지)

(ii) 세 변의 길이가 2, 4, $2\sqrt{5}$ 인 직각삼각형

: 옆면은 모두 4 개이고, 각각의 옆면에 대하여 삼각형은 4 개씩 생기므로 만들 수 있는 삼각형은 모두 $4 \times 4 = 16$ (가지)

(iii) 세 변의 길이가 2, $2\sqrt{5}$, $(\sqrt{2^2 + 2^2 + 4^2} = 2\sqrt{6})$ 인 삼각형

: 그런데 이 경우는 가장 긴 변의 길이가 $2\sqrt{5}$ 가 아니라 $2\sqrt{6}$ 이므로 조건에 맞는 삼각형을 만들 수 없다.

따라서 (i), (ii), (iii) 에서 $8 + 16 = 24$ (가지) 이다.

15. 가로, 세로, 높이가 각각 2, 2, 4 인 직육면체의 꼭짓점 중 세 점을 골라 삼각형을 만들 때, 가장 긴 변의 길이가 $2\sqrt{5}$ 인 삼각형은 몇 개 만들 수 있는지 구하여라. [배점 6, 상중]

▶ 답:

▶ 정답: 24 가지