

실력 확인 문제

1. 다음 식 $(7a-3)-(-2a-5)$ 을 간단히 하였을 때, a 의 계수와 상수항의 합을 구하여라. [배점 2, 하하]

▶ 답:

▷ 정답: 11

해설

$$7a - 3 + 2a + 5 = 9a + 2$$

따라서 11 이다.

해설

어떤 수를 x 라 하면
어떤 수에서 17 을 뺀 수 : $x - 17$
어떤 수의 3 배보다 1 이 큰 수 : $3x + 1$
 $x - 17 = 3x + 1$
 $-2x = 18$
 $\therefore x = -9$
따라서, 빈 칸에 들어갈 숫자들의 합은
 $17 + 3 + 1 + (-9) + (-9) = 3$ 이다.

2. 다음 중 등식을 모두 고르면?(정답 2개)
[배점 2, 하하]

① $x - 7 < 7$

② $5x = x + 4x$

③ $2(x-1)$

④ $11 + 11 = 22$

⑤ $5a \leq 10$

해설

등호 ‘=’ 를 사용하여 두 수 또는 식의 값이 같음을 나타낸 식을 등식이라 한다.

① 과 ⑤ 은 부등식이고, ③ 은 등호가 없으므로 등식이 아니다.

4. 다음 중 문자를 사용한 식으로 바르게 나타낸 것을 골라라. [배점 2, 하중]

① 밑변의 길이가 acm , 높이가 bcm 인 삼각형의 넓이 : $abcm^2$

② $x\%$ 의 소금물 200g 에 들어있는 소금의 양 :
200g

③ a 원의 2 할 : $\frac{1}{100}a$ 원

④ x km y 시간 동안 달렸을 때의 평균 속력 : $\frac{x}{y}$ km

⑤ 정가가 p 원인 물건의 15% 할인가격 : $\frac{3}{20}p$ 원

해설

① $a \times b \div 2 = a \times b \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}ab$

② $\frac{x}{100} \times 200 = 2x$

③ $a \times \frac{2}{10} = \frac{a}{5}$

⑤ $p \times \left(1 - \frac{15}{100}\right) = p \times \frac{85}{100} = \frac{17}{20}p$

3. 어떤 수에서 17 을 뺀 수가 그 수의 3 배보다 1 이 클 때, 어떤 수를 구하는 과정이다. 빈 칸에 들어갈 알맞은 숫자들의 합을 구하여라.

어떤 수를 x 라 하면 $x - \square = x \times \square + \square$

방정식을 풀면 $x = \square$

따라서, 어떤 수는 \square 이다.

[배점 2, 하하]

▶ 답:

▷ 정답: 3

5. 다음 중 x 의 값에 관계없이 항상 참이 되는 등식은?

[배점 2, 하중]

① $4x - 8 = 6$

② $x^2 - 3x = -3x$

③ $5(2x - 4) - 20$

④ $\frac{x}{3} + 2 = \frac{1}{3}(6 + x)$

⑤ $3x + 2x = 6x^2$

해설

④ $\frac{x}{3} + 2 = \frac{1}{3}(6 + x)$ 에서

(좌변) $= \frac{x}{3} + 2$, (우변) $= \frac{1}{3}(6 + x) = 2 + \frac{x}{3}$ 이다.

좌변과 우변의 식이 같으므로 항등식이다.

6. 다음 중 일차방정식인 것을 모두 골라라.

㉠ $3x - 5 = x + 5$

㉡ $x^3 + 2x + 1 = 0$

㉢ $10 - 7x = 10$

㉣ $4(x - 3) = -12 + 4x$

㉤ $-x^2 + 2x - 7 = x + x^2$

[배점 2, 하중]

▶ 답:

▶ 답:

▷ 정답: ㉠

▷ 정답: ㉡

해설

㉡, ㉤ : (일차식) $= 0$ 이 아니므로 일차방정식이 아니다.

㉡ : 항등식

7. 다음 중 등식으로 나타낼 수 없는 것은?

[배점 2, 하중]

① 200 원짜리 지우개 1 개와 300 원짜리 연필 x 개의 가격이 1800 원이다.

② 한 변의 길이가 x 인 정삼각형의 둘레의 길이는 21 이다.

③ x 의 3 배는 8 보다 크다.

④ 시속 30km 로 x 시간 동안 달린 거리는 120km 이다.

⑤ 20% 의 소금물 xg 에 녹아 있는 소금의 양은 30g 이다.

해설

③ $3x > 8$ 이므로 등식이 아니다.

8. 일차방정식 $3x - 1 = -5x - 2$ 의 밑줄 친 부분을 이항한 것으로 옳은 것은?

[배점 2, 하중]

① $3x - 5x = -2 + 1$

② $3x + 5x = -2 + 1$

③ $3x - 5x = -2 - 1$

④ $3x + 5x = -2 - 1$

⑤ $3x + 5x = 2 - 1$

해설

$3x - 1 = -5x - 2$

$3x + 5x = -2 + 1$

9. 다항식 $2(6a - 3) - 3(3a + 1)$ 을 간단히 했을 때, a 의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

[배점 3, 하상]

▶ 답:

▷ 정답: -6

해설

$$2(6a - 3) - 3(3a + 1) = 12a - 6 - 9a - 3 = 3a - 9$$

a 의 계수는 3, 상수항은 -9
 $\therefore 3 + (-9) = -6$

해설

시속 60km로 달린 거리를 x (km)라고 하면
 $\frac{x}{60} + \frac{200-x}{50} = 3\frac{1}{2}$, $5x + 6(200-x) = 1050$
 $\therefore x = 150$ (km)

10. 방정식의 해가 나머지 넷과 다른 것을 고르면?
[배점 3, 하상]

① $\frac{1}{3}x + 1 = \frac{x-2}{2}$

② $3(x+1) - 2 = 4x - 1$

③ $\frac{x}{6} + 1 = \frac{x+2}{3}$

④ $-0.03x = 0.2(1.2x - 2.7)$

⑤ $2x + 4 = 6 + x$

해설

- ① $2x + 6 = 3(x-2)$, $3x - 2x = 6 + 6$, $x = 12$
② $3x + 3 - 2 = 4x - 1$, $-x = -2$, $x = 2$
③ $x + 6 = 2(x+2)$, $x + 6 = 2x + 4$, $x = 2$
④ $-3x = 2(12x-27)$, $-3x = 24x - 54$, $-27x = -54$, $x = 2$
⑤ $2x - x = 6 - 4$, $x = 2$

11. 어떤 사람이 200km의 거리를 자동차로 가는데 시속 60km로 달리다가 중간에 시속 50km로 달려서 3시간 30분이 걸렸다. 시속 60km로 달린 거리는?

[배점 3, 하상]

- ① 80km ② 100km ③ 110km
④ 120km ⑤ 150km

12. 일차방정식 $3 - \frac{1-x}{4} = 2 + x$ 를 풀면?
[배점 3, 하상]

① $x = -2$ ② $x = 0$ ③ $x = \frac{3}{5}$

④ $x = 1$ ⑤ $x = \frac{9}{2}$

해설

양변에 4를 곱하면
 $12 - (1-x) = 4(2+x)$
 $12 - 1 + x = 4x + 8$
 $3x = 3$
 $\therefore x = 1$

13. 다음 등식 중 방정식의 개수를 a 개, 항등식의 개수를 b 개라 할 때, $a - b$ 의 개수를 구하여라.

- (1) $-(2x-5) = 5-2x$
(2) $\frac{x+2}{3} = \frac{4}{3}$
(3) $2x-7 = 7-2x$
(4) $-3(4-x) = 3x-12$

[배점 3, 중하]

▶ 답:

▷ 정답: 0

해설

- (1) $-2x + 5 = 5 - 2x$ <항등식>
 (2) 양변에 3을 곱하여 분모를 소거하면, $x+2 = 4$
 <방정식>
 (3) $2x - 7 = 7 - 2x$ <방정식>
 (4) $-12 + 3x = 3x - 12$ <항등식>
 방정식은 (2), (3) 이므로 $a = 2$
 항등식은 (1), (4) 이므로 $b = 2$
 따라서 $a - b = 0$ 이다.

해설

을이 x 개가졌을 때, 갑은 $(x + 16)$ 개를 갖는다.
 갑이 가진 구슬의 개수와 을이 가진 구슬의 개수
 의 합인 52 개를 이용하여 식을 세워보면
 $(x + 16) + x = 52$ 이다.
 식을 정리하고, 우변의 52 를 좌변으로 이항하면,
 $2x + 16 = 52$
 $2x + 16 - 52 = 0$
 $2x - 36 = 0$ 따라서 $A = -36$ 이다.

14. 두 수 a , b 에 대하여 $a \odot b = 3a + 2b - 3$ 이라 할 때,
 다음 식의 x 의 값은?

$$4 \odot (2x \odot 4) = 27 \quad [\text{배점 } 3, \text{ 중하}]$$

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

해설

$$\begin{aligned} a \odot b &= 3a + 2b - 3 \text{에서} \\ 2x \odot 4 &= 3 \times 2x + 2 \times 4 - 3 = 6x + 5 \\ 4 \odot (6x + 5) &= 3 \times 4 + 2(6x + 3) - 3 = 27 \\ 12 + 12x + 6 - 3 &= 27, 12x = 12, x = 1 \end{aligned}$$

15. 52 개의 구슬을 갑, 을 두 사람이 나누어 가졌는데 갑이
 을보다 16 개더 많이 가졌다. 이 때, 을이 가진 구슬의
 개수를 x 개라고 할 때, x 를 구하는 방정식이 아래와
 같다. A 의 값을 구하여라.

$$2x + A = 0$$

[배점 3, 중하]

▶ 답 :

▷ 정답 : -36