

1. 다항식  $2xy^2 + x^2y - 3x + x^3 - 1$ 에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ①  $x$ 에 대한 삼차식이다.
- ②  $y$ 에 대한 이차식이다.
- ③  $x^2$ 의 계수는  $y$ 이다.
- ④  $x$ 의 계수는  $2y^2 - 3$ 이다.
- ⑤  $y$ 에 대한 상수항은  $-1$ 이다.

2.  $A = 2x^2 + 5xy - 3y^2, B = 4x^2 - 5xy + y^2, C = -x^2 + 4y^2$  일 때,  
 $2A - \{B - (2C - 3A)\}$  를 간단히 하면?

- ①  $8x^2 + 30xy - 24y^2$       ②  $8x^2 - 30xy - 24y^2$   
③  $-8x^2 + 30xy - 24y^2$       ④  $-8x^2 + 10y^2$   
⑤  $-8x^2 - 10y^2$



4.  $x + y = 4$ ,  $xy = 3$  일 때,  $x^2 - xy + y^2$  의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

5. 다음 등식 중에서  $x$ 에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립하는 것을 모두 고르면?

- ①  $(x - 2)(x + 2) = x^2 - 4$       ②  $x^2 - x = x(x + 2)$   
③  $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$       ④  $x(x - 2) = 0$   
⑤  $x + y = x - y$

6.  $\frac{1}{\sqrt{-8}}(3\sqrt{-2} - 3\sqrt{-8} + \sqrt{-32})$  을 계산하면?

- ①  $i$       ②  $\frac{1}{2}$       ③  $-i$       ④  $-\frac{1}{2}$       ⑤  $\frac{i}{2}$

7. 다음 중 옳은 것은?

- ①  $\sqrt{-3} \times \sqrt{-4} = -\sqrt{12}$
- ②  $\sqrt{-3} \times \sqrt{-4} = \sqrt{12}$
- ③  $\sqrt{-3} \times \sqrt{4} = -\sqrt{12}$
- ④  $\frac{\sqrt{-3}}{\sqrt{-4}} = -\sqrt{\frac{3}{4}}$
- ⑤  $\frac{\sqrt{-3}}{\sqrt{4}} = -\sqrt{\frac{3}{4}}$

8.     방정식  $\frac{x+2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{2x+1}{4}$  의 해를 구하면?

- ①  $-\frac{1}{2}$         ②  $-\frac{1}{3}$         ③  $\frac{1}{2}$         ④  $\frac{1}{3}$         ⑤ 1

9. 이차방정식  $x^2 - 2x + k + 2 = 0$ 이 중근을 가지도록 하는 상수  $k$ 의 값을 구하면?

- ① -1      ② 1      ③ 0      ④ -2      ⑤ 2

10. 이차방정식  $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라고 할 때,  $\alpha^3 + \beta^3$  을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

11.  $(1+i)x^2 + 2(1+2i)x - 3 + 3i$  가 순허수일 때,  $x$  의 값은?

- ① 0      ② 1      ③ -3      ④ 1, 3      ⑤ -1

12.  $z = \frac{2}{1+i}$  때 대하여  $z^2 - 2z + 3$ 의 값은? (단,  $i = \sqrt{-1}$ )

- ① 0      ② 1      ③ 2      ④ 3      ⑤ -1

13. 방정식  $|x| + |x - 1| = 2$  의 해를 구하시오.

▶ 답: \_\_\_\_\_

▶ 답: \_\_\_\_\_

14. 이차방정식  $3x^2 - 6x + k = 0$ 의 허근을 갖도록 실수  $k$ 의 범위를 정하면?

- ①  $k \leq 3$     ②  $k > 3$     ③  $k \leq 2$     ④  $k > 2$     ⑤  $k < 1$

15. 계수가 유리수인 이차방정식  $x^2 - ax + b = 0$  의 한 근이  $2 + \sqrt{3}$  일 때,  $ab$ 의 값은?

- ① -3      ② 0      ③ 2  
④ 4      ⑤  $2 + 2\sqrt{3}$

16. 다음은 연산법칙을 이용하여  $(x + 3)(x + 2)$ 를 계산한 식이다.

$$\begin{aligned}(x + 3)(x + 2) &= (x + 3)x + (x + 3) \times 2 \\&= (x^2 + 3x) + (2x + 6) \\&= x^2 + (3x + 2x) + 6 \\&= x^2 + 5x + 6\end{aligned}$$

위의 연산과정에서 사용한 연산법칙을 바르게 고른 것은?

- ① 교환법칙, 결합법칙
- ② 교환법칙, 분배법칙
- ③ 분배법칙, 결합법칙
- ④ 결합법칙, 분배법칙, 교환법칙
- ⑤ 연산법칙을 사용하지 않았다.

17.  $x$ 에 대한 다항식  $x^3 + ax^2 + bx + 2$ 를  $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지가  $x + 3$ 이 되도록  $a, b$ 의 값을 정할 때,  $ab$  값을 구하여라.

▶ 답:  $ab = \underline{\hspace{1cm}}$

18.  $(x - 1)(x + 2)(x - 3)(x + 4)$ 를 전개할 때, 각 항의 계수의 총합을  $a$ , 상수항을  $b$ 라 할 때,  $a + b$ 의 값을 구하면?

- ① 8      ② 15      ③ 24      ④ 36      ⑤ 47

19.  $x$ 에 대한 항등식  $\frac{x^2 - 3x - 1}{x - 1} - \frac{x^2 - x - 3}{x + 1} + \frac{2}{x} = \frac{Ax + B}{x(x - 1)(x + 1)}$ 에서  $A - B$ 의 값을 수치대입법을 이용하여 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

20.  $x$ 에 관계없이  $\frac{x-a}{2x-b}$ 가 항상 일정한 값을 가질 때, 상수  $a, b$ 에 대하여

$$\frac{b}{a}$$
의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

- 21.**  $(x^3 - x^2 - 2x + 1)^5 = a_0 + a_1(x - 1) + a_2(x - 1)^2 + \cdots + a_{15}(x - 1)^{15}$   
일 때,  $a_0 + a_2 + a_4 + \cdots + a_{14}$ 의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

22. 다항식  $f(x) = x^3 - 3x^2 + kx - 6$  일차식  $x - 2$ 로 나누어떨어질 때,  
 $f(x)$ 를  $x - 1$ 로 나눈 나머지는?

① -3      ② -1      ③ 2      ④ 4      ⑤ 5

23. 다항식  $f(x)$ 를  $x - 2$ ,  $x + 2$ 로 나누었을 때, 나머지가 각각 5, 3이라 한다. 이 때, 다항식  $f(x)$ 를  $x^2 - 4$ 로 나눈 나머지를 구하면  $ax + b$ 이다.  $4a + b$ 의 값을 구하시오.

▶ 답: \_\_\_\_\_

24.  $x$ 에 대한 다항식  $x^3 + 2x^2 - ax + b$ 가  $x^2 + x - 2$ 로 나누어 떨어질 때,  
 $a^2 + b^2$ 의 값을 정하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

25.  $(x-3)(x-1)(x+2)(x+4)+24$  를 인수분해하면  $(x+a)(x+b)(x^2+cx+d)$  이다.  $a + b + c - d$  의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

26.  $x^6 + 1$ 을 계수가 실수인 범위 내에서 인수분해 할 때, 다음 중 인수인 것은?

- ①  $x^2 + x + 1$       ②  $x^2 - x + 1$       ③  $x^2 + \sqrt{3}x + 1$   
④  $x^2 + \sqrt{3}x - 1$       ⑤  $x^2 - 1$

27. 다음 중 다항식  $x^2 + 3xy + 2y^2 - x - 3y - 2$ 의 인수인 것은?

- ①  $x + y + 2$       ②  $x - y + 2$       ③  $x + 2y + 1$   
④  $x - 2y + 1$       ⑤  $x + y + 1$

28. 다항식  $P(x) = x^4 + 2x^3 + kx^2 - 2x + 8$  가  $x - 1$ 로 나누어 떨어지도록  
상수  $k$ 의 값을 정할 때 다음 중  $P(x)$ 의 인수가 아닌 것은?

- ①  $x - 1$     ②  $x + 1$     ③  $x - 2$     ④  $x + 2$     ⑤  $x + 4$

29. 삼각형 ABC의 세변의 길이  $a, b, c$  사이에  $a^3 + a^2b - ac^2 + ab^2 + b^3 - bc^2 = 0$ 인 관계가 성립할 때 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ①  $b = c$ 인 이등변 삼각형
- ②  $a = c$ 인 이등변삼각형
- ③  $b$ 가 빗변의 길이인 직각삼각형
- ④ 정삼각형
- ⑤  $c$ 가 빗변의 길이인 직각삼각형

30. 임의의 실수  $a, b$ 에 대하여 연산  $\Delta$ 를  $a\Delta b = a^2 - ab + b^2$  라 할 때,  
 $(x^2\Delta x) + (2x\Delta x) - (x\Delta 1) - 3$  을 인수분해하면?

- ①  $(x-1)(x+1)(x^2-x+4)$
- ②  $(x-2)(x+1)(x^2-x+4)$
- ③  $(x-1)(x+2)(x^2-x+2)$
- ④  $(x-1)(x+1)(x+2)^2$
- ⑤  $(x-2)(x+1)(x+2)^2$

31. 실수  $x, y$ 에 대하여  $\frac{x}{1+i} + \frac{y}{1-i} = 2 - i$  가 성립할 때,  $2x + y$ 의  
값은?

- ① 8      ② 7      ③ 5      ④ 4      ⑤ 2

32.  $f(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^{100}$  일 때,  $f\left(\frac{1+i}{1-i}\right) + f\left(\frac{1-i}{1+i}\right)$ 의 값은?

- ①  $1 - i$       ② 0      ③  $-1 - i$   
④ 2      ⑤  $1 + i$

33.  $x = -2 + i$  일 때,  $x^3 + 4x^2 - 3x + 2$  의 값은?

- ①  $-15 + 5i$       ②  $-12 + 2i$       ③  $14 - 4i$   
④  $16 - 6i$       ⑤  $18 - 8i$

34. 방정식  $x^2 - 2|x| - 3 = 0$ 의 근의 합을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

35. 방정식  $\left[x + \frac{1}{2}\right]^2 - 3\left[x - \frac{1}{2}\right] - 7 = 0$ 의 해  $a \leq x < b$  또는  $c \leq x < d$ 에 대하여  $a + b + c + d$ 의 값은? (단,  $[x]$ 는  $x$ 보다 크지 않은 최대 정수)

① 2      ② 4      ③ 6      ④ 8      ⑤ 10

36.  $x$ 에 대한 이차방정식  $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이  $-1 + \sqrt{2}$ 일 때, 유리수  $a, b$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:  $a = \underline{\hspace{1cm}}$

▶ 답:  $b = \underline{\hspace{1cm}}$

37. 방정식  $x^2 + 2(k+a)x + k^2 + k + b = 0$ 이  $k$ 의 값에 관계없이 중근을 갖도록 실수  $a, b$ 의 값을 정할 때,  $a + 2b$ 의 값을 구하면?

① -2      ② -1      ③ 0      ④ 1      ⑤ 2

38. 어떤 실수  $a$ 에 대하여 두 수  $[a]$ 와  $a - [a]$ 를 근으로 하는 이차방정식이  $4x^2 - 7x + k = 0$  일 때, 상수  $k$ 의 값은?(단,  $[a]$ 는  $a$ 보다 크지 않는 최대의 정수이다.)

① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

**39.** 이차방정식  $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라 할 때,  $\alpha + \frac{1}{\beta}, \beta + \frac{1}{\alpha}$  을 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 이차방정식을 구하면?

- ①  $x^2 - 6x + 4 = 0$       ②  $x^2 - 3x + 4 = 0$   
③  $x^2 + 6x + 5 = 0$       ④  $x^2 + 4x + 5 = 0$

- ⑤  $x^2 - 4x + 5 = 0$

40. A, B 두 사람이 이차방정식  $ax^2 + bx + c = 0$ 을 푸는데 A는 b를 잘못 읽어 -4와 7을, B는 c를 잘못 읽어  $-3 \pm \sqrt{2}i$ 를 근으로 얻었다. 원래의 두 근의 합을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

41.  $x$ 에 대한 이차방정식  $x^2 + 2(m-2)x + 2m - 1 = 0$ 의 두 근이 모두 음수일 때, 실수  $m$ 의 값의 범위를 구하면?

- ①  $m > 5$       ②  $m \geq 5$       ③  $m < 5$   
④  $m \leq 5$       ⑤  $-5 \leq m \leq 5$

42. 직육면체 모양의 상자가 있다. 이 상자의 모든 모서리의 길이의 합이 20m이고 대각선의 길이가 3m 일 때, 이 상자의 곁넓이는 몇  $m^2$ 인가?

- ①  $12\ m^2$     ②  $13\ m^2$     ③  $14\ m^2$     ④  $15\ m^2$     ⑤  $16\ m^2$

43.  $x$ 에 대한 다항식  $P(x)$ 를  $x - 2$ 로 나눈 나머지가 5이고, 그 몫을 다시  $x + 3$ 으로 나눈 나머지가 3일 때,  $xP(x)$ 를  $x + 3$ 으로 나눈 나머지를 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

44.  $x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 2x - 3$  을 바르게 인수분해 한 것을 찾으면?

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ① $(x^2 + 1)(x + 3)(x + 1)$ | ② $(x^2 + 1)(x + 3)(x - 1)$ |
| ③ $(x^2 + 1)(x - 3)(x - 1)$ | ④ $(x^2 - 3)(x - 1)(x + 1)$ |
| ⑤ $(x^2 + 3)(x - 1)(x + 1)$ |                             |

45.  $\frac{2^{40} - 2^{35} - 2^5 + 1}{2^{35} - 1}$ 의 값을 구하여라.

 답: \_\_\_\_\_

46.  $a - b = 3$ ,  $b - c = 1$  일 때,  $ab^2 - a^2b + bc^2 - b^2c + ca^2 - c^2a$  의 값은?

- ① -14      ② -12      ③ -8      ④ -4      ⑤ 0

47.  $x^2 - x + 1 = 0$  의 한 근을  $z$ 라 한다.  $p = \frac{1+z}{3-z}$  일 때,  $7p \cdot \bar{p}$ 의 값을 구하면?

- ① 5      ② 4      ③ 3      ④ 2      ⑤ 1

48. 방정식  $\{1 + (a+b)^2\}x^2 - 2(1-a-b)x + 2 = 0$ 의 근이 실수일 때  
 $a^3 + b^3 - 3ab$ 의 값을 구하면? (단,  $a, b$ 는 실수)

① 1      ② -1      ③ 2      ④ -2      ⑤ 0

49.  $n$ 이 자연수일 때  $x^{2n}(x^2 + ax + b)$ 를  $(x + 2)^2$ 으로 나눈 나머지가  $4^n(x + 2)$ 가 되도록  $a, b$ 의 값을 정할 때,  $a - 2b$ 의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

50. 0이 아닌 세 실수  $a, b, c$ 가  $\frac{b}{a} = \frac{a}{b} = \frac{a}{c}$ 를 만족할 때, 이차방정식

$cx^2 + bx + a = 0$ 의 한 근을 복소수  $\alpha$ 라 하자. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르면?

Ⓐ  $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$  Ⓑ  $\alpha + \bar{\alpha} = -1$

Ⓒ  $\frac{1}{\alpha} = \bar{\alpha}$  Ⓛ  $\alpha^2 = \bar{\alpha}$

① Ⓐ, Ⓑ

② Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ

③ Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ

④ Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ

⑤ Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ