

1. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 3.9 의 제곱근은 1 개이다.
- ② -8 의 제곱근은  $-\sqrt{8}$  이다.
- ③  $\sqrt{6^2}$  의 제곱근은  $\pm\sqrt{6}$  이다.
- ④  $\left(-\frac{5}{3}\right)^2$  의 제곱근은  $-\frac{5}{3}$  이다.
- ⑤ 제곱근 3 과 3 의 제곱근은 같다.

2. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

- ①  $\frac{7}{9}$  의 제곱근은  $\pm\frac{\sqrt{7}}{3}$  이다.
- ② 1.5 의 제곱근은 1 개이다.
- ③ 제곱근  $\frac{9}{4}$  는  $\frac{3}{2}$  이다.
- ④ 제곱근 25 는 5 이다.
- ⑤ 자연수가 아닌 수의 제곱근은 없다.

3. 다음 보기에서 옳은 것의 개수는?

[보기]

- Ⓐ  $\frac{\pi}{4}$ 는 유리수가 아니다.
- Ⓑ 모든 무한소수는 무리수이다.
- Ⓒ  $1 - \sqrt{7}, \sqrt{121}, -\sqrt{15^2}, \pi$ 는 모두 무리수이다.
- Ⓓ 무리수이면서 유리수인 수는 없다.
- Ⓔ 음이 아닌 수의 제곱근은 반드시 2개가 있고, 그 절댓값은 같다.

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

4.  $\sqrt{3n}$  이 2 와 4 사이의 수가 되게 하는 정수  $n$  의 개수는 몇 개인가?

- ① 1 개      ② 2 개      ③ 3 개      ④ 4 개      ⑤ 5 개

5. 다음 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

$$\textcircled{\text{A}} \quad 3 - \sqrt{3} < -\sqrt{3} \quad \textcircled{\text{C}} \quad 3 - \sqrt{5} > \sqrt{5} - \sqrt{8}$$

$$\textcircled{\text{B}} \quad -1 > -\sqrt{5} \quad \textcircled{\text{D}} \quad \sqrt{7} - \sqrt{10} < -3 + \sqrt{7}$$

$$\textcircled{\text{E}} \quad 1 - \sqrt{\frac{1}{2}} < -\sqrt{\frac{2}{3}} + 1$$

- ① 1 개    ② 2 개    ③ 3 개    ④ 4 개    ⑤ 5 개

6. 다음 수를 근호 안의 수가 가장 작은 자연수가 되도록  $a\sqrt{b}$  의 꼴로 나타낸 것 중 틀린 것은?

$$\textcircled{1} \quad \sqrt{\frac{27}{121}} = \frac{3\sqrt{3}}{11} \quad \textcircled{2} \quad \sqrt{0.005} = \frac{\sqrt{2}}{20}$$

$$\textcircled{3} \quad \sqrt{0.12} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \textcircled{4} \quad \sqrt{\frac{2}{49}} = \frac{\sqrt{2}}{7}$$

$$\textcircled{5} \quad \sqrt{\frac{12}{32}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

7.  $\sqrt{2} = a$ ,  $\sqrt{3} = b$  라 할 때,  $\sqrt{72}$  를  $a$ ,  $b$  를 써서 나타내면?

- ①  $a^3b^2$     ②  $a^2b^3$     ③  $a^3b$     ④  $a^2b^2$     ⑤  $ab^3$

8.  $\sqrt{2} = a$ ,  $\sqrt{3} = b$  일 때,  $\sqrt{0.1536}$  의 값을  $a$ ,  $b$  를 써서 나타내면?

- ①  $\frac{2}{25}ab$     ②  $\frac{4}{25}ab$     ③  $\frac{8}{25}ab$     ④  $\frac{16}{25}ab$     ⑤  $\frac{32}{25}ab$

9. 다음 그림과 같은 두 원  $O$ ,  $O'$ 의 넓이의 합과 같은 넓이를 갖는 원의 반지름의 길이는?



- ①  $\sqrt{21}$     ②  $\sqrt{30}$     ③  $\sqrt{49}$     ④  $\sqrt{52}$     ⑤  $\sqrt{58}$

10.  $\sqrt{(5 - 2\sqrt{5})^2} + \sqrt{(2\sqrt{5} - 5)^2}$  을 간단히 하면  $a + b\sqrt{5}$  이다. 유리수  $a$  와  $b$  의 합은?

① -4      ② 0      ③ 3      ④ 6      ⑤ 11

11.  $\sqrt{20} + \sqrt{0.2} + \frac{4}{\sqrt{5}} = a\sqrt{5}$ ,  $\sqrt{2.5} \times \sqrt{\frac{6}{5}} \times \sqrt{18} = b\sqrt{6}$  일 때,  $a \times b$ 의 값은?

- ① 4      ② 9      ③ 16      ④ 25      ⑤ 36

12.  $x = \frac{2\sqrt{5} + 4\sqrt{2}}{\sqrt{2}}, y = \frac{2\sqrt{5} - 4\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$  일 때,  $\frac{x-y}{x+y}$ 의 값은?

①  $\sqrt{2}$

②  $\frac{\sqrt{2}}{4}$

③  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

④  $\frac{\sqrt{10}}{5}$

⑤  $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

13. 유리수  $a, b$ 에 대하여 " $a + b\sqrt{2} = 0$  이면  $a = b = 0$  이다."라는 성질을 이용하여  $x(1 + 2\sqrt{2}) + y(3 + 5\sqrt{2}) = \sqrt{2}(1 - 3\sqrt{2})$ 을 만족시키는 두 유리수  $x, y$ 에 대하여  $x+y$ 의 값을 구하는 과정이다. 빈칸에 알맞은 수로 바르게 짹지어진 것은?

풀이과정

$$x(1 + 2\sqrt{2}) + y(3 + 5\sqrt{2}) = \sqrt{2} - 6$$

좌변으로 이항하여 정리하면

$$x + 3y + 6 + (2x + 5y - 1)\sqrt{2} = 0$$

문제에 주어진 성질에 의하여

$$x + 3y + 6 = 0 \cdots \textcircled{\text{①}}$$

$$2x + 5y - 1 = 0 \cdots \textcircled{\text{②}}$$

이 두 식을 연립하여 풀면

$$x = \boxed{\phantom{00}}, y = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\text{따라서, } x + y = \boxed{\phantom{00}}$$

①  $x = 13, y = 33, x + y = 20$

②  $x = 23, y = -13, x + y = 10$

③  $x = -33, y = 13, x + y = -20$

④  $x = 33, y = -13, x + y = 20$

⑤  $x = 33, y = 13, x + y = 43$

14. 다음 제곱근표를 이용하여  $\sqrt{31.2}$ 의 값을 구하면?


수	0	1	2	3	4	5
25	5.000	5.010	5.020	5.030	5.040	5.050
26	5.099	5.109	5.119	5.128	5.138	5.148
27	5.196	5.206	5.215	5.225	5.235	5.244
28	5.292	5.301	5.310	5.320	5.329	5.339
29	5.385	5.394	5.404	5.413	5.422	5.431
30	5.477	5.486	5.495	5.505	5.514	5.523
31	5.568	5.577	5.586	5.595	5.604	5.612
32	5.657	5.666	5.675	5.683	5.692	5.701
33	5.745	5.753	5.762	5.771	5.779	5.788
34	5.831	5.840	5.848	5.857	5.865	5.874

- ① 5.831    ② 5.586    ③ 5.495    ④ 5.675    ⑤ 5.404

15. 주어진 식을 인수분해했을 때, 빈 칸에 들어갈 값이 다른 것은?

- ①  $3x^2 + 18x + 27 = 3(x + \square)^2$
- ②  $9x^2 - 24x + 16 = (\square x - 4)^2$
- ③  $2x^2 - 72 = 2(x + 6)(x - 2 \times \square)$
- ④  $6x^2 - 17x + 12 = (2x - \square)(3x - 4)$
- ⑤  $x^2 - 20x + 91 = (x - 7)(x - \square)$

16. 다음 그림과 같이 넓이가  $9x^2 + 12x + 4$  인 정사각형의 둘레의 길이는?



- ①  $6x$
- ②  $12x + 8$
- ③  $6x + 2$
- ④  $2x$
- ⑤  $4$

17. 다음은 인수분해 과정을 나타낸 것이다.  안에 들어갈 말을 차례대로 나열한 것은?

$$\textcircled{1} \quad 2x^3 - 8x^2 - 10x = 2x(x^2 - 4x - 5)$$

$$= 2x(x - 5)(\square)$$

\textcircled{2} \quad (x + y)^2 + 3(x + y) + 2 \text{에서 } \square \text{를 A로 치환한다.}

- ①  $x - 1, x - y$       ②  $x - 1, x + y$       ③  $x + 1, x - y$   
④  $x + 1, x + y$       ⑤  $x, x + y$

18.  $2(x+2)^2 + (x+2)(3x-1) - (3x-1)^2 = -(ax+b)(cx+d)$  일 때,  
 $ab+cd$ 의 값을 구하면? (단,  $a, c$ 는 양수)

① -1      ② 3      ③ 0      ④ 2      ⑤ -2

19.  $a^3 - 3a^2 - a + 3$  이  $a$  의 계수가 1인 세 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 세 일차식의 합을 구하면?

- ①  $3(1 - a)$       ②  $3(a - 2)$       ③  $3a - 3$   
④  $3a - 1$       ⑤  $a^3 - 3$

20.  $-9x^2 + y^2 + 6xz - z^2$  을 인수분해하였더니  $(ay - 3x + z)(y + bx + cz)$  가 되었다. 이때, 상수  $a, b, c$  에 대하여  $a + b + c$  의 값을 구하면?

① 1      ② 2      ③ 3      ④ -1      ⑤ -2


21.  $x = \frac{1}{5 - 3\sqrt{3}}$  일 때,  $x^2 + \frac{1}{x^2}$  의 값으로 알맞은 것을 고르면?

①  $\frac{130 + 75\sqrt{5}}{2}$       ②  $\frac{130 + 75\sqrt{3}}{2}$       ③  $\frac{130 - 45\sqrt{3}}{2}$   
④  $\frac{130 + 75\sqrt{5}}{3}$       ⑤  $\frac{120 + 75\sqrt{3}}{2}$

22.  $x + \frac{1}{x} = 4$  일 때,  $x - \frac{1}{x}$  의 값이 될 수 있는 것을 모두 고르면?

- ①  $2\sqrt{3}$       ②  $3\sqrt{3}$       ③  $-2\sqrt{3}$   
④  $-3\sqrt{3}$       ⑤ 2

23. 다음 그림과 같이 가로의 길이가  $x$ , 세로의 길이가  $y$ 인 직사각형  $ABCD$  모양의 종이를 접어 정사각형  $ABFE$  와  $EGHD$  를 잘라내었다. 남은 사각형 모양의 넓이를  $x$  와  $y$  가 포함된 식으로 나타낸 후 인수분해했을 때, 인수인 것은?



- ①  $x$       ②  $y$       ③  $x + y$   
④  $2x - y$       ⑤  $2y - x$

24.  $x$  의 값의 범위가  $\{x \mid 0 \leq x \leq 4\}$  이고,  $x$  는 정수일 때, 이차방정식  $x^2 - 5x + 6 = 0$  의 해를  $a, b$  라 하고,  $x^2 - 3x + 2 = 0$  의 해를  $m, n$  이라 할 때,  $ab - (m + n)$  을 구하면?

① 3      ② 6      ③ 8      ④ 9      ⑤ 12

25. 다음 중  $\frac{3}{4}$ , -5 를 두 근으로 갖는 이차방정식은?

①  $\left(x + \frac{3}{4}\right)(x + 5) = 0$       ②  $(3x - 4)(x - 5) = 0$

③  $(4x - 3)(x + 5) = 0$       ④  $(3x - 4)(x - 5) = 0$

⑤  $\left(x + \frac{3}{4}\right)(x - 5) = 0$

26. 다음 중에서 해가  $x = 2$  또는  $x = -3$ 인 이차방정식은?

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ① $(x - 2)(x + 3) = 0$   | ② $(x + 2)(x - 3) = 0$   |
| ③ $(2x - 1)(3x + 1) = 0$ | ④ $(2x + 1)(3x - 1) = 0$ |
| ⑤ $(x - 2)(3x - 1) = 0$  |                          |

27.  $x$ 에 대한 이차방정식  $(m-1)x^2 - (m^2 + 2m - 2)x + 21 = 0$ 의 한 근이 3 일 때, 두 근을 모두 양수가 되게 하는  $m$ 의 값과 나머지 한 근의 합을 구하면?

①  $\frac{13}{2}$       ②  $\frac{15}{2}$       ③  $\frac{17}{2}$       ④  $\frac{19}{2}$       ⑤  $\frac{21}{2}$

28.  $x$ 에 관한 이차방정식  $2x^2 - px - 3p = 0$  ( $p \neq 0$ )의 한 근이  $2p$  일 때,  
 $x$ 의 값을 구하라.

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ① $x = -2$ 또는 $x = 1$           | ② $x = -\frac{3}{4}$ 또는 $x = 1$ |
| ③ $x = \frac{4}{3}$ 또는 $x = 4$  | ④ $x = \frac{3}{4}$ 또는 $x = 1$  |
| ⑤ $x = \frac{3}{4}$ 또는 $x = -1$ |                                 |

29. 두 이차방정식  $2x^2 - ax + 2 = 0$ ,  $x^2 - 3x + b = 0$ 의 공통인 해가 2 일 때,  $ab$ 의 값을 구하면?

- ① -25      ② -10      ③ 1      ④ 10      ⑤ 25

30. 이차방정식  $(x - 1)^2 = 3 - k$ 의 근에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ①  $k = -6$  이면 근이 2개이다.
- ②  $k = -1$  이면 정수인 근을 갖는다.
- ③  $k = 0$  이면 무리수인 근을 갖는다.
- ④  $k = 1$  이면 근이 1개이다.
- ⑤  $k = 3$  이면 중근을 갖는다.

31. 이차방정식  $3x^2 - 6x + k + 2 = 0$ 의 해가 1개일 때, 상수  $k$ 의 값을 구하면?

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

32. 이차방정식  $x^2 - ax + b = 0$  의 한 근이  $3 + \sqrt{5}$  일 때,  $ab$ 의 값으로 옳은 것은? ( $a, b$ 는 유리수)

- ① 24      ② -24      ③ 12      ④ -12      ⑤ 10

33. 다음은 이차방정식  $A$  와  $A$  의 한 근  $B$  를 나타낸 것일 때, 유리수  $a$  의 값은?

$$A : -a = (x + 1)^2$$

$$B : -1 - \sqrt{3}$$

- ① -3      ② -2      ③ -1      ④ 1      ⑤ 3

34.  $x^2$  의 계수가 1인 어떤 이차방정식을  $x$ 의 계수를 잘못 보고 풀었더니 해가 1, 5이었고, 상수항을 잘못 보고 풀었더니 해가 -2, -4이었다. 이 방정식의 옳은 근은?

- ① 2, 5      ② 2, -5      ③ 1, 5  
④ 1, 2      ⑤ -1, -5

35. 이차방정식  $x^2 + ax + b = 0$ 의 근을 구하는데 소연은 일차항의 계수를 잘못 보고 풀어서 두 근이  $x = 1 \pm \sqrt{2}$ 가 나왔고, 소희는 상수항을 잘못 보고 풀어서 두 근이  $x = 2 \pm \sqrt{6}$ 이 나왔다. 이 때,  $ab$ 의 값은?

① -4      ② -2      ③ 1      ④ 2      ⑤ 4

36. 이차방정식  $x^2 - ax + b = 0$ 을 헬수는 상수항을 잘못보고 풀어서 근이  $-3, 7$ 이 나왔고, 영희는 일차항의 계수를 잘못 보고 풀어서 근이  $2, -6$ 이 나왔다. 올바른 이차방정식의 근을 구했을 때 두 근의 합은?

① 4      ② 8      ③ -8      ④ 12      ⑤ -12

37. 이차함수  $y = ax^2$  의 그래프가  $y = -\frac{3}{2}x^2$  의 그래프보다 폭이 좁고,

$y = 2x^2$  의 그래프보다 폭이 넓다고 할 때, 음수  $a$ 의 범위는?

- ①  $-\frac{3}{2} < a < 2$       ②  $-\frac{3}{2} < a < -2$       ③  $\frac{3}{2} < a < 2$   
④  $-2 < a < -\frac{3}{2}$       ⑤  $-2 < a < \frac{3}{2}$

38. 다음 그림은 모두 꼭짓점이 원점인 포물선이고,  $y = x^2$  ⋯ (ㄱ),  $y = -x^2$  ⋯ (ㄴ)이다.  $-1 < a < 0$  일 때,  $y = -ax^2$  의 그래프로 알맞은 것은?

- ① ㉠      ② ㉡      ③ ㉢  
④ ㉣      ⑤ ㉤



39. 이차함수  $y = -\frac{2}{3}x^2$  의 그래프를  $y$  축 방향으로  $m$  만큼 평행이동하면

점  $(\sqrt{3}, -5)$  를 지난다고 할 때,  $m$  的 값은?

- ① 4      ② 5      ③ -5      ④ -3      ⑤ -2

40. 이차함수  $y = 4(x + 7)^2 - 5$  의 그래프를  $x$ 축,  $y$ 축의 방향으로 각각 3, -5 만큼 평행이동한 그래프가 점  $(0, a)$  을 지날 때,  $a$ 의 값은?

① 22      ② 38      ③ 54      ④ 60      ⑤ 76

41. 다음 보기의 이차함수 그래프 중  $y = ax^2$  의 그래프가 3 번째로 폭이  
넓을 때,  $|a|$ 의 범위는?

[보기]

Ⓐ  $y = -\frac{3}{2}x^2$  Ⓑ  $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}$

Ⓒ  $y = 2x^2 - x$  Ⓡ  $-3(x+2)^2$


Ⓓ  $y = \frac{x(x-1)(x+1)}{x+1}$

Ⓐ  $1 < |a| < \frac{1}{2}$  Ⓑ  $1 < |a| < \frac{3}{2}$  Ⓒ  $1 < |a| < \frac{5}{2}$

Ⓓ  $\frac{1}{2} < |a| < \frac{3}{2}$

Ⓔ  $\frac{1}{2} < |a| < \frac{5}{2}$

42. 다음 그림은  $y = x^2 + 2x - 3$  의 그래프이다. 이 포물선과  $x$  축과의 교점을 A, C 라 하고,  $y$  축과의 교점을 B 라 할 때,  $\triangle ABC$  의 넓이는?



- ① 4      ② 6      ③ 8      ④ 10      ⑤ 12

43. 다음 그림은  $y = -x^2 - 4x + 5$  의 그래프를 나타낸 것이다. 꼭짓점의 좌표를 A, x 축과 만나는 점을 B, C 라 할 때,  $\triangle ABC$  의 넓이는?



- ① 30      ② 27      ③ 24      ④ 21      ⑤ 18

44. 세 점  $(0, 6)$ ,  $(-1, 0)$ ,  $(1, 8)$  을 지나는 포물선의 식은?

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ① $y = 2x^2 - 4x + 6$  | ② $y = 2x^2 + 4x + 6$  |
| ③ $y = -2x^2 - 4x + 6$ | ④ $y = -2x^2 + 4x + 6$ |
| ⑤ $y = -2x^2 + 4x - 6$ |                        |

45. 세 점  $(-4, 0)$ ,  $(2, 0)$ ,  $(0, 4)$ 를 지나는 포물선의 식으로 옳은 것은?

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| ① $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$ | ② $y = -x^2 - 2x + 4$  |
| ③ $y = -2x^2 + 4x + 1$          | ④ $y = -2x^2 - 4x + 5$ |
| ⑤ $y = -3x^2 + 5x + 1$          |                        |

46.  $y = -2x^2 + 4x + 3k$  의 그래프를  $y$  축 방향으로  $-4$  만큼 평행이동시키면 최댓값  $10$  을 갖는다. 이 때,  $k$  의 값을 구하면?

①  $-1$       ②  $1$       ③  $2$       ④  $3$       ⑤  $4$

47. 이차함수  $y = ax^2 - 4x - c$  는  $x = 2$  일 때, 최댓값 1 을 가진다. 이때,  
 $ac$  의 값은?

① -1      ② -2      ③ -3      ④ -4      ⑤ -5

48. 이차함수  $y = ax^2 + bx + c$  의 최댓값이 9이고 이차방정식  $ax^2 + bx + c = 0$  의 두 근이 -2, 4 일 때,  $abc$  의 값은? (단,  $a, b, c$  는 상수이다.)

① -10      ② -12      ③ -14      ④ -16      ⑤ -18

49. 합이 28 인 두 자연수의 곱의 최댓값을 구하면?

- ① 100      ② 121      ③ 144      ④ 169      ⑤ 196

50. 지상에서 초속 50m 의 속력으로 쏘아 올린 공의  $t$  초 후의 높이는  $(50t - 5t^2)m$  이다. 이 공의 높이가 지상으로부터 최대가 되는 것은 쏘아 올린지 몇 초 후인가?

- ① 5 초 후
- ② 7 초 후
- ③ 8 초 후
- ④ 10 초 후
- ⑤ 알 수 없다