1. 사차방정식 $x^4 - 11x^2 + 30 = 0$의 네 근 중 가장 작은 근을 a, 가장 큰 근을 b라 할 때, $a^2 + b^2$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

해설

$x^4 - 11x^2 + 30 = 0$
$(x^2 - 5)(x^2 - 6) = 0$
$\therefore\ x = \pm\sqrt{5},\ x = \pm\sqrt{6}$
가장 작은 근 $a = -\sqrt{6}$, 가장 큰 근 $b = \sqrt{6}$
$\therefore\ a^2 + b^2 = 6 + 6 = 12$

2. 사차방정식 $x^4 + 3x^2 - 10 = 0$의 모든 실근의 곱은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

해설

$x^4 + 3x^2 - 10 = 0$에서
$x^2 = t$로 치환하면
$t^2 + 3t - 10 = 0$, $(t+5)(t-2) = 0$
$\therefore\ t = -5$ 또는 $t = 2$
$\therefore\ x = \pm\sqrt{5}i$ 또는 $x = \pm\sqrt{2}$
따라서 모든 실근의 곱은
$\sqrt{2} \times (-\sqrt{2}) = -2$

3. x에 대한 삼차방정식 $x^3+2x^2+(k+1)x+k=0$의 근이 모두 실근이 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $-1 \le k$　② $1 \le k < 2$　③ $k > 0$

④ $-1 < k \le \frac{1}{4}$　⑤ $k \le \frac{1}{4}$

해설

방정식 $x^3+2x^2+(k+1)+k=0$을 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$(x+1)(x^2+x+k)=0$

이 때, 주어진 방정식의 모든 근이 실근이 되려면

방정식 $x^2+x+k=0$이 실근을 가져야 하므로

$D=1^2-4k \ge 0$

$\therefore\ k \le \frac{1}{4}$

4. 사차방정식 $x^4 + 3x^2 + a = 0$의 한 근이 1일 때, 허근은?

① $\pm i$ ② $\pm 2i$ ③ $\pm 3i$ ④ $\pm 4i$ ⑤ $\pm 5i$

해설

한 근이 1이므로 사차방정식 $x^4 + 3x^2 + a = 0$에 대입하면
$1 + 3 + a = 0, \quad \therefore a = -4$
방정식 $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$에서 $x^2 = t$로 치환하면
$t^2 + 3t - 4 = 0$, $(t+4)(t-1) = 0$, $(x^2+4)(x^2-1) = 0$
$\therefore x = \pm 2i$ 또는 $x = \pm 1$
따라서, 주어진 방정식의 허근은 $\pm 2i$이다.

5. 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + bx - 3 = 0$ 의 한 근이 $1 + \sqrt{2}i$ 일 때, 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

① -15 ② -10 ③ 0 ④ 5 ⑤ 10

해설

한 근이 $1 + \sqrt{2}i$이므로 켤레근은 $1 - \sqrt{2}i$
세 근이 α, β, γ일때 $\alpha\beta\gamma = 3$이므로, $\alpha = 1 + \sqrt{2}i$, $\beta = 1 - \sqrt{2}i$
라 하면, $(1 + \sqrt{2}i)(1 - \sqrt{2}i) \cdot \gamma = 3$
$3 \cdot \gamma = 3$
$\gamma = 1$
$\alpha + \beta + \gamma = -a = (1 + \sqrt{2}i) + (1 - \sqrt{2}i) + 1 = 3$
$a = -3$
$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\beta = b = 3 + (1 - \sqrt{2}i) \cdot 1 + 1 \cdot (1 + \sqrt{2}i) = 5$
$b = 5$
$\therefore\ ab = (-3) \cdot 5 = -15$

6. 계수가 유리수인 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$의 한근이 $2 - \sqrt{3}$일 때, $\dfrac{c-b}{a}$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

해설

계수가 유리수인 이차방정식에서 $2 - \sqrt{3}$이 근이면 $2 + \sqrt{3}$도 근이므로

근과 계수의 관계에 의하여 $-\dfrac{b}{a} = \left(2 + \sqrt{3}\right) + \left(2 - \sqrt{3}\right) = 4$

$\dfrac{c}{a} = \left(2 + \sqrt{3}\right)\left(2 - \sqrt{3}\right) = 1$

$\therefore \dfrac{c-b}{a} = \dfrac{c}{a} + \left(-\dfrac{b}{a}\right) = 1 + 4 = 5$

7. 연립방정식 $\begin{cases} 2x-y-5=0 \\ x^2+y^2=25 \end{cases}$ 의 근 x, y가 $xy=a$, $x+y=b$를 만족할 때, $a-b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

해설

$\begin{cases} 2x-y-5=0 & \cdots ㉠ \\ x^2+y^2=25 & \cdots ㉡ \end{cases}$

㉠식을 정리해서

$y=2x-5$ 를 ㉡식에 대입한다.

$x^2+(2x-5)^2=25$,

$5x^2-20x=0$, $x(x-4)=0$

$\therefore\ x=0,\ 4$

i) $x=0$일 때, $y=-5$

$\therefore a=0,\ b=-5$

$\therefore a-b=5$

ii) $x=4$일 때, $y=3$

$\therefore a=12,\ b=7$

$\therefore a-b=5$

8. x, y가 연립방정식 $\begin{cases} x^2+4xy+y^2=10 \\ x-y=2 \end{cases}$ 를

만족시킬 때, $(x+y)^2$의 값을 구하면?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 10

해설

$(x-y)^2=4$에서

$$\begin{cases} x^2-2xy+y^2=4 & \cdots ㉠ \\ x^2+4xy+y^2=10 & \cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡ − ㉠ : $6xy=6$,

$\therefore\ xy=1$

$\therefore\ (x+y)^2=(x-y)^2+4xy$

$=4+4\cdot 1=8$

해설

실제로 연립방정식을 풀면,

$x=y+2$를 ㉡에 대입하면

$(y+2)^2+4y(y+2)+y^2=10$

$6y^2+12y-6=0,\ y^2+2y-1=0$

근의 공식을 이용하면,

$\therefore\ y=-1\pm\sqrt{2},\ x=1\pm\sqrt{2}$(복호동순)

$\therefore\ (x+y)^2=((1\pm\sqrt{2})+(-1\pm\sqrt{2}))^2$

$=(\pm 2\sqrt{2})^2=8$

9. 연립방정식 $\begin{cases} 2x^2 - 3xy + y^2 = 0 \\ 5x^2 - y^2 = 4 \end{cases}$ 의 근을 $x = \alpha,\ y = \beta$라 할 때, $\alpha + \beta$의 최댓값은?

① 4 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 10

해설

$\begin{cases} 2x^2 - 3xy + y^2 = 0 & \cdots ① \\ 5x^2 - y^2 = 4 & \cdots ② \end{cases}$

①식을 인수분해하면

$(2x - y)(x - y) = 0 \quad \therefore\ y = 2x,\ y = x$

②식에 대입하면

$y = 2x$일 때 $5x^2 - (2x)^2 = 4,\ x^2 = 4,\ x = \pm 2,\ y = \pm 4$

$y = x$일 때 $5x^2 - x^2 = 4,\ \ 4x^2 = 4\ x^2 = 1,\ \ x = \pm 1,\ y = \pm 1$

$\therefore \alpha + \beta = 6,\ -6,\ 2,\ -2$

$\therefore \alpha + \beta$ 의 최댓값은 6

10. 다음 연립방정식의 해가 아닌 것은?

$$\begin{cases} x^2 - xy - 2y^2 = 0 \\ 2x^2 + y^2 = 9 \end{cases}$$

① $x = \sqrt{3},\ y = -\sqrt{3}$　② $x = 2,\ y = 1$

③ $x = -\sqrt{3},\ y = \sqrt{3}$　④ $x = -2,\ y = -1$

⑤ $x = 2,\ y = -1$

해설

$x^2 - xy - 2y^2 = 0$

$\Rightarrow (x+y)(x-2y) = 0$

$\Rightarrow \quad x = -y$ 또는 $x = 2y$

i) $x = -y$ $2x^2 + y^2 = 2y^2 + y^2 = 9$

$y = \pm\sqrt{3}, \quad x = \mp\sqrt{3}$

ii) $x = 2y$ $2x^2 + y^2 = 8y^2 + y^2 = 9$

$y = \pm 1, \quad x = \pm 2$

$\therefore$ 해는 $\begin{cases} x = \pm\sqrt{3} \\ y = \mp\sqrt{3} \end{cases}$, $\begin{cases} x = \pm 2 \\ y = \pm 1 \end{cases}$ (복호동순)

11. 연립방정식 $\begin{cases} xy+x+y=-5 \cdots\cdots ① \\ x^2+xy+y^2=7 \cdots\cdots ② \end{cases}$ 을 만족하는 x, y에 대해 $x+y$의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하면?

① 0 ② 1 ③ −1 ④ 2 ⑤ −2

해설

$x+y=u,\ xy=v$ 로 놓으면
①은 $u+v=-5 \cdots\cdots ③$
②는 $u^2-v=7 \cdots\cdots ④$
③, ④에서 v 를 소거하면
$u^2+u-2=0$
$\therefore\ (u-1)(u+2)=0$
$u=1$ 일 때, $v=-6$ 이므로
$t^2-t-6=0$ 에서 $t=-2,\ 3$
$u=-2$ 일 때, $v=-3$ 이므로
$t^2+2t-3=0$ 에서 $t=1,\ -3$
따라서, 구하는 근은

$\begin{cases} x=-2 \\ y=3 \end{cases}$ $\begin{cases} x=3 \\ y=-2 \end{cases}$ $\begin{cases} x=1 \\ y=-3 \end{cases}$ $\begin{cases} x=-3 \\ y=1 \end{cases}$

$\therefore\ M=1,\ \ m=-2\ \therefore\ M+m=-1$

12. 연립방정식 $x^2+y^2=5(xy-1)=10xy-5(x+y)$ 의 해를 꼭지점으로 하는 도형의 넓이를 구하면?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

해설

$(x+y)^2-2xy=5(xy-1)=10xy-5(x+y)$ 에서
$x+y=u,\ xy=v$ 라 놓으면

$\begin{cases} u^2-2v=5(v-1) \\ 5(v-1)=10v-5u \end{cases}$ 에서 $\begin{cases} u^2=7v-5 \\ v=u-1 \end{cases}$ 을 풀면

$\therefore \begin{cases} u=3 \\ v=2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} u=4 \\ v=3 \end{cases}$

$\therefore \begin{cases} x+y=3 \\ xy=2 \end{cases}$ ····· ㉠

$\begin{cases} x+y=4 \\ xy=3 \end{cases}$ ····· ㉡

㉠의 $x,\ y$ 는 $t^2-3t+2=0$ 의 근이므로
$(x,\ y)=(1,\ 2),\ (2,\ 1)$
㉡의 $x,\ y$ 는 $t^2-4t+3=0$ 의 근이므로
$(x,\ y)=(1,\ 3),\ (3,\ 1)$

구하는 도형은 그림의 사각형이다.

$\therefore S=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2-\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

13. 방정식 $xy+4x-2y-11=0$을 만족하는 정수 x, y에 대하여 xy의 값이 아닌 것은?

① -15 ② -7 ③ -3 ④ 5 ⑤ 15

해설

$xy+4x-2y-11=0$에서 $(x-2)(y+4)=3$
x, y가 정수이므로
$(x-2,\ y+4)=(1,3),(-1,-3),(3,1),(-3,-1)$
$\therefore\ (x,\ y)=(3,-1),(1,-7),(5,-3),(-1,-5)$
$\therefore\ xy=-3,-7,-15,5$

14. 다음 방정식을 만족하는 양의 정수의 값이 아닌 것은?

$$x^2 - 3xy + 2y^2 + 6 = 0$$

① 5 ② 7 ③ 8 ④ 10 ⑤ 13

해설

$x^2-3xy+2y^2 = -6$의 좌변을 인수분해하면 $(x-y)(x-2y) = -6$
이 때, x, y는 양의 정수이므로 $x-y$, $x-2y$도 정수이고 $x-y > x-2y$이다.
따라서, $x-y$, $x-2y$의 값은 다음 표와 같다.

$x-y$	1	2	3	6
$x-2y$	-6	-3	-2	-1

그러므로 각각을 연립하여 풀면 구하는 x, y의 값은

$\begin{cases} x=8 \\ y=7 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=7 \\ y=5 \end{cases}$ 또는

$\begin{cases} x=8 \\ y=5 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=13 \\ y=7 \end{cases}$