

1. 두 다항식  $A = 2x^3 + 4x^2 - 7$ ,  $B = x^2 + x - 2$ 에 대하여  $A - 2B$ 를 간단히 한 것은?

- ①  $2x^3 + 2x^2 - 2x - 3$       ②  $2x^3 + 2x^2 + 2x - 3$   
③  $2x^3 + 2x^2 + 2x + 3$       ④  $2x^3 + 6x^2 - 2x + 3$   
⑤  $2x^3 + 6x^2 - 2x - 3$

2. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ①  $\sqrt{-8} = 2\sqrt{2}i$
- ② 3의 허수부분은 0이다.
- ③  $\sqrt{-2}$ 는 순허수이다.
- ④  $b = 1$  이면  $a + (b - 1)i$ 는 실수이다.
- ⑤ 제곱하여  $-3$ 이 되는 수는  $\pm\sqrt{3}i$ 이다.

3. 등식  $x + y + (x - 2y)i = 1 + 7i$ 을 만족하는 두 실수  $x, y$ 에 대하여  $xy$ 의 값은? (단,  $i = \sqrt{-1}$ )

- ① 3      ② -3      ③ 6      ④ -6      ⑤ 8

4. 복소수  $\frac{2+3i}{1-i}$  를  $a+bi$  꼴로 나타낼 때,  $a+b$  의 값은?

- ① -1      ② 0      ③ 1      ④ 2      ⑤ 3

5.  $\sqrt{-3} \cdot \sqrt{-5}$  를 계산하면?

- |                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| ① $\sqrt{15}$   | ② $-\sqrt{15}$ | ③ $\sqrt{15}i$ |
| ④ $-\sqrt{15}i$ | ⑤ $-15$        |                |

6. 이차방정식  $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라 하고 판별식을  $D$ 라고 할 때  $|\alpha - \beta|$ 는 다음 중 어느 것과 같은가?

①  $\frac{\sqrt{D}}{a}$

②  $\frac{-\sqrt{D}}{a}$

③  $\frac{\sqrt{D}}{|a|}$

④  $-\frac{\sqrt{D}}{|a|}$

⑤  $-\frac{D}{|a|}$

7.  $z = \frac{2}{1+i}$  때 대하여  $z^2 - 2z + 3$ 의 값은? (단,  $i = \sqrt{-1}$ )

- ① 0      ② 1      ③ 2      ④ 3      ⑤ -1

8.  $z = 1 - i$  일 때,  $\frac{\bar{z} - 1}{z} - \frac{z - 1}{\bar{z}}$ 의 값은?

- ①  $-i$       ②  $i$       ③  $-2i$       ④  $2i$       ⑤ 1

9. 복소수  $z$ 와 그 켤레복소수  $\bar{z}$ 에 대하여 다음을 만족하는  $z$ 를 구하면?

$$z + \bar{z} = 4, \quad z \cdot \bar{z} = 7$$

- ①  $z = 1 \pm \sqrt{3}i$
- ②  $z = 2 \pm \sqrt{3}i$
- ③  $z = 3 \pm \sqrt{3}i$
- ④  $z = 1 \pm 2\sqrt{3}i$
- ⑤  $z = 2 \pm 2\sqrt{3}i$

10.  $x = \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}$  일 때,  $x^2 - x + 1$  의 값은?

- ① -1      ② 0      ③ 1  
④  $\frac{1 - \sqrt{3}i}{2}$       ⑤  $\frac{1 + \sqrt{3}i}{2}$

11. 이차방정식  $x^2 + (m+1)x + m + 4 = 0$ 이 중근을 가질 때, 모든 실수  $m$ 의 값의 합을 구하면?

① -3      ② 0      ③ 2      ④ 3      ⑤ 5

12.  $x^2 - px + q = 0$  의 두 근이  $\alpha, \beta$ 이다.  $\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = 2$  일 때  $p^2 + q^2$ 의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

13. 이차방정식  $2x^2 - 6x + 1 = 0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라 할 때,  $\alpha + \beta$ ,  $\alpha\beta$ 를 두 근으로 하는 이차방정식은?

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ① $2x^2 - 6x + 1 = 0$ | ② $x^2 - 6x + 1 = 0$  |
| ③ $x^2 - 7x + 3 = 0$  | ④ $2x^2 + 6x - 1 = 0$ |
| ⑤ $2x^2 - 7x + 3 = 0$ |                       |

14. 다항식  $2x^2 + 5ax - a^2$ 을 다항식  $P(x)$ 로 나눈 몫이  $x + 3a$ , 나머지가  $2a^2$  일 때, 다항식  $(x + a)P(x)$ 를 나타낸 것은?

- ①  $x^2 + 2ax - 2a^2$       ②  $x^2 - a^2$   
③  $2x^2 + 3ax + a^2$       ④  $2x^2 - 3ax - a^2$   
⑤  $2x^2 + ax - a^2$

15. 다음 식 중에서 옳지 않은 것을 고르면?

- ①  $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
- ②  $(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$
- ③  $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- ④  $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- ⑤  $(a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1) = a^4 - a^2 + 1$

16. 임의의 실수  $x$ 에 대하여 등식  $(x-2)(x+2)^2 = (x-1)^3 + a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ 이 성립할 때,  $a(b+c)$ 의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

17.  $x$ 의 다항식  $x^3 + ax + b$ 를  $x^2 - 3x + 2$ 로 나눌 때, 나머지가  $2x + 1$ 이 되도록 상수  $a, b$ 의 값의 합을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

18.  $x$ 에 대한 다항식  $x^3 + 2x^2 - ax + b$ 가  $x^2 + x - 2$ 로 나누어 떨어질 때,  
 $a^2 + b^2$ 의 값을 정하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

19. 다음 중  $x^4 + x^3 - 11x^2 - 9x + 18$ 의 인수가 아닌 것은?

- ①  $x - 1$     ②  $x + 1$     ③  $x - 3$     ④  $x + 3$     ⑤  $x + 2$

20. 다음 식을 인수분해하면  $x^4 - 3x^2y^2 + 4y^4 = (x^2 + axy + by^2)(x^2 + cxy + dy^2)$  일 때,  $a + b + c + d$ 의 값을 구하여라. ( $a, b, c, d$ 는 상수)

▶ 답: \_\_\_\_\_

**21.**  $\frac{899^3 + 1}{899 \times 898 + 1}$  의 양의 약수의 개수는?

- ① 27 개    ② 25 개    ③ 21 개    ④ 18 개    ⑤ 15 개

22. 복소수  $z$ 에 대하여 다음 보기 중 항상 실수인 것을 모두 고르면?(단,  $\bar{z}$ 는  $z$ 의 결례복소수이고  $z \neq 0$ 이다)

$\textcircled{\textcircled{1}} \ z + \bar{z}$	$\textcircled{\textcircled{2}} \ z\bar{z}$	$\textcircled{\textcircled{3}} \ (z - \bar{z})^2$
$\textcircled{\textcircled{4}} \ \frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}}$	$\textcircled{\textcircled{5}} \ \frac{\bar{z}}{z}$	

- ① ⑦                          ② ⑦ , ⑧  
③ ⑦ , ⑧ , ⑨                  ④ ⑦ , ⑧ , ⑨ , ⑩  
⑤ ⑦ , ⑧ , ⑨ , ⑩ , ⑪