

1.  $\frac{18}{2^3 \times 3^2 \times 5 \times 11} \times N$  이 유한소수로 나타내어 질 때, N의 값 중에서 가장 작은 자연수는?

① 10      ② 11      ③ 12      ④ 13      ⑤ 14

해설

$\frac{18}{2^3 \times 3^2 \times 5 \times 11} = \frac{1}{2^2 \times 5 \times 11}$  이므로 N의 값은 11의 배수가 들어가야 한다.

따라서 가장 작은 수는 11이다.

2. 다음 중 가장 큰 수는?

- ① 0.72      ②  $0.\dot{7}\dot{2}$       ③  $0.\dot{7}$       ④ 0.7      ⑤  $0.\dot{7}\dot{2}$

해설

- ① 0.72  
②  $0.\dot{7}\dot{2} = 0.7222\cdots$   
③  $0.\dot{7} = 0.777\cdots$   
④ 0.7  
⑤  $0.\dot{7}\dot{2} = 0.727272\cdots$

따라서 가장 큰 수는  $0.\dot{7}$ 이다.

3.  $4^3 = A$  라 할 때,  $16^6$ 을  $A$ 를 이용하여 나타내면?

- ①  $A$       ②  $A^2$       ③  $A^3$       ④  $A^4$       ⑤  $A^5$

해설

$$16^6 = (4^2)^6 = 4^{12} = (4^3)^4 = A^4 \text{이다.}$$

4. 다음 중 옳은 것은?

- ①  $3ab \div a \times b = 3b^3$
- ②  $10a^2 \div 5ab^2 = \frac{2a}{b^2}$
- ③  $6a^2 \div 2a \div a = 3a$
- ④  $12a^2b \div (2ab) \times 2a = 12a$
- ⑤  $6a^2b^7 \div (-3b^2)^2 \times (-a^2b^2) = 2b$

해설

- ①  $3ab \times \frac{1}{a} \times b = 3b^2$
- ③  $6a^2 \times \frac{1}{2a} \times \frac{1}{a} = 3$
- ④  $12a^2b \times \frac{1}{2ab} \times 2a = 12a^2$
- ⑤  $6a^2b^7 \times \frac{1}{9b^4} \times (-a^2b^2) = -\frac{2a^4b^5}{3}$

5.  $(8x^3y^2)^2 \div (-4x^2y)^3 \times \boxed{\quad} = 3y$  일 때,  $\boxed{\quad}$  안에 들어갈 수를 써넣으라.

▶ 답:

▷ 정답: -3

해설

$$\frac{64x^6y^4}{-64x^6y^3} \times \boxed{\quad} = 3y$$

$$-y \times \boxed{\quad} = 3y$$

$$\boxed{\quad} = 3y \div (-y)$$

$$\therefore \boxed{\quad} = -3$$

6. 어떤 식  $A$ 에  $2x^2 + 3x - 2$ 를 더해야 할 것을 잘못하여 빼었더니  $-5x^2 + 3x + 2$ 가 되었다. 바르게 계산한 결과는?

- ①  $-3x^2 + 6x$       ②  $-3x^2 - 6x$       ③  $-x^2 + 9x - 2$   
④  $x^2 + 9x - 2$       ⑤  $-x^2 - 9x - 2$

해설

어떤 식이  $A$ 인가?  $A$ 에  $2x^2 + 3x - 2$ 를 더해야 할 것을 잘못하여 빼었더니  $-5x^2 + 3x + 2$ 가 되었다.

$$A - (2x^2 + 3x - 2) = -5x^2 + 3x + 2$$

$$A = -3x^2 + 6x$$

$$\text{바르게 계산하면 } -3x^2 + 6x + (2x^2 + 3x - 2) = -x^2 + 9x - 2$$

7.  $\left(x - \frac{1}{3}\right) \left(x + \frac{1}{7}\right) = x^2 + ax + b$  일 때, 상수  $a, b$  의 합  $a + b$ 의 값은?

- Ⓐ  $-\frac{5}{21}$  Ⓑ  $-\frac{4}{21}$  Ⓒ  $-\frac{1}{21}$  Ⓓ  $\frac{1}{7}$  Ⓕ  $\frac{4}{21}$

해설

$$\begin{aligned} \left(x - \frac{1}{3}\right) \left(x + \frac{1}{7}\right) &= x^2 + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{7}\right)x + \left(-\frac{1}{3}\right) \times \frac{1}{7} \\ &= x^2 - \frac{4}{21}x - \frac{1}{21} \\ &= x^2 + ax + b \end{aligned}$$

$x$ 의 계수는  $-\frac{4}{21}$ 이고, 상수항은  $-\frac{1}{21}$ 므로  $a + b$ 는  $\left(-\frac{4}{21}\right) + \left(-\frac{1}{21}\right) = -\frac{5}{21}$ 이다.

8.  $(x+y)(x-y-2)$ 를 전개한 것은?

- ①  $x^2 - y^2 - 2x - 2y$       ②  $x^2 - y^2 - 2x + 2y$   
③  $x^2 - y^2 + 2x + 2y$       ④  $x^2 + y^2 - 2x - 2y$   
⑤  $x^2 - y^2 + 2x - 2y$

해설

$$\begin{aligned}(x+y)(x-y-2) \\ = (x+y)(x-y) - 2(x+y) \\ = x^2 - y^2 - 2x - 2y\end{aligned}$$

9. 다음 식  $\frac{2a^2b + 3ab^2}{ab} - \frac{4ab - 5b^2}{b}$  을 간단히 하면?

- ①  $-2a + 8b$       ②  $-2a - 8b$       ③  $6a - 8b$   
④  $6a - 2b$       ⑤  $2a + 8b$

해설

$$\frac{2a^2b + 3ab^2}{ab} - \frac{4ab - 5b^2}{b} = 2a + 3b - 4a + 5b = -2a + 8b$$

10.  $x = 2a - b$ ,  $y = -3a + b$  일 때,  $2x - 5y$ 를  $a$ ,  $b$ 에 관한 식으로 옮기 나타낸 것은?

- ①  $19a - 17b$       ②  $19a - 7b$       ③  $19a - 3b$   
④  $19a + 7b$       ⑤  $19a + 3b$

해설

$$\begin{aligned} x &= 2a - b \text{ } \circ \text{므로 } 2x = 2(2a - b) = 4a - 2b \\ y &= -3a + b \text{ } \circ \text{므로 } 5y = 5(-3a + b) = -15a + 5b \\ 2x - 5y &= 2(2a - b) - 5(-3a + b) \\ &= 4a - 2b + 15a - 5b \\ &= 19a - 7b \end{aligned}$$

11.  $x, y$  가 자연수일 때, 일차방정식  $3x + 2y = 12$  을 만족하는 순서쌍  $(x, y)$  의 개수를 구하여라.

▶ 답: 개

▷ 정답: 1 개

해설

(2, 3)

12. 미지수가  $x, y$ 인 일차방정식  $ax + 2y = 5$ 의 한 해가  $(3, -2)$ 일 때,  
 $a$ 의 값은?

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

해설

$$x = 3, y = -2 \text{을 대입하면 } 3a - 4 = 5$$

$$\therefore a = 3$$

13. 다음 연립방정식 중 해가  $x = 3, y = 2$  인 것은?

$$\textcircled{1} \quad \begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \quad \begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$\textcircled{5} \quad \begin{cases} x + 2y = 7 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \quad \begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$$

해설

$x = 3, y = 2$  를 각각의 연립방정식에 대입하여 두 방정식이  
동시에 만족하면 연립방정식의 해이다.

14. 연립방정식  $\begin{cases} 4x - 3y = 5 \\ y = -x + 3 \end{cases}$  의 해를 구하면?

- ①  $x = 2, y = 1$       ②  $x = -2, y = 1$   
③  $x = 2, y = 5$       ④  $x = -4, y = 7$   
⑤  $x = 14, y = -11$

해설

대입법을 이용하면

$$4x - 3(-x + 3) = 5$$

$$7x = 14, x = 2$$

$x$  값을 첫 번째 식에 대입하면  $y = 1$

15. 연립방정식  $\begin{cases} 2x - y = 20 \\ 2y - x = k \end{cases}$  를 만족하는  $x$ 의 값과  $y$ 의 값의 차가 4 일 때, 상수  $k$ 의 값은? (단,  $x > y$ )

① -12      ② -6      ③ 4      ④ 6      ⑤ 8

해설

$$x - y = 4 \quad | \text{으로 } \begin{cases} 2x - y = 20 \\ x - y = 4 \end{cases} \text{ 를 연립하면 } x = 16, y = 12,$$

위에서 구한 해를  $2y - x = k$ 에 대입하면,  $24 - 16 = k$

$$\therefore k = 8$$

16. 연립방정식  $\begin{cases} 3x - 2y = a \\ y = bx - 1 \end{cases}$  의 해가 존재하지 않을 때,  $a$ ,  $b$ 의 값의 조건으로 알맞은 것은?

- ①  $a \neq 2$ ,  $b = \frac{3}{2}$       ②  $a \neq 1$ ,  $b = 3$   
③  $a = 2$ ,  $b = 1$       ④  $a \neq -2$ ,  $b = -\frac{3}{2}$   
⑤  $a = -1$ ,  $b = -2$

해설

연립방정식의 해가 없어야 하므로  
두 번째 식의 양변에 2를 곱하면  $2y = 2bx - 2$  이고  
이 식을 첫 번째 식에 대입하면,  $3x - 2bx + 2 = a$  이다.  
그런데 이 식이  $0 \cdot x = k$  ( $k \neq 0$ ) 꼴이 되어야 하므로  
 $3 - 2b = 0$ ,  $a - 2 \neq 0$  이다.

따라서  $a \neq 2$ ,  $b = \frac{3}{2}$  이다.

17. 두 자리 자연수가 있다. 각 자리에 있는 수의 합은 12이고, 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 두 자리의 수는 처음 수보다 18이 더 크다. 처음 자연수를 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 57

해설

$$\text{처음 수 : } 10x + y$$

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ 10x + y = x + 10y - 18 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 12 & \cdots ① \\ x - y = -2 & \cdots ② \end{cases}$$

① + ② 하면  $x = 5, y = 7$ 이다.

$$\therefore 10 \times 5 + 7 = 57$$

18. 하영이는 100 원짜리 우표와 200 원짜리 우표를 합쳐서 2000 원을 지불하였다. 우표를 모두 12 장 샀다면 200 원 짜리 우표는 몇 장 샀는지 구하여라.

▶ 답:

장

▷ 정답: 8 장

해설

100 원짜리 우표  $x$  장, 200 원짜리 우표  $y$  장을 샀다고 하면

$$\begin{cases} 100x + 200y = 2000 \\ x + y = 12 \end{cases}$$

연립하여 풀면  $x = 4$ ,  $y = 8$  이다.

19. 갑, 을 두 사람이 과일가게에서 자두와 수박을 샀다. 갑은 자두 4 개, 수박 1 개를 10000 원에 샀고, 을은 자두 2 개와 수박 2 개를 17000 원에 샀다. 자두 1 개의 값을  $x$  원, 수박 1 개의 값을  $y$  원이라고 할 때,  $y - x$  의 값은?

① 5500    ② 6000    ③ 6500    ④ 7000    ⑤ 7500

해설

자두 한 개의 가격을  $x$  원, 수박 한 개의 가격을  $y$  원이라고 하면

$$\begin{cases} 4x + y = 10000 & \cdots (1) \\ 2x + 2y = 17000 & \cdots (2) \end{cases}$$

$$(1) \times 2 - (2) \text{하면 } 6x = 3000$$

$$x = 500$$

$$\text{이를 (1)에 대입하면 } 2000 + y = 10000$$

$$y = 8000$$

$$\therefore y - x = 8000 - 500 = 7500(\text{원})$$

20. 수지는 수학 시험에서 3 점짜리 문제를 4 점짜리 문제보다 6 문제를 더 맞혀 점수가 81 점이었다. 3 점짜리 문제는 몇 개를 맞혔는지 구하면?

- ① 11 개    ② 12 개    ③ 13 개    ④ 14 개    ⑤ 15 개

해설

3 점짜리 문제의 수를  $x$  개라 하면 4 점짜리 문제의 수는  $(x - 6)$  개이다.

$$3x + 4(x - 6) = 81$$

$$7x = 105$$

$$\therefore x = 15$$

21. 분수  $\frac{13}{250}$  를 소수로 나타내는 과정이다.  $\frac{bc}{a}$  의 값을 구하여라.

$$\frac{13}{250} = \frac{13 \times a}{250 \times a} = \frac{52}{b} = c$$

▶ 답:

▷ 정답: 13

해설

$$\frac{13 \times 4}{250 \times 4} = \frac{52}{1000} = \frac{52}{10^3} = 0.052$$

$$a = 4, b = 1000, c = 0.052$$

$$\therefore \frac{52}{4} = 13$$

22. 다음 수 중에서  $\frac{1}{4}$  보다 크고  $\frac{1}{2}$  보다 작은 수는 모두 몇 개인가?

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5

- ① 없다      ② 1 개      ③ 2 개      ④ 3 개      ⑤ 4 개

해설

$$\frac{1}{4} < x < \frac{1}{2}$$

$$0.25 < x < 0.5$$

$$\therefore x = 0.\dot{3}, 0.\dot{4}$$

23. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ① 모든 순환소수는 유리수이다.
- ② 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.
- ③ 모든 무한소수는 순환소수이다.
- ④ 모든 유한소수는 순환소수로 나타낼 수 있다.
- ⑤ 모든 무한소수는 분수로 나타낼 수 있다.

해설

- ② 정수가 아닌 유리수는 모두 무한소수로 나타낼 수 있다.
- ③ 무한소수 중에는 순환하지 않는 소수도 있다.
- ⑤ 순환하지 않는 무한소수는 분수로 나타낼 수 없다.

24. 지수법칙을 이용하여  $2^9 \times 5^5$  은 몇 자리 수인지 구하여라.

▶ 답:

자리 수

▷ 정답: 일곱 자리 수

해설

$$2^9 \times 5^5 = 2^5 \cdot 2^4 \times 5^5 = (2 \times 5)^5 \times 16 = 16 \times 10^5$$

따라서 일곱 자리의 수이다.

25.  $2^{x+2} + 2^x = 160$  일 때,  $x$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 5


해설

$$2^{x+2} + 2^x = 5 \times 2^x = 160$$

$$2^x = 32 = 2^5$$

$$\therefore x = 5$$

26. 밑면의 반지름의 길이가  $2r$  cm, 높이가  $2h$  cm 인 원기둥 ②와 밑면의 반지름의 길이가  $r$  cm, 높이가  $2h$  cm 인 원기둥 ④가 있다. ②의 부피는 ④의 부피의 몇 배인지 빙간에 알맞은 답을 써넣어라.



$$\textcircled{2} \text{의 부피} : \textcircled{4} \text{의 부피} = ( ) : 1$$

▶ 답 :

▷ 정답 : 4

해설

②의 부피는  $(2r)^2 \times \pi \times 2h = 8\pi r^2 h$  이다.

④의 부피는  $r^2 \pi \times 2h = 2\pi r^2 h$  이다.

따라서 ②의 부피와 ④의 부피 비는 4 : 1 이다.

27.  $(2x - 7y + 4)(3x + y)$  를 전개했을 때,  $y$  의 계수를 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 4

해설

$$(2x - 7y + 4)(3x + y) = 6x^2 + 2xy - 21xy - 7y^2 + 12x + 4y = \\ 6x^2 - 19xy - 7y^2 + 12x + 4y$$

28. 곱셈 공식을 이용하여  $(x - a)(3x + 5)$  를 전개하였을 때,  $x$  의 계수가 17 이다. 이때 상수  $a$  의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답:  $a = -4$

해설

$$(x - a)(3x + 5) = 3x^2 + (5 - 3a)x - 5a$$

$x$  의 계수가 17 이므로

$$5 - 3a = 17$$

$$-3a = 12$$

$$\therefore a = -4$$

29. 연립방정식  $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - 2y = a \end{cases}$  의 해가  $(b, -5)$  일 때,  $a - 4b - 1$ 의 값은?

- ① -5      ② -3      ③ 0      ④ 3      ⑤ 5

해설

$2x + y = 1$  에  $x = b, y = -5$  를 대입하여  $b$  값을 구한다.

$$2b - 5 = 1, b = 3$$

$x - 2y = a$  에  $(3, -5)$  를 대입하여  $a$  값을 구한다.

$$3 - 2(-5) = a, a = 13$$

$$\therefore a - 4b - 1 = 13 - 4 \times 3 - 1 = 0$$

30. 연립방정식  $\frac{2x+7y-4}{3} = \frac{4x+5y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{4x+5y-6}{2}$  을 만족하는  $x, y$ 에 대하여  $x-y$ 의 값은?

① -2      ② -1      ③ 0      ④ 1      ⑤ 2

해설

$$\begin{cases} \frac{2x+7y-4}{3} = \frac{4x+5y-6}{2} \\ \frac{4x+5y+2}{4} = \frac{4x+5y-6}{2} \end{cases}$$

두 식의 양변에 6, 4를 각각 곱하면  $4x+14y-8 = 12x+15y-18$

$$8x+y=10 \cdots (1)$$

$$4x+5y+2=8x+10y-12$$

$$4x+5y=14 \cdots (2)$$

(2)  $\times 2 - (1)$  하면

$$9y=18$$

$$y=2$$

따라서  $x=1$  이다.

$$\therefore x-y=-1$$

31. 갑이 60m를 걷는 동안 을은 40m를 걷는 속력으로 1000m 떨어진 두 지점에서 갑과 을이 서로 마주보고 걷기 시작하였다. 만날 때까지 10분이 걸렸다면 갑의 속력을 구하여라.

▶ 답: m/min

▷ 정답: 60 m/min

해설

갑의 속력을  $x \text{ m/분}$ , 을의 속력을  $y \text{ m/분}$ 이라 하면

$$x : y = 3 : 2 \text{ 즉, } 3y = 2x \dots\dots \textcircled{1}$$

(거리) = (속력)  $\times$  (시간) 이므로

$$1000 = 10x + 10y \text{에서 } 2x + 2y = 200$$

$$\textcircled{1} \text{을 대입하면 } 5y = 200 \therefore y = 40, x = 60$$

32. 둘레의 길이가 400m인 트랙을 따라 주원이와 승원이가 각자 일정한 속력으로 자전거를 타고 있다. 승원이가 60m를 달리는 동안 주원이는 40m를 달린다고 할 때, 두 사람이 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 달리면 20초 만에 다시 만난다고 한다. 두 사람은 자전거로 1초에 각각 몇 m를 달리는지 구하여라.

▶ 답: m

▶ 답: m

▷ 정답: 승원 12m

▷ 정답: 주원 8m

해설

승원이의 속력을  $x\text{m}/\text{초}$ , 주원의 속력을  $y\text{m}/\text{초}$ 라 하면

$$x:y = 60:40$$

두 사람이 20초 후에 서로 만났으므로 두 사람이 달린 거리의 합은 트랙의 둘레의 길이와 같다.

$$20x + 20y = 400$$

두식을연립하면  $x = 12, y = 8$

따라서 승원이가 1초 동안 달린 거리는 12m

주원이가 1초 동안 달린 거리는 8m이다.

33. 쌀과 콩, 각각 100g에 들어 있는 열량과 단백질의 양이 다음 표와 같다고 한다. 이 두 곡물을 이용하여 1965cal의 열량과 36g의 단백질을 얻고자 할 때, 필요한 쌀과 콩의 양을 각각 차례대로 구하여라.

	열량(cal)	단백질(g)
쌀	350	6
콩	160	12

▶ 답: g

▶ 답: g

▷ 정답: 550g

▷ 정답: 25g

해설

필요한 쌀의 양을  $x$ g, 콩의 양을  $y$ g라 하면

$$\begin{cases} \frac{350}{100}x + \frac{160}{100}y = 1965 \cdots ① \\ \frac{6}{100}x + \frac{12}{100}y = 36 \cdots ② \end{cases}$$

$$\begin{cases} 35x + 16y = 19650 \cdots ①' \\ x + 2y = 600 \cdots ②' \end{cases}$$

$$①' - ②' \times 8$$

$$27x = 14850$$

$$\therefore x = 550(\text{g}), y = 25(\text{g})$$