

1. $x^2 + Ax + 8$ 가 완전제곱식으로 인수분해될 때, A 의 값을 구하여라.
(단, A 는 실수이다.)

▶ 답:

▶ 답:

▷ 정답: $A = 4\sqrt{2}$

▷ 정답: $A = -4\sqrt{2}$

해설

$$(x \pm \sqrt{8})^2 = x^2 \pm 4\sqrt{2}x + 8$$

$$A = \pm 4\sqrt{2}$$

2. 다항식 $6x^2 + x - 12$ 를 두 일차식으로 인수분해하였을 때, 두 일차식의 합은?

- ① $5x - 1$ ② $5x + 1$ ③ $7x + 1$
④ $7x - 1$ ⑤ $7x + 7$

해설

$$6x^2 + x - 12 = (3x - 4)(2x + 3)$$
$$\therefore (3x - 4) + (2x + 3) = 5x - 1$$

3. 다음 식 중 옳게 인수분해한 것은?

- ① $x^2 + 2xy + y^2 = (-x + y)^2$
- ② $ax - bx - a + b = (a - b)(x + 1)$
- ③ $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$
- ④ $6x^2 - x - 1 = (2x + 1)(3x - 1)$
- ⑤ $x^2 + 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$

해설

- ① $(x + y)^2$
- ② $(a - b)(x - 1)$
- ③ $(2x - 1)(3x + 1)$

4. 어떤 이차식을 지연이는 x 의 계수를 잘못 보고 $2(x+2)(x-9)$ 로 인수 분해하였고, 동현이는 상수항을 잘못 보고 $2(x-1)(x-2)$ 로 인수 분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수 분해한 것이 $a(x-b)(x-c)$ 일 때, abc 의 값은?

① 5 ② 12 ③ -36 ④ 36 ⑤ -18

해설

지연이는 $2x^2 - 14x - 36$ 에서 상수항 -36 을 맞게 보았고,


동현이는 $2x^2 - 6x + 4$ 에서 x 의 계수 -6 을 맞게 보았다.

따라서 $2x^2 - 6x - 36 = 2(x-6)(x+3)$

$\therefore a = 2, b = 6, c = -3$

$\therefore abc = -36$

5. 다음 도형의 색칠한 부분의 넓이를 나타낸 것이 아닌 것은?



- ① $(a - 2)(b - 1)$
② $a(b - 1) - 2(b - 1)$
③ $ab + 2$
④ $b(a - 2) - (a - 2)$
⑤ $ab - 2b - a + 2$

해설

색칠한 부분의 넓이는

- ① $(a - 2)(b - 1)$
② $a(b - 1) - 2(b - 1) = (a - 2)(b - 1)$
③ $ab + 2$
④ $b(a - 2) - (a - 2) = (a - 2)(b - 1)$
⑤ $ab - 2b - a + 2 = a(b - 1) - 2(b - 1) = (a - 2)(b - 1)$

6. $x(x+1)(x+2)(x+3)+1$ Ⓛ $(x^2+bx+c)^2$ 으로 인수분해 될 때 $b-c$ 의 값은?

- Ⓐ -2 Ⓑ -1 Ⓒ 0 Ⓓ 1 Ⓔ 2

해설

$$\begin{aligned} & x(x+1)(x+2)(x+3)+1 \\ &= x(x+3) \times (x+1)(x+2) + 1 \\ &= (x^2+3x)(x^2+3x+2) + 1 \\ & x^2+3x = A \text{ 라 하면} \\ & A^2 + 2A + 1 = (A+1)^2 = (x^2+3x+1)^2 \\ & \therefore b = 3, c = 1 \\ & \therefore b - c = 3 - 1 = 2 \end{aligned}$$

7. 다항식 $a^2x - a^2 - x + 1$ 을 인수분해했을 때, 아래 보기에서 그 인수가 될 수 있는 것을 모두 고른 것은?

[보기]

- | | | |
|-------------|-----------|-----------|
| Ⓐ $x^2 + 1$ | Ⓑ $x - 1$ | Ⓒ $a + 1$ |
| Ⓓ $x - 2$ | Ⓔ $a - 1$ | |

[해설]

$$\begin{aligned}a^2x - a^2 - x + 1 &= a^2(x - 1) - (x - 1) \\&= (a + 1)(a - 1)(x - 1)\end{aligned}$$

8. $A = -1^2 + 2^2 - 3^2 + 4^2 - 5^2 + 6^2 - 7^2 + 8^2 - 9^2 + 10^2$, $B = 9945$ 라 할 때, $B^2 - A^2$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 98900000

해설

$$\begin{aligned}A &= -1^2 + 2^2 - 3^2 + 4^2 - 5^2 + 6^2 \\&\quad - 7^2 + 8^2 - 9^2 + 10^2 \\&= (2^2 - 1^2) + (4^2 - 3^2) + \\&\quad (6^2 - 5^2) + (8^2 - 7^2) + (10^2 - 9^2) \\&= (2 - 1)(2 + 1) + (4 - 3)(4 + 3) + (6 - 5) \\&\quad (6 + 5) + (8 - 7)(8 + 7) + (10 - 9)(10 + 9) \\&= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 \\&= 55\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore B^2 - A^2 &= (B + A)(B - A) \\&= (9945 + 55)(9945 - 55) \\&= 10000 \times 9890 \\&= 98900000\end{aligned}$$

9. $a + b = 3\sqrt{2} + 1$ 일 때, 다음 식의 값은?

$$a^2 + b^2 + 2ab - 2(a + b) + 3$$

① 10 ② 15 ③ 20

④ $10\sqrt{3} + 10$ ⑤ $20\sqrt{3} + 10$

해설

$$\begin{aligned} a + b &= 3\sqrt{2} + 1 \text{에서} \\ (a + b - 1)^2 &= (3\sqrt{2})^2, \\ a^2 + b^2 - 2a - 2b + 2ab &= 17 \\ \therefore a^2 + b^2 + 2ab - 2(a + b) + 3 &= 17 + 3 = 20 \end{aligned}$$

10. $0 < x < 1$, $-2 < y < -1$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면?

$$\sqrt{(xy)^2} + \sqrt{(x+y)^2 - 4xy} - \sqrt{(x-y)^2 + 4xy}$$

- ① $-xy$ ② $2x - xy$ ③ $2x + xy$
④ $2y - xy$ ⑤ $x - xy$

해설

$$\begin{aligned}\sqrt{(x+y)^2 - 4xy} &= \sqrt{x^2 - 2xy + y^2} \\ &= \sqrt{(x-y)^2} \\ \sqrt{(x-y)^2 + 4xy} &= \sqrt{x^2 + 2xy + y^2} \\ &= \sqrt{(x+y)^2} \text{이므로}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\text{준식}) &= |xy| + |x-y| - |x+y| \\ &= -xy + x - y + x + y \\ &= 2x - xy\end{aligned}$$