

1. 다음 중 x 에 대한 이차방정식을 모두 고르면?

① $x + 1 = 0$ ② $x^2 - x + 3 = x^2$

③ $2x^2 - 6 = -x$ ④ $3x^2 - 1 = 3(x - 1)$

⑤ $x^2 + 2x + 1$

해설

- ① x 에 대한 일차방정식이다.
② 정리하면 $-x + 3 = 0$ 이므로 x 에 대한 일차방정식이다.

- ③ x 에 대한 이차방정식이다.
④ x 에 대한 이차방정식이다.
⑤ x 에 대한 이차식이다.

2. 다음 중 $x = -3$ 이 해가 되는 이차방정식은? (정답 2 개)

① $x(x + 2) = 0$

② $x^2 + 2x - 3 = 0$

③ $x^2 + 5x + 6 = 0$

④ $2x^2 - x - 1 = 0$

⑤ $2x^2 + 4 = 0$

해설

② $(x - 1)(x + 3) = 0$

③ $(x + 2)(x + 3) = 0$

3. 이차방정식 $x^2 + 10x - 24 = 0$ 을 풀어라.

▶ 답:

▶ 답:

▷ 정답: $x = -12$ 또는 -12

▷ 정답: $x = 2$ 또는 2

해설

$$x^2 + 10x - 24 = 0$$

$$(x + 12)(x - 2) = 0$$

$$\therefore x = -12 \text{ 또는 } x = 2$$

4. 이차방정식 $x^2 + 2x + k + 4 = 0$ 의 중근을 갖도록 k 의 값을 정하여라.

▶ 답:

▷ 정답: $k = -3$

해설

$$x^2 + 2x + k + 4 = 0 \text{의 중근을 가지므로}$$

$$\frac{D}{4} = 1 - (k + 4) = 0$$

$$\therefore k = -3$$

5. 이차방정식 $2x^2 + (k+2)x + 1 = 0$ 이 중근을 가질 때, k 의 값을 구하여라.

① $-1 \pm \sqrt{2}$ ② $1 \pm \sqrt{2}$ ③ $-2 \pm \sqrt{2}$
④ $-1 \pm 2\sqrt{2}$ ⑤ $-2 \pm 2\sqrt{2}$

해설

이차방정식의 판별식을 D 라고 할 때
 $2x^2 + (k+2)x + 1 = 0$ 이 중근을 가지려면 $D = 0$
 $D = (k+2)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 0$
 $(k+2)^2 = 8$, $k+2 = \pm 2\sqrt{2}$
 $\therefore k = -2 \pm 2\sqrt{2}$

6. 다음은 이차방정식과 그 해를 나타낸 것이다. 옳지 못한 것은?

- ① $(x+2)^2 = 9, x = 1$ 또는 $x = -5$
- ② $3(x+1)^2 = 48, x = 3$ 또는 $x = -5$
- ③ $2(x-1)^2 = 20, x = 1 \pm \sqrt{10}$
- ④ $(3x-2)^2 = 36, x = \frac{8}{3}$ 또는 $x = -\frac{4}{3}$
- ⑤ $4(x+3)^2 - 9 = 0, x = 0$ 또는 $x = -6$

해설

$$\begin{aligned} \textcircled{5} \quad (x+3)^2 &= \frac{9}{4} \\ x+3 &= \pm \frac{3}{2} \\ \therefore x &= -\frac{3}{2} \text{ 또는 } -\frac{9}{2} \end{aligned}$$

7. $(x+2)(x-6) = 3$ 을 $(x+a)^2 = b$ 의 꼴로 나타낼 때, a, b 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▶ 답:

▷ 정답: $a = -2$

▷ 정답: $b = 19$

해설

$$(x+2)(x-6) = 3, x^2 - 4x - 12 = 3$$

$$x^2 - 4x = 15, (x-2)^2 = 15 + 4$$

$$(x-2)^2 = 19$$

$$\therefore a = -2, b = 19$$

8. 이차방정식 $2(x - 4)^2 = a$ 가 하나의 근을 갖도록 하는 상수 a 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: $a = 0$

해설

$$(x - 4)^2 = \frac{a}{2}$$

(완전제곱식)=0의 꼴이어야 하므로

$$a = 0$$

9. 이차방정식 $x^2 + 2x + A = 0$ 의 근이 $x = 2$ 또는 $x = -4$ 일 때, A 의 값은?

- ① 6 ② -6 ③ 7 ④ -8 ⑤ -7

해설

근과 계수와의 관계에 의해

$$2 \times (-4) = A$$

$$\therefore A = -8$$

10. -1 은 이차방정식 $x^2 + ax + 1 = 0$ 과 $2x^2 - 3x + b = 0$ 의 공통인 해이다. 이 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 25 ② 27 ③ 29 ④ 31 ⑤ 33

해설

각 이차방정식에 $x = -1$ 을 대입하면

$$(-1)^2 - a + 1 = 0, \quad a = 2$$

$$2 \times (-1)^2 + 3 + b = 0 \quad b = -5$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 2^2 + (-5)^2 = 29$$

11. 근의 공식을 이용하여 이차방정식 $9x^2 - 6x - 1 = 0$ 의 근을 구하면?

$$\begin{array}{lll} \textcircled{1} & x = \frac{-2 \pm \sqrt{2}}{2} & \textcircled{2} & x = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2} \\ & & & \textcircled{3} & x = \frac{2 \pm \sqrt{10}}{3} \\ \textcircled{4} & x = 2 \pm 2\sqrt{2} & \textcircled{5} & x = \frac{1 \pm \sqrt{2}}{3} \end{array}$$

해설

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{3^2 - 9(-1)}}{9} = \frac{3 \pm \sqrt{18}}{9} = \frac{1 \pm \sqrt{2}}{3}$$

12. 이차방정식 $\frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{5}{6} = 0$ 의 근이 $x = \frac{A \pm \sqrt{B}}{3}$ 일 때, $A + B$ 의 값은?

① -1 ② 11 ③ 5 ④ -8 ⑤ 10

해설

양변에 12를 곱하면 $9x^2 + 6x - 10 = 0$

근의 공식(짝수 공식)을 이용하면

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 90}}{9} = \frac{-3 \pm 3\sqrt{11}}{9}$$

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{11}}{3}, A = -1, B = 11$$

$$\therefore A + B = -1 + 11 = 10$$

13. 다음 이차방정식 중 중근을 갖는 것은?

- ① $x^2 = 6x - 9$ ② $2x^2 + x - 3 = 0$
③ $x^2 = 4$ ④ $x^2 + 5x = 0$
⑤ $x^2 + 5x + 6 = 0$

해설

중근을 갖는 이차방정식은 $(ax + b)^2 = 0$ 이다.

① $x^2 - 6x + 9 = 0 \Leftrightarrow (x - 3)^2 = 0$

$\therefore x = 3$ (중근)

14. 이차방정식 $2x^2 - x - 7 = 0$ 의 두 근의 합이 $2x^2 - 5x + a = 0$ 의 근이 될 때, a 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: $a = 2$

해설

$2x^2 - x - 7 = 0$ 의 두 근의 합은 $\frac{1}{2}$ 이다.

이를 $2x^2 - 5x + a = 0$ 의 x 값에 대입하면

$\frac{1}{2} - \frac{5}{2} + a = 0, a = 2$ 이다.

15. 이차방정식 $x^2 - 8x + m = 0$ 의 한 근이 다른 근의 3 배일 때, 상수 m 의 값은?

- ① -24 ② -12 ③ 12 ④ 24 ⑤ 48

해설

이차방정식의 근을 $\alpha, 3\alpha$ 라 하면,

$$\alpha + 3\alpha = 8 \text{ 이므로 } \alpha = 2$$

$$\alpha \times 3\alpha = 3\alpha^2 = m$$

$$\therefore m = 12$$

16. 자연수 1에서 n 까지의 합은 $\frac{n(n+1)}{2}$ 이다. 합이 153이 되려면 1부터 n 까지를 더해야 한다고 할 때, n 은?

- ① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

해설

$$\frac{n(n+1)}{2} = 153 \text{ 이므로}$$

$$n^2 + n - 306 = 0$$

$$(n-17)(n+18) = 0$$

$$\therefore n = 17 (\because n > 0)$$

17. 정사각형 모양의 화단의 가로를 4m 늘리고,
세로를 7m 줄였더니, 넓이는 26m^2 가 되었다.
처음 정사각형의 한 변의 길이는?

① 7 m ② 8 m ③ 9 m

④ 10 m ⑤ 11 m



해설

$$(x + 4)(x - 7) = 26$$

$$x^2 - 3x - 54 = 0$$

$$(x + 6)(x - 9) = 0$$

$$\therefore x = 9 (\because x > 0)$$

18. 이차방정식 $x^2 + x + a = 0$ 의 한 근이 2 일 때, a 의 값과 다른 한 근의
곱을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 18

해설

$x^2 + x + a = 0$ 에 $x = 2$ 를 대입하여 정리하면

$$6 + a = 0 \quad \therefore a = -6$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$(x - 2)(x + 3) = 0$$

$$\therefore x = 2 \text{ 또는 } x = -3$$

$$\therefore (-6) \times (-3) = 18$$

19. 두 근이 2, -3이고, 이차항의 계수가 -1인 이차방정식의 상수항을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 6

해설

$$-(x-2)(x+3) = 0$$

$$-(x^2 + x - 6) = 0$$

$$-x^2 - x + 6 = 0$$

따라서 상수항은 6이다.

20. 다음 이차방정식 중에서 근의 개수가 다른 하나는 어느 것인가?

- ① $x^2 + 3x - 2 = 0$ ② $\textcircled{2} 3x^2 + 2x + 10 = 0$
③ $3x^2 - 6x + 1 = 0$ ④ $x^2 + 2x - 4 = 0$
⑤ $(x - 2)^2 = 3$

해설

② $\frac{D}{4} = 1 - 3 \times 10 < 0$: 근이 없다.
나머지는 근이 2개이다.

21. 이차방정식 $x^2 - (k+2)x + 1 = 0$ 의 중근을 가질 때의 상수 k 의 값 중 큰 값이 이차방정식 $x^2 - ax + a^2 - 1 = 0$ 의 한 근일 때, 양수 a 의 값을 구하여라.

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

해설

$$\begin{aligned}x^2 - (k+2)x + 1 &= 0 \text{에서} \\(k+2)^2 - 4 &= 0, k^2 + 4k = 0 \\k(k-4) &= 0 \\k &= 0, -4 \\x^2 - ax + a^2 - 1 &= 0 \text{에 } x=0 \text{을 대입하면} \\a^2 - 1 &= 0 \\a &= \pm 1 \\\therefore a &= 1 (\because a > 0)\end{aligned}$$

22. 이차방정식 $x^2 - 2\sqrt{3}x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 9

해설

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= 2\sqrt{3}, \quad \alpha\beta = 1 \text{ 이므로} \\ \alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2 &= (\alpha + \beta)^2 - 3\alpha\beta \\ &= (2\sqrt{3})^2 - 3 \times 1 \\ &= 9\end{aligned}$$

23. 이차방정식 $3x^2 + 5x - 9 = 0$ 의 두 근의 합과 곱을 두 근으로 하는 이차방정식을 구하면? (단, x^2 의 계수는 3이다.)

- ① $3x^2 + 13x + 14 = 0$ ② $3x^2 + 14x + 15 = 0$
③ $3x^2 + 15x + 16 = 0$ ④ $3x^2 + 16x + 17 = 0$
⑤ $3x^2 + 17x + 18 = 0$

해설

$$3x^2 + 5x - 9 = 0 \text{ 의 두 근을 } \alpha, \beta \text{ 라고 하면 } \alpha + \beta = -\frac{5}{3}, \alpha\beta = -3$$

$x = -3$ 또는 $x = -\frac{5}{3}$ 를 두 근으로 하는 이차방정식은

$$(x + 3) \left(x + \frac{5}{3} \right) = 0$$

$$x^2 + \frac{14}{3}x + 5 = 0$$

$$x^2 \text{ 의 계수가 } 3 \text{ 이므로 } 3 \left(x^2 + \frac{14}{3}x + 5 \right) = 0$$

따라서 $3x^2 + 14x + 15 = 0$ 이다.

24. 어떤 자연수를 제곱해야 할 것을 잘못하여 3배 하였더니 제곱한 것보다 10이 작아졌다고 한다. 이 자연수를 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 5

해설

어떤 자연수를 x 라고 하면


$$3x = x^2 - 10$$

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

$$(x - 5)(x + 2) = 0$$

x 는 자연수이므로 $x = 5$ 이다.

25. 세로의 길이가 가로의 길이보다 3 cm 더 긴 직사각형 모양의 종이가 있다. 네 모퉁이에서 한 변의 길이가 3 cm 인 정사각형을 잘라 내어 직육면체의 그릇을 만들었더니 그 부피가 210 cm^3 가 되었다. 처음 직사각형 모양 종이의 가로의 길이는?



- ① 12 cm ② 13 cm ③ 15 cm ④ 18 cm ⑤ 20 cm

해설

상자 밑면의 가로는 $x - 6$, 세로는 $(x + 3) - 6 = x - 3$, 높이]는 3

이다.

부피는 $(x - 6)(x - 3) \times 3 = 210$

$$x^2 - 9x - 52 = 0, (x + 4)(x - 13) = 0$$

$$x > 0 \Rightarrow x = 13 (\text{ cm})$$

