


1. 10 이하의 3의 배수의 집합을  $S$  라고 할 때, 다음 중 올바르게 말한 사람을 찾아라.



▶ 답 :

▷ 정답 : 김조국

#### 해설

10 이하의 3의 배수는 3, 6, 9이다.

$$\therefore S = \{3, 6, 9\}$$

최상위 : 12는 집합  $S$ 의 원소가 아니다.

김조국 : 3은 집합  $S$ 의 원소이다.

박영수 : 7은 집합  $S$ 의 원소가 아니다.

임태수 : 9는 집합  $S$ 의 원소이다.

2. 다음 집합 중에서 원소나열법을 조건제시법으로, 조건제시법을 원소나열법으로 바르게 나타낸 것을 모두 고르면? (정답 2개)

①  $A = \{x \mid x \text{는 } 1 \text{보다 작은 자연수}\} = \{0\}$

②  $A = \{x \mid x \text{는 자연수}\} = \{1, 2, 3, \dots\}$

③  $\{2, 4, 6, 8, 10, \dots\} = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 짝수}\}$

④  $\{1, 2, 3, \dots, 100\} = \{x \mid x \text{는 } 100 \text{ 이하의 자연수}\}$

⑤  $\{11, 13, 15, 17, 19\} = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{보다 큰 홀수}\}$

해설

①  $\emptyset$

③  $\{x \mid x \text{는 짝수}\}$

⑤  $\{x \mid x \text{는 } 10 \text{보다 크고 } 20 \text{보다 작은 홀수}\}$

3. 다음 중 집합의 원소가 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

①  $\{0\}$

②  $\{x|x \text{는 } 4 \text{의 약수 중 홀수}\}$

③  $\{x|x \text{는 } 3 \times x = 0 \text{인 자연수}\}$

④  $\{x|x \text{는 } 11 < x < 12 \text{인 자연수}\}$

⑤  $\{x|x \text{는 } x \leq 1 \text{인 자연수}\}$

해설

①  $\{0\}$

②  $\{1\}$

⑤  $\{1\}$

4. 집합  $A = \{0, \{1\}, 1, 2\}$  일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

①  $\emptyset \subset A$

②  $\{1\} \in A$

③  $\{1\} \subset A$

④  $\{1, 2\} \in A$

⑤  $\{\{1\}, 1\} \subset A$

해설

④  $\{1, 2\} \subset A$

5. 집합  $A = \{x | x \text{는 } 24 \text{의 약수}\}$  일 때,  $B \subset A$  를 만족하는  $B$  가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

①  $B = \{x | x \text{는 } 8 \text{의 약수}\}$

②  $B = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 미만의 짝수}\}$

③  $B = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 약수}\}$

④  $B = \{x | x \text{는 } 30 \text{ 미만의 } 6 \text{의 배수}\}$

⑤  $B = \{x | x \text{는 } 18 \text{의 약수}\}$

해설

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

①  $B = \{1, 2, 4, 8\}$

②  $B = \{2, 4, 6, 8\}$

③  $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

④  $B = \{6, 12, 18, 24\}$

⑤  $B = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$

6. 집합  $A = \{1, 2, 3\}$  일 때, 다음 보기 중 옳지 않은 것을 모두 골라라.

보기

㉠  $\{0\} \subset A$

㉡  $\emptyset \subset A$

㉢  $0 \notin A$

㉣  $A \not\subset \{2, 3, 1\}$

㉤  $\{1\} \subset A$

㉥  $\{0, 1\} \not\subset A$

▶ 답:

▶ 답:

▷ 정답: ㉠

▷ 정답: ㉣

해설

㉠  $\{0\} \not\subset A$

㉣  $A \subset \{2, 3, 1\}$

7. 집합  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, n\}$  의 부분집합 중에서 원소 1, 3, 5를 반드시 포함하는 부분집합의 개수가 32개일 때, 자연수  $n$ 의 값은?

① 7

② 8

③ 9

④ 10

⑤ 11

### 해설

집합  $A$ 의 원소의 개수가  $n$ 개이므로 원소 1, 3, 5를 반드시 포함하는 부분집합의 개수는  $2^{n-3}$  (개)이다.

$$2^{n-3} = 32, \quad 2^{n-3} = 2^5$$

$n - 3 = 5$  이므로  $n = 8$ 이다.

8.  $\{3\} \subset X \subset \{1, 3, 5, 7\}$  을 만족하는 집합  $X$  의 개수를 구하여라.

▶ 답 :        개

▷ 정답 : 8 개

해설

집합  $X$  는 3 을 반드시 원소로 가지는  $\{1, 3, 5, 7\}$  의 부분집합  
이므로 개수는  $2^3 = 8$  (개)



9. 집합  $A = \{1, 4, 7, 10\}$  의 부분집합 중에서 1 과 10 중 적어도 하나는 원소로 갖는 부분집합의 개수는?

① 4 개

② 8 개

③ 12 개

④ 16 개

⑤ 24 개

### 해설

집합  $A$  의 부분집합의 개수는  $2^4 = 16$  (개) 이고, 이 중에서 1, 10 을 원소로 하나도 갖지 않는 부분집합은 원소 4 와 원소 7 로 만든 부분집합이므로  $2^2 = 4$  (개) 이다.

$$\therefore 16 - 4 = 12 \text{ (개)}$$

10. 집합  $A = \{1, 2, \dots, n\}$ 의 부분집합 중에서 1, 2를 포함하지 않는 부분집합의 개수가 8개일 때, 자연수  $n$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

해설

$$2^{(1, 2\text{를 제외한 원소의 개수})} = 2^{n-2} = 8 = 2^3 \quad \therefore n = 5$$

11. 다음 중 다른 것과 같은 집합이 아닌 것은?

①  $\{2, 4, 6, 8, 10\}$

②  $\{10, 8, 6, 4, 2\}$

③  $\{x|x \text{는 } 10 \text{보다 작은 짝수}\}$

④  $\{x|x \text{는 } 10 \text{ 이하의 짝수}\}$

⑤  $\{x|x \text{는 } 11 \text{보다 작은 } 2 \text{의 배수}\}$

해설

③  $\{2, 4, 6, 8\}$

①, ②, ④, ⑤  $\{2, 4, 6, 8, 10\}$

12. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 3개)

①  $A = \emptyset$ 이면  $n(A) = 0$ 이다.

②  $B \subset A$ 이면  $n(B) < n(A)$ 이다.

③  $A = B$ 이면  $n(A) = n(B)$ 이다.

④  $n(A) = n(B)$ 이면  $A = B$ 이다.

⑤  $A = \{0\}$ 이면  $n(A) = 0$ 이다.

### 해설

②  $B \subset A$ 이면  $n(B) \leq n(A)$

④ 예를 들면  $A = \{0\}$ ,  $B = \{1\}$ 이면  $n(A) = n(B) = 1$ 이지만  
 $A \neq B$

⑤  $A = \{0\}$ 이면  $n(A) = 1$

13. 전체집합  $U$  의 두 부분집합  $A, B$  가 서로소일 때,  $(A-B)^c \cap A$  를 간단히 한 것이다. ① ~ ⑤ 에 알맞지 않은 것은?

$$\begin{aligned}(A-B)^c \cap A &= ( \text{①} )^c \cap A \\ &= ( \text{②} ) \cap A \\ &= ( \text{③} ) \cup (B \cap A) \\ &= ( \text{④} ) \cup (B \cap A) \\ &= ( \text{⑤} )\end{aligned}$$

①  $A \cap B^c$

②  $A \cup B^c$

③  $A^c \cap A$

④  $\emptyset$

⑤  $A \cap B$

해설

$$\begin{aligned}(A-B)^c \cap A &= (A \cap B^c)^c \cap A \quad \dots \text{①} \\ &= (A^c \cup B) \cap A \quad \dots \text{②} \\ &= (A^c \cap A) \cup (B \cap A) \quad \dots \text{③} \\ &= \emptyset \cup (B \cap A) \quad \dots \text{④} \\ &= A \cap B \quad \dots \text{⑤}\end{aligned}$$

14. 두 집합  $A = \{1, 2, a\}$ ,  $B = \{b - 1, 4, 5\}$ 에 대하여  $A \cap B = \{2, 5\}$  일 때,  $a + b$ 의 값은?

① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12

해설

$(A \cap B) \subset A$  이고  $(A \cap B) \subset B$  이므로

$a = 5$ ,  $b - 1 = 2$  이므로  $a + b = 5 + 3 = 8$  이다.

15. 두 집합  $A = \{2, 4, 6\}$ ,  $B = \{2, 6, 9\}$ 에 대하여  $(A \cap B) \subset X \subset (A \cup B)$ 를 만족하는 집합  $X$ 의 개수를 구하여라.

▶ 답 :        개

▷ 정답 : 4        개

#### 해설

집합  $X$ 는 원소 2, 6을 포함하는  $A \cup B = \{2, 4, 6, 9\}$ 의 부분집합이므로  $X$ 의 개수는  $A \cup B = \{2, 4, 6, 9\}$ 에서 원소 2, 6를 뺀  $\{4, 9\}$ 의 부분집합의 개수와 같으므로  $2^2 = 4$  (개)이다.

16. 두 집합  $A, B$  에 대하여  $A \times B$  를  $A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$  라고 정의한다.

$n(A \cup B) = 10$ ,  $n(A \cap B) = 8$  일 때,  $n(A) \times n(B)$  의 원소의 개수의 최댓값을 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : 81

해설

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$\therefore n(A) + n(B) = 18$$

따라서  $A, B$  의 원소의 개수는 각각 최대 9개씩 들어가야 한다.

따라서 최댓값은  $9 \times 9 = 81$



17. 미정인데 반 학생 중 노인복지시설로 봉사활동을 가본 적이 있는 학생은 15명, 보육원으로 봉사활동을 가본 적이 있는 학생은 20명, 노인복지시설이나 보육원으로 봉사활동을 가본 적이 있는 학생은 27명이다. 노인복지시설과 보육원 모두 봉사활동을 가본 적이 있는 학생 수는 몇 명인지 구하여라.



답 :

명



정답 : 8명

### 해설

노인복지시설로 봉사활동을 간 학생의 집합을  $A$ , 보육원으로 봉사활동을 간 학생의 집합을  $B$  라고 하자. 노인복지시설이나 보육원으로 봉사활동을 간 학생의 집합은  $A \cup B$  이고,  $n(A \cup B) = 27$  이다.

노인복지시설과 보육원으로 모두 봉사활동을 간 학생의 집합은  $A \cap B$  이다.

$$\begin{aligned} n(A \cap B) &= n(A) + n(B) - n(A \cup B) \\ &= 15 + 20 - 27 \\ &= 8(\text{명}) \end{aligned}$$

따라서 노인복지시설과 보육원 모두 봉사활동을 가본 적이 있는 학생 수는 8명이다.

18. 전체집합  $U = \{x \mid x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$  의 두 부분집합  $A, B$  가 다음 조건을 모두 만족할 때, 다음 중 집합  $A$  의 부분집합인 것을 모두 고르면?( 정답 2개)

$$\neg. A \cap B = \{3, 5\}$$

$$\neg. A - B = \{1, 9\}$$

$$\supset. (A \cup B)^c = \{6, 7\}$$

①  $\{1, 3\}$

②  $\{1, 3, 5\}$

③  $\{1, 3, 5, 7\}$

④  $\{1, 3, 5, 6\}$


⑤  $\{1, 3, 4, 5, 8\}$

해설

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  이다.

주어진 조건을 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같으므로  $A = \{1, 3, 5, 9\}$  이다.

따라서  $A$  의 부분집인 것은 ①, ②이다.



19. 전체집합  $U$  의 두 부분집합  $A, B$  에 대하여  $A^c \subset B^c$  일 때, 다음 중 옳은 것은?

①  $A - B = \emptyset$

②  $A \cup B = A$

③  $A \cap B^c = \emptyset$

④  $(A \cup B) - B = A$

⑤  $B^c \cup A = B$

해설

$A^c \subset B^c$  이므로  $B \subset A$  이다.

①  $B - A = \emptyset$

③  $A \cap B^c \neq \emptyset$

④  $(A \cup B) - B = A - B$

⑤  $B^c \cup A = U$

20. 전체집합  $U = \{a, b, c, d, e, f\}$  의 부분집합  $A, B$  에 대하여  $A - B = \{a, b\}$ ,  $B - A = \{e\}$ ,  $A^c \cap B^c = \{c, d\}$  일 때, 집합  $A^c$  은?

①  $\{b\}$

②  $\{e\}$


③  $\{b, e\}$

④  $\{c, d\}$

⑤  $\{c, d, e\}$

해설

주어진 조건을 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같으므로  $A^c = \{c, d, e\}$  이다.



21. 전체 집합  $U = \{x|x \text{는 } 10 \text{ 미만의 자연수}\}$  의 두 부분집합  $A = \{2, 4, 8\}$ ,  $B = \{4, 8, 9\}$  에 대하여  $(A \cup B) - A$  는?

①  $\{4\}$

②  $\{8\}$

③  $\{4, 8\}$

④  $\{4, 9\}$

⑤  $\{9\}$

해설

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  이므로  $(A \cup B) - A = \{2, 4, 8, 9\} - \{2, 4, 8\} = \{9\}$  이다.

22. 100명의 학생에게 야구, 축구의 선호도를 조사하였더니, 야구를 좋아하는 학생이 67명, 축구를 좋아하는 학생이 56명, 야구와 축구를 모두 싫어하는 학생이 23명이었다. 축구만 좋아하는 학생 수를 구하여라.



답 :

명




정답 : 10명

### 해설

전체집합을  $U$ , 야구를 좋아하는 학생을  $A$ , 축구를 좋아하는 학생을  $B$  라 하자. 벤다이어그램으로 나타내 보면  $n(A \cup B) =$

$100 - 23 = 77$  임을 쉽게 알 수 있다.



구하는 것은 그림에서 어두운 부분이고  $n(B-A)$  이다.  $n(B-A) = n(B) - n(A \cap B)$  이고  $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$  이므로  $n(A \cap B) = 67 + 56 - 77 = 46$

$\therefore$  축구만 좋아하는 학생 수는  $n(B) - n(A \cap B) = 56 - 46 = 10$

23. 전체집합  $U$ 의 두 부분집합  $A, B$ 에 대하여  $A \Delta B = (A \cap B) \cup (A \cup B)^c$ 라고 정의할 때, 다음 중 항상 성립한다고 할 수 없는 것은?(단,  $U \neq \emptyset$ )

①  $A \Delta U = U$

②  $A \Delta B = B \Delta A$

③  $A \Delta \emptyset = A^c$

④  $A \Delta B = A^c \Delta B^c$

⑤  $A \Delta A^c = \emptyset$

해설

$A \Delta B = (A \cap B) \cup (A \cup B)^c$ 에 따라  $A \Delta U = A$

24. 두 집합  $A, B$  에 대하여  $n(A - B) = 27$ ,  $n(A \cup B) = 48$ ,  $n(A) = 35$  일 때,  $n(A \cap B) + n(B)$  의 값은?

① 8

② 21

③ 27

④ 29

⑤ 35

해설

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

$$27 = 35 - n(A \cap B)$$

$$\therefore n(A \cap B) = 8$$

$$n(A - B) = n(A \cup B) - n(B)$$

$$27 = 48 - n(B)$$

$$\therefore n(B) = 21$$

$$n(A \cap B) + n(B) = 8 + 21 = 29$$



25. A 중학교 1 학년 6 반 학생은 모두 40 명이다. 수학을 좋아하는 학생은 26 명, 사회를 좋아하는 학생은 18 명, 수학 또는 사회를 좋아하는 학생은 36 명이다. 수학만 좋아하는 학생은 몇 명인가?

- ① 6 명      ② 7 명      ③ 10 명      ④ 14 명      ⑤ 18 명

해설

전체 학생의 집합을  $U$ , 수학을 좋아하는 학생의 집합을  $A$ , 사회를 좋아하는 학생들의 집합을  $B$  라 하자.

$n(U) = 40, n(A) = 26, n(B) = 18, n(A \cup B) = 36$  이다.

$n(A - B) = n(A \cup B) - n(B) = 36 - 18 = 18$  이다.