

1. 실수 x, y 에 대하여 $x + y + (xy - 1)i = 2 + i$ 일 때 $x^2 + y^2$ 의 값은?

- ① 4 ② 2 ③ 1 ④ 0 ⑤ -1

해설

$$x + y = 2, \quad xy - 1 = 1 \quad \therefore xy = 2$$

$$\therefore x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 0$$

2. $x + y + (2x - y)i = 2 + 7i$ 를 만족하는 두 실수 x, y 에 대하여 xy 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: $xy = -3$

해설

$$x + y = 2, \quad 2x - y = 7$$

$$\therefore x = 3, \quad y = -1$$

$$\therefore xy = -3$$

3. $-2 \leq x \leq 3$ 일 때, $3x - 1$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

해설

$$-2 \leq x \leq 3 \text{에서 } -6 \leq 3x \leq 9, \quad -7 \leq 3x - 1 \leq 8$$

따라서, 최댓값은 8이고 최솟값은 -7이므로 두 값의 합은 1이다.

4. $i^{2000} + i^{2002} + i^{2003} + i^{2004}$ 의 값을 구하면?

- ① 1 ② 1 - i ③ 1 + i ④ -1 ⑤ 0

해설

$$i^4 = 1 \text{ } \diamond \text{]므로}$$

$$i^{4k} = 1, i^{4k+1} = i, i^{4k+2} = -1, i^{4k+3} = -i$$

$$(준식) = 1 + (-1) + (-i) + 1$$

$$= 1 - i$$

5. $x = 1 + \sqrt{2}i$, $y = 1 - \sqrt{2}i$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값을 구하면?

- ① -1 ② 1 ③ -2 ④ 2 ⑤ -3

해설

$$x + y = 2, xy = 3$$
$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 4 - 6 = -2$$

6. 다음 <보기>에서 계산 중 잘못된 것을 모두 고르면? (단, $i = \sqrt{-1}$)

[보기]

$$\text{I. } \sqrt{-3} \sqrt{-3} = \sqrt{(-3) \cdot (-3)} = \sqrt{9} = 3$$

$$\text{II. } \sqrt{5} \sqrt{-2} = \sqrt{5} \times \sqrt{(-2)} = \sqrt{-10} = \sqrt{10}i$$

$$\text{III. } \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{-6}} = \sqrt{\frac{2}{-6}} = \sqrt{-\frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{1}{3}}i$$

$$\text{IV. } \frac{\sqrt{-10}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{-10}{2}} = \sqrt{-5} = \sqrt{5}i$$

① I, II

② I, III

③ II, III, IV

④ II, IV

⑤ III, IV

[해설]

$$\text{I. } \sqrt{-3} \sqrt{-3} = \sqrt{3}i \sqrt{3}i = \sqrt{9}i^2 = -3$$

\therefore 옳지 않다.

$$\text{II. } \sqrt{5} \sqrt{-2} = \sqrt{5} \sqrt{2}i = \sqrt{10}i$$

\therefore 옳다.

$$\text{III. } \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{-6}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}i} = \sqrt{\frac{2}{6}} \cdot \frac{i}{i^2} = -\sqrt{\frac{1}{3}}i$$

\therefore 옳지 않다.

$$\text{IV. } \frac{\sqrt{-10}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}i}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{10}{2}}i = \sqrt{5}i$$

\therefore 옳다.

7. $2x^2 + 4x - 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2\beta + \alpha\beta^2$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

해설

$$\alpha + \beta = -2, \quad \alpha\beta = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha\beta(\alpha + \beta) = -\frac{1}{2} \times (-2) = 1$$

8. $2 \leq x \leq 4$ 에서 이차함수 $y = x^2 - 2x + 3$ 의 최댓값은 M , 최솟값은 m 이다. $M + m$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

해설

$y = x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2$
따라서 함수의 그래프는 점(1, 2)를 꼭지
점으로 하는 아래로 볼록한 포물선이므
로

(i) $x = 2$ 일 때 최소이며, 최솟값은

$$f(2) = 2^2 - 2 \cdot 2 + 3 = 3$$

$$\therefore m = 3$$

(ii) $x = 4$ 일 때 최대이며, 최댓값은 $f(4) = 4^2 - 2 \cdot 4 + 3 = 11$

$$\therefore M = 11$$

$$\therefore M + m = 14$$



9. 사차방정식 $x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6 = 0$ 의 근이 아닌 것은?

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

해설

대입하여 성립하는 수들을 찾아내어 조립제법으로 인수분해를 하면

$$\begin{aligned}x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6 &= 0 \\(x-1)(x^3 + 2x^2 - 5x - 6) &= 0 \\(x-1)(x-2)(x^2 + 4x + 3) &= 0 \\(x-1)(x-2)(x+3)(x+1) &= 0 \\∴ x = -3, -1, 1 \text{ 또는 } 2\end{aligned}$$

10. 연립부등식 $\begin{cases} x^2 + x - 6 \leq 0 \\ |x - 1| \leq 3 \end{cases}$ 의 해를 구하면?

- ① $-3 \leq x \leq 2$ ② $-2 \leq x \leq 2$ ③ $-1 \leq x \leq 2$
④ $0 \leq x \leq 2$ ⑤ $2 \leq x \leq 3$

해설

$$\begin{aligned} x^2 + x - 6 &\leq 0 \text{에서} \\ (x+3)(x-2) &\leq 0 \\ -3 \leq x \leq 2 &\cdots \{ \} \\ |x-1| &\leq 3 \text{에서} \\ -3 \leq x-1 &\leq 3 \\ -2 \leq x &\leq 4 \cdots (-) \\ \{ \}, (-) \text{에서 } -2 \leq x &\leq 2 \end{aligned}$$

11. 이차방정식 $x^2 + 2(k-m)x + (k^2 - n + 4) = 0$ 이 실수 k 값에 관계없이 중근을 가질 때, 실수 $m+n$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

해설

중근을 가지려면 판별식이 0이다.

$$D' = (k-m)^2 - (k^2 - n + 4) = 0$$

모든 k 에 대해 성립하려면

$$-2m = 0, \text{ 그리고 } m^2 + n - 4 = 0$$

$$\therefore m = 0, \quad n = 4, \quad m + n = 4$$

12. 가로의 길이가 세로의 길이보다 5 cm 더 긴 직사각형이 있다. 둘레의 길이가 34 cm 일 때, 이 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이의 곱을 구하여라.(단, 단위 생략)

▶ 답:

▷ 정답: 66

해설

직사각형의 가로, 세로의 길이를 각각 x cm, y cm 라 하면



$$x = y + 5 \quad \dots\dots \textcircled{①}$$

또, 이 직사각형의 둘레는 $2(x+y)$ 이므로

$$2(x+y) = 34 \text{ 즉, } x+y = 17 \quad \dots\dots \textcircled{②}$$

①을 ②에 대입하면

$$y+5+y=17, 2y=12$$

$$\therefore y=6$$

$$y=6 \text{ 을 } \textcircled{①} \text{에 대입하면 } x=11$$

$$\therefore xy = 11 \times 6 = 66$$

13. 연립방정식 $\begin{cases} 2x^2 - 3xy + y^2 = 0 \\ 5x^2 - y^2 = 4 \end{cases}$ 의 근을 $x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때,
 $\alpha + \beta$ 의 최댓값은?

- ① 4 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 10

해설

$$\begin{cases} 2x^2 - 3xy + y^2 = 0 \cdots ① \\ 5x^2 - y^2 = 4 \cdots ② \end{cases}$$

①식 인수분해: $(2x - y)(x - y) = 0$

$\therefore y = 2x, y = x$

②식에 대입하면

$$y = 2x \rightarrow 5x^2 - (2x)^2 = 4,$$

$$x^2 = 4, x = \pm 2, y = \pm 4$$

$$y = x \rightarrow 5x^2 - x^2 = 4, 4x^2 = 4$$

$$x^2 = 1, x = \pm 1, y = \pm 1$$

$x = \alpha, y = \beta$ 에서

$$\alpha + \beta : 2 + 4 = 6, -2 - 4 = -6$$

$$1 + 1 = 2, -1 - 1 = -2$$

$\therefore \alpha + \beta$ 의 최댓값은 6

14. x 의 이차방정식 $x^2 + (2m - 1)x + m^2 - m - 2 = 0$ 의 두 근이 모두 양이고, 또 한 근이 다른 근의 2 배 일 때, 실수 m 의 값을 구하시오.

▶ 답:

▷ 정답: -4

해설

$$D = (2m - 1)^2 - 4(m^2 - m - 2) = 9 > 0 \text{ } \circ\text{므로}$$

서로 다른 두 실근을 갖는다.

두 근을 $\alpha, 2\alpha$ 라 하면

$$\alpha + 2\alpha = -(2m - 1) > 0 \quad \dots\dots \textcircled{\text{①}}$$

$$\alpha \times 2\alpha = m^2 - m - 2 > 0 \quad \dots\dots \textcircled{\text{②}}$$

①, ②의 공통 범위를 구하면

$$m < -1 \quad \dots\dots \textcircled{\text{③}}$$

또, ①에서의 $\alpha = \frac{1 - 2m}{3}$ 을 ②에 대입하여 풀면 $m = -4, 5$

조건 ③에 의해서 $m = -4$