

1.  $(x - 2y)(x - 2y - 4z) - 12z^2$  이 계수가 1인 두 일차식의 곱으로 인수 분해될 때, 두 일차식의 합을 구하면?

- ①  $2x - 4y + 4z$       ②  $2x - 4y - 4z$       ③  $2x - 4y + 3z$   
④  $2x + 4y + 4z$       ⑤  $4x - 2y - 4z$

해설

$$\begin{aligned}x - 2y &= A \text{ 라 하면} \\A(A - 4z) - 12z^2 &= A^2 - 4Az - 12z^2 \\&= (A - 6z)(A + 2z) \\&= (x - 2y - 6z)(x - 2y + 2z) \\∴ (x - 2y - 6z) + (x - 2y + 2z) &= 2x - 4y - 4z\end{aligned}$$

2.  $(x+2)^2 - (2x-3)^2$  을 간단히 하면  $-(ax+b)(x+c)$  이다. 이 때,  
 $a+b+c$ 의 값을 구하면? (단,  $a$ 는 양수)

① -5      ② -1      ③ -3      ④ -10      ⑤ -12

해설

$$\begin{aligned}x+2 &= A, 2x-3 = B \text{로 치환하면} \\(x+2)^2 - (2x-3)^2 &= A^2 - B^2 \\&= (A+B)(A-B) \\&= (x+2+2x-3)(x+2-2x+3) \\&= (3x-1)(-x+5) \\&= -(3x-1)(x-5) \\&\therefore a+b+c = 3 + (-1) + (-5) = -3\end{aligned}$$

3.  $x(x+1)(x+2)(x+3)+1$  을 인수분해 하는 과정이다. ( )안에 들어갈  
식이 옳지 않은 것은?

$$\begin{aligned} & x(x+1)(x+2)(x+3)+1 \\ &= x(\textcircled{1}) \times (x+1)(\textcircled{2}) + 1 \\ &= (x^2 + 3x)(\textcircled{3}) + 1 \\ & (\textcircled{4}) = A \text{ 라 하면} \\ & A^2 + 2A + 1 = (A+1)^2 = (\textcircled{5})^2 \end{aligned}$$

- ①  $x+3$       ②  $x+2$       ③  $x^2 + 3x + 2$   
**④  $x^2 + 3$**       ⑤  $x^2 + 3x + 1$

해설

④  $x^2 + 3x$

4.  $x(x+2)(x+4)(x+6)+16$  을 인수분해하는 과정이다. ( )안에 들어갈  
식이 옳은 것은?

$$\begin{aligned} & x(x+2)(x+4)(x+6)+16 \\ &= x(\textcircled{1}) \times (x+2)(\textcircled{2}) + 16 \\ &= (x^2 + 6x)(\textcircled{3}) + 16 \\ & (\textcircled{4}) = A \text{ 라 하면} \\ & A^2 + 8A + 16 = (A+4)^2 = (\textcircled{5})^2 \end{aligned}$$

①  $x+5$       ②  $x+3$       ③  $x^2 + 4x + 8$

④  $x^2 + 6x$       ⑤  $x^2 + 6x + 1$

해설

- ①  $x+6$   
②  $x+4$   
③  $x^2 + 6x + 8$   
⑤  $x^2 + 6x + 4$

5.  $x^2 - 2xy - 1 + y^2$  을 인수분해하면?

- ①  $(x - y + 1)(x - y - 1)$       ②  $(x + y + 1)(x + y - 1)$   
③  $(x - y + 1)(x + y - 1)$       ④  $(x - y - 1)(x + y - 1)$   
⑤  $(x + y + 1)(x - y - 1)$

해설

$$\begin{aligned}x^2 - 2xy - 1 + y^2 &= (x^2 - 2xy + y^2) - 1 \\&= (x - y)^2 - 1^2 \\&= (x - y + 1)(x - y - 1)\end{aligned}$$

6. 다음 중  $201^2$  의 계산을 간편하게 하기 위하여 이용되는 곱셈 공식을  
바르게 나타낸 것은? (단,  $a, b, c, d$  는 자연수)

- ①  $(a - b)^2$       ②  $(a + b)^2$   
③  $(ax + b)(cx + d)$       ④  $(a + b)(a - b)$   
⑤  $(x + a)(x - b)$

해설

$$201^2 = (200 + 1)^2 = 40000 + 400 + 1 = 40401$$

7.  $x = -3 + \sqrt{5}$  일 때,  $x^2 + 6x + 9$  의 값을 구하면?

- ① 5      ② 6      ③ -6      ④ -4      ⑤ -5

해설

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2 = (-3 + \sqrt{5} + 3)^2 = 5$$

8.  $a - b = 3$  일 때,  $a^2 - 2ab + a + b^2 - b - 5$ 의 값을 구하면?

- ① 4.5      ② 6      ③ 7      ④ 8      ⑤ 9

해설

$$\begin{aligned} & a^2 - 2ab + b^2 + a - b - 5 \\ &= (a - b)^2 + (a - b) - 5 \\ &= 3^2 + 3 - 5 = 7 \end{aligned}$$

9. 다음 중  $3x^2y^3 - 2x^3y^2$  의 인수를 모두 찾아라.

[보기]

Ⓐ  $x$

Ⓑ  $xy$

Ⓒ  $2x + 3y$

Ⓓ  $-2x + 3y$

Ⓔ  $xy(-2x + 3y)$

Ⓕ  $xy^2(3x - 2y)$

▶ 답:

▶ 답:

▶ 답:

▶ 답:

▷ 정답: Ⓐ

▷ 정답: Ⓑ

▷ 정답: Ⓒ

▷ 정답: Ⓓ

[해설]

$$3x^2y^3 - 2x^3y^2 = x^2y^2(3y - 2x)$$

10. 다음 보기 중에서  $2a^3 - a^2b - 3ab^2$  의 인수를 모두 고른 것은?

- |            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| 보기         |             |             |
| Ⓐ $a$      | Ⓑ $a - b$   | Ⓒ $a + b$   |
| Ⓓ $2a - b$ | Ⓔ $2a + 2b$ | Ⓕ $2a - 3b$ |

- ① Ⓐ, Ⓑ      ② Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ      ③ Ⓒ, Ⓓ  
④ Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ      ⑤ Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ

해설

$$\begin{aligned}2a^3 - a^2b - 3ab^2 &= a(2a^2 - ab - 3b^2) \\&= a(2a - 3b)(a + b)\end{aligned}$$

따라서 인수는 Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ 이다.

11.  $-8 - 7a(a - 2) + a^2(a - 2)^2 = (a + A)(a + B)(a + C)(a + D)$  라고  
할 때,  $A + B + C + D$  를 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -4

해설

$$\begin{aligned} a - 2 &= t \text{로 치환하면} \\ -8 - 7a(a - 2) + a^2(a - 2)^2 &= -8 - 7at + (at)^2 \\ &= (at - 8)(at + 1) \\ &= (a^2 - 2a - 8)(a^2 - 2a + 1) \\ &= (a - 4)(a + 2)(a - 1)^2 \\ &= (a - 4)(a + 2)(a - 1)(a - 1) \\ \therefore A + B + C + D &= (-4) + 2 + (-1) + (-1) = -4 \end{aligned}$$

12.  $(a - 3)^2 - 5(a - 3) + 6$  을 인수분해한 식은?

- ①  $(a - 6)(a - 3)$       ②  $(a - 3)(a - 5)$       ③  $(a - 2)(a - 5)$   
④  $(a - 6)(a - 5)$       ⑤  $(a + 6)(a - 5)$

해설

$$\begin{aligned}a - 3 &= A \text{로 치환하면} \\A^2 - 5A + 6 &= (A - 3)(A - 2) \\&= (a - 6)(a - 5)\end{aligned}$$

13.  $ab + 5a - 4b - 30 = 0$  을 만족하는 정수  $a, b$  의 값을 구하여라.  
(단,  $a > 0, b > 0$ )

▶ 답:

▶ 답:

▷ 정답:  $a = 5$

▷ 정답:  $b = 5$

해설

$$\begin{aligned} ab + 5a - 4b - 30 &= 0 \\ a(b+5) - 4(b+5) + 20 - 30 &= 0 \\ (a-4)(b+5) - 10 &= 0 \\ (a-4)(b+5) &= 10 \\ a > 0, b > 0 \text{ 이므로 } b+5 &> 5 \\ a-4 = 1, b+5 &= 10 \\ \therefore a = b &= 5 \end{aligned}$$

14.  $(2x+1)^2 - (x-2)^2 = (3x+a)(x+b)$  일 때,  $a+3b$  의 값을 구하면?

- ① 4.5      ② 6      ③ 7      ④ 8      ⑤ 9

해설

$$\begin{aligned}(2x+1)^2 - (x-2)^2 &= (2x+1+x-2)(2x+1-x+2) \\&= (3x-1)(x+3) \\a = -1, b = 3 \\∴ a + 3b = -1 + 9 = 8\end{aligned}$$

15. 다음 식이 완전제곱식일 때, 상수  $a$ 의 값으로 알맞은 것을 구하여라.

$$(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+a$$

▶ 답:

▷ 정답:  $a = 16$

해설

$$\begin{aligned}(\text{준식}) &= (x+1)(x+7)(x+3)(x+5) + a \\&= (x^2 + 8x + 7)(x^2 + 8x + 15) + a\end{aligned}$$

$x^2 + 8x = A$ 로 치환하면

$$\begin{aligned}(\text{준식}) &= (A+7)(A+15) + a \\&= A^2 + 22A + 105 + a \\&= (A+11)^2 = (x^2 + 8x + 11)^2\end{aligned}$$

$$11^2 = 105 + a$$

$$\therefore a = 16$$

16.  $x^2 + xy + x + y$ 를 인수분해하면?

- ①  $(x+y)(1-x)$       ②  $(x+y)(x-1)$       ③  $(x-y)(x+1)$   
④  $\textcircled{④} (x+y)(x+1)$       ⑤  $(x-y)(x-1)$

해설

$$x(x+y) + (x+y) = (x+y)(x+1)$$

17. 다음 중  $x^3 + y - x - x^2y$  의 인수가 아닌 것은?

①  $x^2 - y$

②  $x - y$

③  $x - 1$

해설

$$\begin{aligned}(\text{준식}) &= x^3 - x + y - x^2y \\&= x(x^2 - 1) - y(x^2 - 1) \\&= (x - y)(x^2 - 1) \\&= (x - y)(x + 1)(x - 1)\end{aligned}$$

18.  $x^2 - 4y^2 + 6x + 9$  를 인수분해 하였을 때, 곱하여진 두 다항식의 합을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답:  $2x + 6$

해설

$$\begin{aligned}x^2 - 4y^2 + 6x + 9 &= x^2 + 6x + 9 - 4y^2 \\&= (x+3)^2 - 4y^2 \\&= (x+3+2y)(x+3-2y) \\∴ x+3+2y + x+3-2y &= 2x+6\end{aligned}$$

19.  $x^4 - 10x^2 + 9$  의 인수가 아닌 것은?

- ①  $x - 1$       ②  $x + 3$       ③  $x^2 - 1$   
④  $x + 9$       ⑤  $x^4 - 10x^2 + 9$

해설

$$(x^2 - 1)(x^2 - 9) = (x + 1)(x - 1)(x + 3)(x - 3)$$

20.  $x^2 + 3xy - x - 6y - 2$  를 인수분해 하면  $(x - 2)(ax + by + c)$  이다.  
 $a + b + c$  의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답:  $a + b + c = 5$

해설

$$x^2 + 3xy - x - 6y - 2 \text{ 를 } x \text{에 대해 정리하면}$$
$$x^2 + (3y - 1)x - 2(3y + 1) = (x - 2)(x + 3y + 1)$$

$$\therefore a = 1, b = 3, c = 1$$

$$\therefore a + b + c = 5$$

21.  $x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 2y - 3$  을 인수분해하면?

- ①  $(x - y - 3)(x - y + 1)$       ②  $(x + 2y + 3)(x - y - 1)$   
③  $(x - y + 3)(x - y - 1)$       ④  $(x - 2y - 3)(x - y - 1)$   
⑤  $(x - y + 3)(x - 2y + 1)$

해설

주어진 식을  $x$ 에 관해 정리하면

$$\begin{aligned} & x^2 + (2 - 2y)x + y^2 - 2y - 3 \\ &= x^2 + (2 - 2y)x + (y + 1)(y - 3) \\ &= \{x - (y + 1)\}\{x - (y - 3)\} \\ &= (x - y - 1)(x - y + 3) \end{aligned}$$

22.  $5007 \times 5009 + 1$  이 어떤 자연수의 제곱일 때, 어떤 자연수를 구하면?

- ① 5005    ② 5006    ③ 5007    ④ 5008    ⑤ 5009

해설

$$\begin{aligned}5007 \times 5009 + 1 &= (5008 - 1)(5008 + 1) + 1 \\&= 5008^2 - 1 + 1 = 5008^2\end{aligned}$$

23.  $x = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ ,  $y = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$  일 때,  $x^2 - 2xy + y^2$  의 값을 구하면?

- ① 95      ② 96      ③ -96      ④ -95      ⑤ -94

해설

$x, y$  를 유리화하면

$$x = 5 + 2\sqrt{6}$$

$$y = 5 - 2\sqrt{6}$$

$$x - y = (5 + 2\sqrt{6}) - (5 - 2\sqrt{6}) = 4\sqrt{6} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}x^2 - 2xy + y^2 &= (x - y)^2 \\&= (4\sqrt{6})^2 = 96\end{aligned}$$

24.  $a = 2.43$ ,  $b = 1.73$  일 때,  $a^2 - 2ab + b^2$  의 값은?

- ① 0.36      ② 0.49      ③ 0.64      ④ 0.81      ⑤ 1.21

해설

$$(a - b)^2 = (2.43 - 1.73)^2 = (0.7)^2 = 0.49$$

25.  $x^2 - 3x - 1 = 0$  일 때,  $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 11

해설

$x^2 - 3x - 1 = 0$ 의 양변을  $x$ 로 나누어 주면,

$x - 3 - \frac{1}{x} = 0$  이므로  $x - \frac{1}{x} = 3$  이다.

$$\therefore x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 = 3^2 + 2 = 11$$

26.  $a^3 - a^2b + ab^2 + ac^2 - b^3 - bc^2 = 0$  은 어떤 삼각형인지 구하면? (단,  $a, b, c$  는 세 변의 길이이다.)

- ① 정삼각형      ② 이등변삼각형  
③  $\angle A$  가 직각인 직각삼각형      ④  $\angle B$  가 직각인 직각삼각형  
⑤  $\angle C$  가 직각인 직각삼각형

해설

$$\begin{aligned} & a^3 - a^2b + ab^2 + ac^2 - b^3 - bc^2 \\ &= a^2(a - b) + a(b^2 + c^2) - b(b^2 + c^2) \\ &= a^2(a - b) + (a - b)(b^2 + c^2) \\ &= (a - b)(a^2 + b^2 + c^2) = 0 \\ \therefore a - b &= 0, a = b \text{ 일 때 이등변삼각형} \end{aligned}$$

27.  $(x-1)^2 + \frac{1}{(x-1)^2} - 2$  를 인수분해하면?

①  $\frac{x^2(x-2)}{(x-1)^2}$       ②  $\frac{x(x-2)^2}{(x-1)^2}$       ③  $\frac{x^2(x-2)^2}{(x-1)}$   
④  $\frac{(x-2)^2}{(x-1)^2}$       ⑤  $\frac{x^2(x-2)^2}{(x-1)^2}$

해설

$x-1 = a$  로 치환하면

$$\begin{aligned}(x-1)^2 + \frac{1}{(x-1)^2} - 2 \\= a^2 + \frac{1}{a^2} - 2 = \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 = \left(\frac{a^2 - 1}{a}\right)^2 \\= \left\{\frac{(a+1)(a-1)}{a}\right\}^2 \\= \frac{x^2(x-2)^2}{(x-1)^2}\end{aligned}$$

28.  $2 + \sqrt{3}$ 의 정수 부분을  $x$ , 소수 부분을  $y$  라고 할 때,  $(1 - \sqrt{x})^2 + \frac{4}{y}$

의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 6

해설

$3 < 2 + \sqrt{3} < 4$  이므로

$2 + \sqrt{3}$ 의 정수부분은 3, 소수부분은  $\sqrt{3} - 1$  이다.

$x = 3, y = \sqrt{3} - 1$

$$(1 - \sqrt{3})^2 + \frac{4}{\sqrt{3} - 1}$$

$$= 4 - 2\sqrt{3} + \frac{4(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = 6$$

29. 다음 식을 간단히 하여라.

$$(2a - b)^2 - (2a + b)^2$$


▶ 답 :

▷ 정답 :  $-8ab$

해설

$$\begin{aligned}(2a - b)^2 - (2a + b)^2 \\&= (2a - b + 2a + b)(2a - b - 2a - b) \\&= 4a \times (-2b) \\&= -8ab\end{aligned}$$

30. 다음 그림에서  $\square ABEF$  와  $\square FHGD$  가 정사각형일 때, 사각형  $HECG$  의 넓이를  $a, b$ 에 관한 식으로 나타낸 후 인수분해하면  $(a - b)(ta + sb)$  이다.  $t + s$ 의 값을 구하시오.



▶ 답:

▷ 정답:  $t + s = 1$

**해설**

사각형  $ABFE, EGHD$  는 정사각형이므로

$$\overline{HE} = b - (a - b) = 2b - a, \overline{EC} = a - b$$

남은 사각형의 넓이는  $(2b - a)(a - b)$  이다.

따라서  $t = -1, s = 2$  이므로  $t + s = 1$  이다.

31. 0 부터 9 까지의 숫자가 적힌 카드 10 장이 있다. 이 중 2장을 택해 카드에 적힌 숫자를  $x$ ,  $y$  라고 할 때,  $\sqrt{xy + x - 3y - 3}$  가 자연수가 되는 경우의 수는 모두 몇 가지인지 구하여라.

▶ 답: 가지

▷ 정답: 10가지

해설

$\sqrt{xy + x - 3y - 3} = \sqrt{(x-3)(y+1)}$  이므로  
( $x-3$ )( $y+1$ )이 완전제곱수일 때, 주어진 식이 자연수가 된다.  
( $x-3$ )( $y+1$ ) = 1 일 때, ( $x, y$ ) = (4, 0)  
( $x-3$ )( $y+1$ ) = 4 일 때,  
( $x, y$ ) = (4, 3)(5, 1)(7, 0)  
( $x-3$ )( $y+1$ ) = 9 일 때, ( $x, y$ ) = (4, 8)(6, 2)  
( $x-3$ )( $y+1$ ) = 16 일 때, ( $x, y$ ) = (5, 7)(7, 3)  
( $x-3$ )( $y+1$ ) = 25 일 때, ( $x, y$ ) = (8, 4)  
( $x-3$ )( $y+1$ ) = 36 일 때, ( $x, y$ ) = (9, 5)

따라서  $\sqrt{xy + x - 3y - 3}$  가 자연수가 되는 경우의 수는 모두 10 가지이다.

32.  $ab - 6a + 5b - 48 = 0$ 을 만족하는 정수  $a, b$ 의 순서쌍의 개수는? (단,  $a > 0, b > 0$ )

- ① 1 개      ② 2 개      ③ 3 개      ④ 4 개      ⑤ 5 개

해설

$$\begin{aligned} ab - 6a + 5b - 48 &= 0 \\ b(a+5) - 6a - 48 &= 0 \\ b(a+5) - 6(a+5) + 6 - 48 &= 0 \\ (a+5)(b-6) &= 18 \\ a > 0, b > 0 \Rightarrow a+5 &> 5 \\ (\text{i}) a+5 = 18, b-6 &= 1 \\ a = 13, b = 7 & \\ (\text{ii}) a+5 = 9, b-6 &= 2 \\ a = 4, b = 8 & \\ (\text{iii}) a+5 = 6, b-6 &= 3 \\ a = 1, b = 9 & \\ \therefore \text{순서쌍 } a, b \text{의 개수는 } 3 \text{ 개} & \end{aligned}$$

33.  $16 - x^2 + 4xy - 4y^2$  을 인수분해하면?

- ①  $(x + 2y - 4)(-x + 2y + 4)$       ②  $(x - 2y + 4)^2$   
③  $(x - 2y + 4)(x + 2y - 4)$       ④  $(x - 2y + 4)(-x + 2y + 4)$   
⑤  $(-x - 2y + 4)(x + 2y + 4)$

해설

$$\begin{aligned} 16 - (x^2 - 4xy + 4y^2) &= 16 - (x - 2y)^2 \\ &= 4^2 - (x - 2y)^2 \\ &= (4 + x - 2y)(4 - x + 2y) \end{aligned}$$

34.  $(x-1)(x+1)(x-2)(x+2) - 40$  을  $(x+a)(x+b)(x^2+c)$  로 인수분해할 때,  $a+b+c$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답:  $a+b+c = 4$

해설

$$\begin{aligned}(x-1)(x+1)(x-2)(x+2) - 40 \\&= (x^2-1)(x^2-4) - 40 \\&= x^4 - 5x^2 - 36 \\&= (x^2+4)(x^2-9) \\&= (x-3)(x+3)(x^2+4) \text{ 이므로} \\&a+b+c = 4 \text{이다.}\end{aligned}$$

35.  $x^4 - 3x^2 + 1$  을 인수분해하면  $(x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$  가 된다. 이 때,  $a + b + c + d$  의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답:  $a + b + c + d = -2$

해설

$$\begin{aligned}x^4 - 3x^2 + 1 &= x^4 - 2x^2 + 1 - x^2 \\&= (x^2 - 1)^2 - x^2 \\&= (x^2 - 1 + x)(x^2 - 1 - x) \\&= (x^2 + x - 1)(x^2 - x - 1) \\a = 1, b = -1, c = -1, d = -1 \\∴ a + b + c + d &= -2\end{aligned}$$

36. 다항식  $x^2 - 4xy + 3y^2 - 6x + 2y - 16$  을 인수분해 하였더니  $(x + ay + b)(x + cy + d)$  가 되었다. 이때,  $a - b + c - d$  의 값은?

- ① 0      ② 1      ③ 2      ④ 3      ⑤ 4

해설

$x$ 에 관한 내림차순으로 정리하여 인수분해하면

$$\begin{aligned} & x^2 - 2(2y+3)x + 3y^2 + 2y - 16 \\ &= x^2 - 2(2y+3)x + (y-2)(3y+8) \\ &= (x-y+2)(x-3y-8) \\ \therefore & a = -1, b = 2, c = -3, d = -8 \\ \therefore & a - b + c - d = 2 \end{aligned}$$

37.  $15 \times 7.6^2 - 7.4^2 \times 15$  의 값은?

- ① 55      ② 45      ③ 35      ④ 15      ⑤ 10

해설

$$\begin{aligned}(\text{준식}) &= 15 \times (7.6^2 - 7.4^2) \\&= 15 \times (7.6 + 7.4) \times (7.6 - 7.4) \\&= 15 \times 15 \times 0.2 \\&= 45\end{aligned}$$

38.  $x = -3 + \sqrt{5}$ ,  $y = 3 + \sqrt{5}$  일 때  $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$  의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답:  $-\frac{3}{2}$

해설

$$y - x = 3 + \sqrt{5} - (-3 + \sqrt{5})$$

$$= 3 + \sqrt{5} + 3 - \sqrt{5} = 6$$

$$xy = (-3 + \sqrt{5})(3 + \sqrt{5})$$

$$= (\sqrt{5} - 3)(\sqrt{5} + 3)$$

$$= 5 - 9 = -4$$

$$\therefore \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{y - x}{xy} = \frac{6}{-4} = -\frac{3}{2}$$

39.  $ab = -4$ ,  $(a+2)(b+2) = 10$  일 때,  $a^3 + b^3 + a^2b + ab^2$  의 값은?

- ① 121      ② 134      ③ 146      ④ 152      ⑤ 165

해설

$$\begin{aligned}(a+2)(b+2) &= ab + 2(a+b) + 4 = 10 \\ ab = -4 \text{ 를 대입하면 } a+b &= 5 \\ \text{한편 } a^2 + b^2 &= (a+b)^2 - 2ab = 5^2 - 2 \cdot (-4) = 33 \\ \therefore a^3 + b^3 + a^2b + ab^2 &= a^2(a+b) + b^2(a+b) \\ &= (a^2 + b^2)(a+b) \\ &= 33 \times 5 \\ &= 165\end{aligned}$$

40. 밑면의 높이가  $x^2 - 3y + 1$ 인 직육면체의 부피가  $x^3 + 2x^2 - 3xy + x - 6y + 2$  일 때, 이 직육면체의 높이가  $ax + b$ 이다.  $a + b$ 의 값을 구하시오.

▶ 답:

▷ 정답:  $a + b = 3$

해설

$$\begin{aligned} & x^3 + 2x^2 - 3xy + x - 6y + 2 \\ &= x^2(x + 2) - 3y(x + 2) + x + 2 \\ &= (x + 2)(x^2 - 3y + 1) \\ \text{따라서 } & a = 1, b = 2 \text{ 이므로} \\ & a + b = 3 \text{ 이다.} \end{aligned}$$