



1. 이차방정식 $(3x-4)^2 - 2(x-3)^2 = 0$ 을 x^2 의 계수가 7인 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 꼴로 나타낼 때, $ac - b$ 의 값을 구하여라.



답:

2. 이차방정식 $(x - 1)(x - 5) = 4$ 를 $(x + p)^2 = q$ 의 꼴로 나타내려고 한다. 이 때, $p + q$ 의 값을 구하여라.



답:

3. 이차방정식 $x^2 + 8x + 24 - m = 0$ 의 중근을 갖도록 하는 m 의 값은?

① -8


② -6

③ 0

④ 6

⑤ 8

4. 이차방정식 $(x - 4)^2 = 8$ 의 두 근을 a, b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하여라.



답:

5. 이차방정식 $\frac{1}{5}(x - 2)^2 = 0.5x^2 - 0.4(x + 1)$ 을 풀면?

① $-2 \pm 2\sqrt{10}$


④ $\frac{-2 \pm 2\sqrt{10}}{7}$

② $\frac{-2 \pm 2\sqrt{10}}{3}$

⑤ $\frac{-2 \pm 2\sqrt{10}}{9}$


③ $\frac{-2 \pm 2\sqrt{10}}{5}$

6. 이차방정식 $\frac{1}{2}(x+3)^2 = 8$ 의 두 근의 합을 구하여라.



답:

7. 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 근이 $-1, 2$ 이고, $bx^2 + ax + 1 = 0$ 의
두 근을 α, β 라고 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하여라.



답:

8. 이차방정식 $x^2 - ax - 12 = 0$ 의 두 근이 $-3, b$ 일 때, a, b 의 값을 구하면?

① $a = 1, b = 3$


② $a = 2, b = 4$

③ $a = 1, b = 4$

④ $a = -1, b = -4$

⑤ $a = 1, b = -4$

9. 이차방정식 $x^2 + 2x = 4 - k$ 이 근을 갖지 않기 위한 상수 k 의 값의 범위를 구하여라.



답:

10. 다음 방정식 중에서 중근을 갖지 않는 것은?

① $x^2 - 4x + 4 = 0$


② $x^2 + 3x + \frac{9}{4} = 0$

③ $x^2 = x - 1$

④ $x^2 = x - \frac{1}{4}$

⑤ $x^2 - 6x = -9$

11. 이차방정식 $x^2 - 4x - 5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ 을 두 근으로 하는 이차방정식을 구하여라. (단, x^2 의 계수는 5이다.)



답: