

1.  $(-1)^n + (-1)^{n+1}$ 의 값은? ( $n$ 은 자연수)

- ① 0      ② -1      ③ 1      ④ -2      ⑤ 2

해설

$$\begin{aligned} n = 2k : (-1)^n + (-1)^{n+1} \\ &= (-1)^{2k} + (-1)^{2k+1} \\ &= 0 \\ n = 2k - 1 : (-1)^n + (-1)^{n+1} \\ &= (-1)^{2k-1} + (-1)^{2k} \\ &= 0 \end{aligned}$$

해설

$$\begin{aligned} n = \text{홀수일 때}, n+1 = \text{짝수}, \\ (-1)^n + (-1)^{n+1} = -1 + 1 = 0 \\ n = \text{짝수일 때}, n+1 = \text{홀수}, \\ (-1)^n + (-1)^{n+1} = 1 + (-1) = 0 \end{aligned}$$

2.  $(a - b + c)(a - b - c)$  를 전개하면?

- ①  $-a^2 + b^2 - c^2 + 2ca$       ②  $a^2 - b^2 + c^2 + 2ab$   
③  $a^2 + b^2 + c^2 + abc$       ④  $a^2 - b^2 - c^2 + 2bc$   
⑤  $a^2 + b^2 - c^2 - 2ab$

해설

$$\begin{aligned}(a - b + c)(a - b - c) \\ &= [(a - b) + c][(a - b) - c] \\ &= (a - b)^2 - c^2 \\ &= a^2 + b^2 - c^2 - 2ab\end{aligned}$$

3. 다항식  $(x^2 + 2x - 3)(3x^2 + x + k)$ 의 전개식에서 일차항의 계수가 15일 때, 상수  $k$ 의 값은?

① -3      ② 0      ③ 3      ④ 6      ⑤ 9

해설

상수항과 일차항만의 합을 구하면,

$$-3x + 2kx = 15x$$

$$\therefore k = 9$$

4.  $b, c$ 는 상수이고, 모든 실수  $x$ 에 대하여  $(x+2)(x+b) = x^2 + cx + 6$ 을 만족하는  $c$ 의 값은?

① -5      ② -3      ③ -1      ④ 3      ⑤ 5

해설

$$(x+2)(x+b) = x^2 + cx + 6,$$
$$x^2 + (2+b)x + 2b = x^2 + cx + 6,$$

$$2+b = c, 2b = 6$$

$$\therefore b = 3$$

$$\text{따라서 } c = 5$$

5. 다음 그림의 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이를 나타내는 식을 세워 전개하였을 때,  $y^2$  항의 계수는?



- ① -2      ② -1      ③ 0      ④ 1      ⑤ 2

해설

$$\begin{aligned}(x + 4y)(3x) - (x + y)(x - y) \\= 3x^2 + 12xy - x^2 + y^2 \\= 2x^2 + 12xy + y^2\end{aligned}$$

6. 다항식  $x^3 + ax + b$ 가 다항식  $x^2 - x + 1$ 로 나누어 떨어지도록 상수  $a + b$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 1

해설

나누어 떨어지려면 나머지가 0이어야 하므로

$x^2 = x - 1$ 을 대입하면

$$ax + (b - 1) = 0$$

이 등식이  $x$ 에 대한 항등식이므로,

$$a = 0, b - 1 = 0$$

$$\therefore a = 0, b = 1$$

$$\therefore a + b = 1$$

해설

$$x^3 + ax + b$$

$$= (x^2 - x + 1)Q(x)$$

$$= (x^2 - x + 1)(x + b)$$

$$\therefore b = 1, a = 0$$

7.  $x$ 에 관한 삼차식  $x^3 + mx^2 + nx + 1$ 을  $x+1$ 로 나누면 나머지가 5이고,  $x-2$ 로 나누면 나머지가 3이다. 이 때, 상수  $m-n$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 5

해설

나머지 정리를 이용한다.

주어진 식에  $x = -1, x = 2$ 를 각각 대입하면,

$$(-1)^3 + m(-1)^2 + n(-1) + 1 = 5 \cdots \textcircled{\text{R}}$$

$$(2)^3 + m(2)^2 + n \cdot 2 + 1 = 3 \cdots \textcircled{\text{L}}$$

⑦, ⑧을 연립하면,

$$m = \frac{2}{3}, n = -\frac{13}{3}$$

$$\therefore m - n = 5$$

8. 다항식  $f(x) = 3x^3 + ax^2 + bx + 12$  가  $x - 2$ 로 나누어 떨어지고 또,  $x - 3$ 으로도 나누어 떨어지도록 상수  $a + b$ 의 값을 정하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -5

해설

$f(x)$  가  $x - 2$ 로 나누어 떨어지려면

$$f(2) = 24 + 4a + 2b + 12 = 0$$

$$\therefore 4a + 2b + 36 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{⑦}$$

또,  $f(x)$  가  $x - 3$ 으로 나누어 떨어지려면

$$f(3) = 81 + 9a + 3b + 12 = 0$$

$$\therefore 9a + 3b + 93 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{⑧}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면  $a = -13$ ,  $b = 8$

9.  $x^2 - 2x - y^2 + 2y$ 를 인수분해 하였더니  $(x + ay)(x - by + c)$ 가 된다고 할 때,  $a + b + c$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -4

해설

$$\begin{aligned}x^2 - 2x - y^2 + 2y \\&= (x^2 - y^2) - 2(x - y) \\&= (x + y - 2)(x - y) \\&= (x + ay)(x - by + c) \\&\text{계수를 비교하면} \\a = -1, b = -1, c = -2 \\&\therefore a + b + c = -1 - 1 - 2 = -4\end{aligned}$$

10.  $(a+1)(a^2-a+1) = a^3+1$  을 이용하여  $\frac{1999^3+1}{1998 \times 1999 + 1}$  의 값을

구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 2000

해설

$$a = 1999 \text{ 라 하면 } 1998 \times 1999 + 1 = (a-1)a + 1 = a^2 - a + 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1999^3+1}{1998 \times 1999 + 1} &= \frac{a^3+1}{a^2-a+1} \\ &= \frac{(a+1)(a^2-a+1)}{a^2-a+1} \\ &= a+1 = 2000 \end{aligned}$$

11. 두 다항식  $x^3 + 1$ ,  $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ 의 최대공약수를 구하면?

- ①  $x$       ②  $x + 1$       ③  $x + 2$       ④  $x - 1$       ⑤  $x - 2$

해설

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$$

$$x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = (x - 2)(x + 1)(x + 3)$$

따라서 최대공약수는  $x + 1$

12. 다항식  $f(x)$ 를 다항식  $g(x)$ 로 나눈 나머지를  $r(x)$  라 할 때,  $f(x) - g(x) - 2r(x)$ 를  $g(x)$ 로 나눈 나머지는?

- ①  $-2r(x)$       ②  $-r(x)$       ③ 0  
④  $r(x)$       ⑤  $2r(x)$

해설

$f(x)$ 를  $g(x)$ 로 나눈 몫을  $Q(x)$  라 하면

$$f(x) = g(x)Q(x) + r(x)$$

$$\therefore f(x) - g(x) - 2r(x)$$

$$= g(x)Q(x) + r(x) - g(x) - 2r(x)$$

$$= g(x) \{ Q(x) - 1 \} - r(x)$$

여기서  $g(x)$ 의 차수는  $-r(x)$ 의 차수보다 높으므로 구하는 나머지는  $-r(x)$ 이다.

13. 다음 식  $(3x^2 - x + 2)(4x^3 - 5x^2 + x + 1)^5$  을 전개했을 때, 계수들의 총합은?

① 4      ② -32      ③ -64      ④ 32      ⑤ 64

해설

다항식의 계수들의 총합을 구할 경우

$x = 1$  을 대입한다.

$$(3 - 1 + 2)(4 - 5 + 1 + 1)^5 = 4 \times 1 = 4$$

14. 다항식  $f(x)$ 에 대하여,  $f\left(\frac{1}{2}\right) = 3$ ,  $f\left(\frac{1}{3}\right) = 1$  일 때,  $f(x)$  를

$(2x - 1)(3x - 1)$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

▶ 답:

▷ 정답:  $12x - 3$

해설

구하는 나머지를  $ax + b$  라 하면

$$f(x) = (2x - 1)(3x - 1)Q(x) + ax + b$$

$x = \frac{1}{2}$ ,  $x = \frac{1}{3}$  을 각각 양변에 대입하면

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}a + b = 3, f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}a + b = 1$$

두 식을 연립하여 풀면  $\frac{1}{6}a = 2 \Rightarrow a = 12, b = -3$

$\therefore$  구하는 나머지는  $12x - 3$

15.  $x$ 의 다항식  $f(x)$ 를  $x + 1$ 로 나눌 때, 나머지가 2이다. 이 때,  $(x^2 - x + 3)f(x)$ 를  $x + 1$ 로 나눈 나머지를 구하면?

① 10      ② 6      ③ 0      ④ 30      ⑤ 12

해설

$$\begin{aligned}f(-1) &= 2 \\(x^2 - x + 3)f(x) &= (x+1)Q(x) + R\end{aligned}$$

$x = -1$  대입

$$\therefore R = 5f(-1) = 5 \times 2 = 10$$

16. 이차항의 계수가 1인 두 이차 다항식의 최대공약수가  $x + 2$ 이고,  
최소공배수가  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 일 때, 두 다항식의 합은?

- ①  $2(x + 2)(x - 1)$       ②  $2(x + 2)(x - 2)$   
③  $(x + 2)(x - 2)$       ④  $2(x + 1)(x - 1)$   
⑤  $(x + 1)(x - 1)$

해설

$$L = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$$

두 다항식은  $(x - 1)(x + 2)$ ,  $(x - 3)(x + 2)$   
두 다항식의 합은  $2(x + 2)(x - 2)$

17. 다음 보기 중  $ab(b-a) + ac(c-a) + bc(2a-b-c)$ 의 인수인 것을 모두 고르면?

①  $a-b$        ②  $b+c$        ③  $a-c$

④  $b-c$ ,  $a+b$        ⑤  $a-b, b+c, a-c$

해설

$$\begin{aligned} & ab(b-a) + ac(c-a) + bc(2a-b-c) \\ &= ab^2 - a^2b + ac^2 - a^2c + 2abc - b^2c - bc^2 \\ &= -(b+c)a^2 + (b^2 + 2bc + c^2)a - bc(b+c) \\ &= -(b+c)|a^2 - (b+c)a + bc| \\ &= -(b+c)(a-b)(a-c) \\ &= (a-b)(b+c)(c-a) \end{aligned}$$

18. 삼각형의 세 변의 길이  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 에 대하여  $(a+b-c)(a-b+c) = b(b+2c)+(c+a)(c-a)$ 가 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① 직각삼각형      ② 이등변삼각형      ③ 정삼각형  
④ 예각삼각형      ⑤ 둔각삼각형

해설

$$\begin{aligned} & (a+b-c)(a-b+c) \\ &= b(b+2c)+(c+a)(c-a) \text{에서} \\ & |a+(b-c)| |a-(b-c)| = b^2 + 2bc + c^2 - a^2 \\ & a^2 - b^2 + 2bc - c^2 = -a^2 + b^2 + c^2 + 2bc \\ & 2a^2 = 2b^2 + 2c^2 \\ & \therefore a^2 = b^2 + c^2 \end{aligned}$$

따라서, 이 삼각형은 빗변의 길이가  $a$ 인 직각삼각형이다.

19.  $a + b + c = 0$  일 때, 다음 중  $2a^2 + bc$  와 같은 것은?

- ①  $(a - c)^2$       ②  $(b + c)^2$       ③  $(a + b)(b + c)$   
④  $(a - b)(a - c)$       ⑤  $(a - b)(a + c)$

해설

$$\begin{aligned} 2a^2 + bc &= 2a^2 - b(a + b) \quad (\because c = -a - b) \\ &= 2a^2 - ab - b^2 \\ &= (a - b)(2a + b) \\ &= (a - b)(a + b + a) \\ &= (a - b)(a - c) \quad (\because a + b = -c) \end{aligned}$$

20. 다음은 유클리드 호제법 ‘두 다항식  $A$ ,  $B$ 에 대하여  $A$ 를  $B$ 로 나눈 나머지를  $R$ 라 하면  $A$ 와  $B$ 의 최대공약수는  $B$ 와  $R$ 의 최대공약수와 같다.’를 보이는 과정이다.

$A$ ,  $B$ 의 최대공약수를  $G$  라 하면,

$A = Ga$ ,  $B = Gb$  (단,  $a$ ,  $b$ 는 서로소)로 나타낼 수 있다.

$A$ 를  $B$ 로 나눈 몫을  $Q$  라 하면

$$A = BQ + R \text{에서 } Ga = GbQ + R$$

$$\therefore R = G(a - bQ)$$

즉,  $G$ 는  $B$ 와  $R$ 의 (가)이다.

한편,  $b$ 와  $a - bQ$ 가 (나)가 아니라면

(가)  $m$  (일차이상의 다항식)이 존재하여

$b = mk$ ,  $a - bQ = mk'$ 이 성립한다.

$$a = mk' + bQ = mk' + mkQ = m(k' + kQ)$$

즉,  $a$ 와  $b$ 의 (가)  $m$ 이 존재하므로

$a$ 와  $b$ 가 서로소라는 가정에 모순이다.

따라서  $b$ 와  $a - bQ$ 는 (나)이다.

$$B = Gb$$
,  $R = G(a - bQ)$ 에서

$b$ 와  $a - bQ$ 가 (나) 이므로  $B$ 와  $R$ 의 최대공약수는  $A$ 와  $B$ 의 최대공약수  $G$ 와 같다.

( )안의 (가), (나)에 알맞은 것은?

① 공약수, 공약수

② 공약수, 서로소

③ 공약수, 공배수

④ 공배수, 서로소

⑤ 공배수, 공약수

해설

$A$ ,  $B$ 의 최대공약수를  $G$  라 하면

$A = Ga$ ,  $B = Gb$  (단,  $a$ ,  $b$ 는 서로소)이고,

$A$ 를  $B$ 로 나눈 몫을  $Q$  라 하면

$$A = BQ + R \text{에서 } Ga = GbQ + R$$

$$\therefore R = (a - bQ)G$$

즉,  $G$ 는  $B$ 와  $R$ 의 공약수이다.

한편,  $b$ 와  $a - bQ$ 가 서로소가 아니라면

공약수인  $m$ 이 존재하여

$$b = mk$$
,  $a - bQ = mk'$

$$a = mk' - kQ = mk' + mkQ = m(k' + kQ)$$

즉,  $a$ 와  $b$ 의 공약수  $m$ 이 존재하므로  $a$ 와  $b$ 가 서로소라는 것에

모순된다.

따라서  $b$ 와  $a - bQ$ 는 서로소이다.

$B = Gb$ ,  $R = G(a - bQ)$ 에서  $a$ 와  $a - bQ$ 가 서로소이므로  $B$

와  $R$ 의 최대공약수는  $A$ 와  $B$ 의 최대공약수와 같다.