

1. $f : X \rightarrow Y$ 가 상수함수이고, $f(100) = 100$ 일 때, $f(2006) = a$ 이다.
 $a + 100$ 의 값은?

① 0

② 100

③ 200

④ 300

⑤ 400

해설

상수함수에 정의에 의해 $f(x) = 100$

$\therefore f(2006) = 100 = a$

따라서 $a + 100 = 200$

2. 함수 $f(x) = x^3 + x^2 + x - 5$ 일 때, $(f \circ f)(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지를 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : -11

해설

$$\begin{aligned}(f \circ f)(x) &= (x^3 + x^2 + x - 5)^3 \\ &\quad + (x^3 + x^2 + x - 5)^2 + (x^3 + x^2 + x - 5) - 5\end{aligned}$$

$(f \circ f)(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지는 나머지 정리에 의하여 위의 식에 $x=1$ 을 대입한 것과 같다.

$f(1) = -2$ 이므로

$$\therefore f(f(1)) = (-2)^3 + (-2)^2 + (-2) - 5 = -11$$

3. 집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에서 X 로의 일대일대응 중에서 $f(x) \neq x$ 를 만족시킬 때, $f(2) + f^{-1}(2)$ 의 값은 얼마인가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

해설


$f(x) \neq x$ 이므로 $f(1) = 2$ 또는 $f(1) = 3$ 이다.

(i) $f(1) = 2$ 이면

$f(3) \neq 3$ 이므로

$f(3) = 1, f(2) = 3$


$\therefore f(2) + f^{-1}(2) = 3 + 1 = 4$



(ii) $f(1) = 3$ 이면 $f(2) \neq 2$ 이므로

$f(2) = 1, f(3) = 2$

$\therefore f(2) + f^{-1}(2) = 1 + 3 = 4$



(i) , (ii) 에서

$f(2) + f^{-1}(2) = 4$

4. 함수 $f(x) = x - 2$, $g(x) = -2x + 1$ 일 때, $(f \circ g^{-1})(x)$ 를 구하면?


- ① $y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$ ② $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ ③ $y = \frac{1}{2}x$
④ $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$ ⑤ $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

해설

$$(g^{-1})(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}(f \circ g^{-1})(x) &= f(g^{-1}(x)) \\ &= \left(-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) - 2 \\ &= -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}\end{aligned}$$

5. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같이 원점과 두 점 $(1, 1), (-1, -2)$ 를 각각 지나는 두 반직선으로 이루어져 있다. 이 때, [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은 무엇인가?



보기


- ㉠ $f(10) = f(f(10))$
 ㉡ $f^{-1}(-2) = -1$
 ㉢ $y = f(x)$ 의 그래프와 $f(x)$ 의 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 두 개뿐이다.

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

해설

- ㉠ $f(10) = 10$
 $f(f(10)) = f(10) = 10$
 $\therefore f(10) = f(f(10))$ (참)
 ㉡ $f(-1) = -2 \Leftrightarrow f^{-1}(-2) = -1$ (참)
 ㉢ $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 $y = f(x)$ 의 그래프를 $y = x$ 에 대하여 대칭이동시킨 그래프이다.
 따라서 $y = f(x)$ 와 $y = f^{-1}(x)$ 는 무수히 많은 점에서 만난다. (거짓)
 따라서 옳은 것은 ㉠, ㉡ 이다.

6. 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 를 만족시키는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 일부분이 다음 그림과 같이 지워져 있다. 다음 보기는 함수 $y = f(x)$ 에 대한 설명이다. M, N 의 합을 구하여라.




$-4 \leq x \leq -2$ 일 때, $f(x)$ 의 최댓값은 M 이고, $0 \leq x \leq 2$ 일 때, $f(x)$ 의 최댓값은 N 이다.

▶ 답 :

▷ 정답 : 3



해설

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 를 만족시키므로 주어진 함수는 기함수 즉, 원점 대칭이다. 따라서 그래프를 완성하면 다음 그림과 같으므로




$-4 \leq x \leq -2$ 일 때,
 $f(x)$ 의 최댓값 $M = 2$ 이고,
 $0 \leq x \leq 2$ 일 때,
 $f(x)$ 의 최댓값 $N = 1$ 이다.
 $\therefore M + N = 3$

8. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형의 변 $ABCD$ 위를 움직이는 동점 P 가 있다. 점 P 는 A 점에서 출발, 일정한 속력으로 점 B 를 돌아 다시 점 A 로 돌아온다. 점 P 가 움직인 거리를 x , 선분 AP 가 지나간 부분의 넓이를 $f(x)$ 라 할 때, 다음 중 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형으로 옳은 것은?



해설



x 의 크기에 따른 넓이의 변화를 살펴보면

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (0 \leq x \leq 1) \\ \frac{1}{2}(x-1) & (1 \leq x \leq 2) \\ \frac{1}{2}(x-1) & (2 \leq x \leq 3) \\ 1 & (3 \leq x \leq 4) \end{cases} \quad \text{한편, 각 구간의 경계점에서}$$

함수는 연속이므로 ②가 옳다.

10. 일차 이하의 다항함수 $y = f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족한다.

- I. $f(0) \leq f(1)$
II. $f(2) \geq f(3)$
III. $f(1) = 1$

이 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

- < 보기 >
- $\textcircled{\tiny \neg}$ $f(2) = 1$

$\textcircled{\tiny \cup}$ $f(3) = 3f(1)$
- $\textcircled{\tiny \cap}$ $f(-1) > f(1)$

- $\textcircled{1} \textcircled{\tiny \neg}$

$\textcircled{2} \textcircled{\tiny \cup}$

$\textcircled{3} \textcircled{\tiny \neg}, \textcircled{\tiny \cup}$
- $\textcircled{4} \textcircled{\tiny \neg}, \textcircled{\tiny \cap}$

$\textcircled{5} \textcircled{\tiny \neg}, \textcircled{\tiny \cup}, \textcircled{\tiny \cap}$

해설

일차 이하의 다항함수 중
조건 I, II를 만족하는함수는
상수함수이므로 조건 III에 의하여 $f(x) = 1$ 이다.
따라서 옳은 것은 $\textcircled{\tiny \neg}$ 뿐이다.

11. 함수 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ 에 대하여 방정식 $(f \circ f)(x) = x^3$ 의 해의 합을 구하면?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

해설

$$\begin{aligned}(f \circ f)(x) &= f(f(x)) = f\left(\frac{x}{x-1}\right) \\ &= \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x}{x-1} - 1} = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x-x+1}{x-1}} = x\end{aligned}$$

$$\therefore x^3 = x, \quad x^3 - x = 0, \quad x(x-1)(x+1) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ or } 0 \text{ or } 1$$

그런데 $x \neq 1$ 이므로 $x = -1 \text{ or } 0$

$$\therefore -1 + 0 = -1$$

12. $f\left(\frac{2x-1}{3}\right) = 4-2x$ 일 때, $(f \circ f)(2)$ 의 값을 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : 12

해설


$\frac{2x-1}{3} = t$ 로 놓으면

$2x-1 = 3t$ 이므로 $x = \frac{3t+1}{2}$

$f(t) = 4 - 2 \cdot \frac{3t+1}{2} = -3t + 3$

$\therefore (f \circ f)(2) = f(f(2)) = f(-3) = 12$

13. $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 방정식 $(f \circ f)(x) = 1$ 의 서로 다른 실근의 개수는?



- ① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개
 ④ 4 개 ⑤ 무수히 많다.

해설

$$f(x) = \begin{cases} y = x(x \leq 2) & \cdots \textcircled{A} \\ y = -x + 4(x > 2) & \cdots \textcircled{B} \end{cases}$$

①에서는 $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(x) = x$
 $\therefore x = 1$

②에서는 $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(-x + 4)$
 $= -x + 4$

$\therefore x = 3$
 실근의 개수 : 2 개.

14. 두 함수 $f(x) = x + 1$, $g(x) = \sqrt{x}$ 에 대하여 $(f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(2)$ 의 값을 구하여라.


▶ 답 :

▷ 정답 : 9

해설

$$\begin{aligned} g^{-1}(x) &= x^2 \text{ 이므로} \\ (f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(2) &= (f \circ f^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(2) \\ &= (g^{-1} \circ f)(2) \\ &= g^{-1}(f(2)) \\ &= g^{-1}(3) \\ &= 9 \end{aligned}$$

15. 다음 그림에서 곡선은 함수 $y = f(x)$ 의 그래프이고 직선은 $y = x$ 의 그래프이다. $(f \circ f)(d) + (g \circ g)(c)$ 를 구하면? (단, $g(x) = f^{-1}(x)$ 이다.)



- ① $2a$ ② $b + e$ ③ $c + d$
 ④ $2c$ ⑤ $b + c$

해설

$(f \circ f)(d) = b, (g \circ g)(c) = e$
 f 와 g 는 역함수 관계. 즉 $y = x$ 에 대칭이다.


16. 함수 $2|x| + |y| = 4$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : 16

해설

$2|x| + |y| = 4$ 의 그래프는 $2x + y = 4$,
즉 $y = -2x + 4$ 의 그래프에서
 $x \geq 0, y \geq 0$ 인 부분만 남기고,
이 그래프를 x 축, y 축, 원점에 대하여 각
각 대칭시킨 것이므로 다음 그림과 같다.
따라서 구하는 도형의 넓이는 $8 \times 4 \times \frac{1}{2} =$
16



17. 함수 $y = |x - 2| + |x + 1|$ 이 $x = m$ 일 때, 최솟값을 갖는다. 이를 만족시키는 정수 m 의 개수는?

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

해설

$y = |x - 2| + |x + 1|$ 에서

i) $x < -1$ 일 때,

$$y = -(x - 2) - (x + 1) = -2x + 1$$


ii) $-1 \leq x < 2$ 일 때,

$$y = -(x - 2) + (x + 1)$$

iii) $x \geq 2$ 일 때,

$$y = (x - 2) + (x + 1) = 2x - 1 = 3$$

이상에서 주어진 함수의 그래프가 다음 그림과 같으므로 y 의 최솟값은 3 이고 이때, 정수 m 은 $-1, 0, 1, 2$ 의 4 개다.



18. 임의의 양의 실수 x 에 대하여, x 를 넘지 않는소수의 개수를 $f(x)$ 라 하자. 예를 들면 $f\left(\frac{5}{2}\right) = 1, f(5) = 3$ 이다.<보기> 중 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

- ㉠ $f(10) = 4$
- ㉡ 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) < x$ 이다.
- ㉢ 임의의 양의 실수 x 에 대하여 $f(x+1) = f(x)$ 이다.

- ① ㉠

② ㉠, ㉡

③ ㉠, ㉢
- ④ ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

해설

10 이하의 소수는 2,3,5,7 이므로 $f(10) = 4$
㉡ $f(x) < [x] \leq x$ 이므로 $f(x) < x$
㉢ $x = 2$ 인 경우 $f(3) = 2, f(2) = 1$ 이므로 $f(3) \neq f(2)$
따라서 옳은 것은 ㉠, ㉡이다.

19. 임의의 두 실수 a, b 에 대하여 $f(a+b) = f(a) + f(b)$ 를 만족하는 $f(x)$ 는?

① $f(x) = x^2 - 4$

② $f(x) = \frac{x}{x+1}$

③ $f(x) = x^2 + 1$

④ $f(x) = 2x$

⑤ $f(x) = \sqrt{x+1}$

해설

$f(x) = 2x$ 에서

$f(a+b) = 2(a+b)$

$f(a)+f(b) = 2a+2b$ 이므로 $f(a+b) = f(a)+f(b)$ 가 성립한다.

∴ ④

20. $f(x) = x^2 - x$ 로 나타내어지는 함수 $f : A \rightarrow A$ 는 $A = \{x \mid x \geq a\}$ 이면 일대일대응이다. a 의 값을 구하면 ?

- ① 4
- ② 2
- ③ $\frac{1}{3}$
- ④ $\frac{1}{4}$
- ⑤ 0

해설

$f : A \rightarrow A$ 가 일대일함수이므로
그림에서 $a \geq \frac{1}{2}$ 이고 또한 일대일대
응이므로
 $A = \{x \mid x \geq a\}$ 에서 $f(a) = a$ 이어야
한다.
 $f(x) = x^2 - x$ 에서 $f(a) = a$ 이므로
 $a^2 - a = a \rightarrow a^2 - 2a = 0$
 $\therefore a = 0, 2$
그런데, $a \geq \frac{1}{2}$ 이므로
 $\therefore a = 2$

21. 함수 $y = f(x)$ 에서 $f^{(2)} = f \circ f$, $f^{(3)} = f \circ f^{(2)}$, $\dots$, $f^{(n)} = f \circ f^{(n-1)}$ 라 정의한다. $f(x) = 2x - 1$ 에 대하여 $f(1) + f^{(2)}(1) + f^{(3)}(1) + \dots + f^{(2008)}(1)$ 의 값을 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : 2008

해설

$f(1) = 1$,
 $f^{(2)}(x) = (f \circ f)(x) = f(2x - 1) = 4x - 3$ 에서 $f^{(2)}(1) = 1$,
 $f^{(3)}(x) = (f \circ f^{(2)})(x) = f(4x - 3) = 8x - 7$ 에서 $f^{(3)}(1) = 1$
 $f^{(4)}(x) = (f \circ f^{(3)})(x) = f(8x - 7) = 16x - 15$ 에서 $f^{(4)}(1) = 1$ 이다.
이와 같이 추론하면 $f^{(n)}(x) = 2^n x - (2^n - 1)$, $f^{(n)}(1) = 1$ 이다.
 $\therefore f(1) + f^{(2)}(1) + f^{(3)}(1) + \dots + f^{(2008)}(1) = 1 \times 2008 = 2008$

22. $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하면 $g(0) = 5$ 가 된다. $f(2x + 1) = h(x)$ 로 하고, $h(x)$ 의 역함수를 $e(x)$ 로 할 때 $e(0)$ 의 값은 ?

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

해설

$f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로
 $g(x) = f^{-1}(x)$, $g(0) = f^{-1}(0) = 5$
 $\therefore f(5) = 0$ 문제의 조건에서
 $f(5) = f(2 \times 2 + 1) = h(2) = 0$
또 $e(x) = h^{-1}(x)$ 이므로 $e(0) = h^{-1}(0)$
 $\therefore h(2) = 0$ 이므로 $h^{-1}(0) = e(0) = 2$

23. 실수 전체의 집합 R 에 대하여 R 에서 R 로의 함수 $f(x)$ 가 아래와 같이 정의되었다고 하자.

$$f(x) = \begin{cases} 2x - a & (x \leq 0) \\ 3x + 1 & (x \geq 0) \end{cases} \text{ 함수 } f(x) \text{ 가 일대일대응일 때, } (f^{-1} \circ f^{-1} \circ$$

$f \circ f^{-1})(4)$ 의 값을 구하면?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

해설

$$f(x) = \begin{cases} 2x - a & (x \leq 0) \\ 3x + 1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

$$f(0) = 1 = -a$$

$$\therefore a = -1$$

$$(f^{-1} \circ f^{-1} \circ f \circ f^{-1})(4) = (f^{-1} \circ f^{-1})(4)$$

$$(f^{-1} \circ f^{-1})(4) = f^{-1}(f^{-1}(4))$$

$$f^{-1}(4) = k \text{ 라 하면 } f(k) = 4$$

$$3k + 1 = 4 \text{ } (\because x \leq 0 \text{ 에서 } 2x + 1 \leq 1) k = 1 \text{ 이고}$$

$$\therefore (f^{-1} \circ f^{-1})(4) = f^{-1}(1)$$

$$f^{-1}(1) = m, f(m) = 1 \text{ 에서 } 2m + 1 = 1 \text{ (또는 } 3m + 1 = 1 \text{)},$$

$$m = 0$$

$$\therefore (f^{-1} \circ f^{-1} \circ f \circ f^{-1})(4) = 0$$


24. 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 집합 A 에서 A 로의 함수 중 $f = f^{-1}$ 를 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하여라.

▶ 답: 개

▷ 정답 : 4개




해설

i) $f(x) = x$ 인 경우 1개



ii) 1개의 원소는 자기 자신에 대응되고, 나머지 2개의 원소는 서로 엮어져 대응되며 된다

자기 자신에 대응되는 원소가 1, 2, 3인 3 가지 경우가 있다.



i), ii) 에서 구하는 함수 f 의 개수는 $1 + 3 = 4$ (개)

25. 함수 $y = [x] - x$ 와 $y = \frac{1}{3}x$ 의 그래프가 만나는 점은 a 개이고, 이 점들의 x 좌표의 합은 b 이다. 이 때, $a + b$ 의 값은? (단, $[x]$ 는 x 를 넘지 않는 최대 정수이다.)

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

해설

$-3 \leq x < -2$ 일 때, $[x] = -3$ 이므로

$$y = [x] - x = -3 - x$$

$-2 \leq x < -1$ 일 때, $[x] = -2$ 이므로

$$y = [x] - x = -2 - x$$

$-1 \leq x < 0$ 일 때, $[x] = -1$ 이므로

$$y = [x] - x = -1 - x$$


$0 \leq x < 1$ 일 때, $[x] = 0$ 이므로

$$y = [x] - x = -x$$

$1 \leq 2x < 2$ 일 때, $[x] = 1$ 이므로

$$y = [x] - x = 1 - x$$

따라서 $y = [x] - x$ 와 $y = \frac{1}{3}x$ 의 그래프는 다음과 같다.



그러므로 두 그래프가 만나는 점은 4개이고

만나는 점의 x 좌표는 다음과 같다.

$$\text{i) } -3 \leq x < -2 \text{ 일 때, } -3 - x = \frac{1}{3}x \quad \therefore x = -\frac{9}{4}$$

$$\text{ii) } -2 \leq x < -1 \text{ 일 때, } -2 - x = \frac{1}{3}x \quad \therefore x = -\frac{3}{2}$$

$$\text{iii) } -1 \leq x < 0 \text{ 일 때, } -1 - x = \frac{1}{3}x \quad \therefore x = -\frac{3}{4}$$

$$\text{iv) } 0 \leq x < 1 \text{ 일 때, } -x = \frac{1}{3}x \quad \therefore x = 0$$

$$\therefore a = 4, b = \left(-\frac{9}{4}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{9}{2}$$

$$\therefore a + b = 4 + \left(-\frac{9}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$