

1. 다항식  $5xy - yx^2 + 2x^3 + 2yz^2$ 에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ①  $x$ 의 계수는  $5y$ 이다.
- ②  $x^2$ 의 계수는  $-y$ 이다.
- ③  $x$ 에 대한 3차식이다.
- ④  $x$ 에 대한 상수항은  $2yz^2$ 이다.
- ⑤  $y, z$ 에 대한 2차식이다.

2.  $(3a + 3b) - 2b = 3a + (3b - 2b) = 3a + b$ 에서 사용된 법칙을 순서대로 나열한 것은?

- ① 결합법칙, 결합법칙
- ② 교환법칙, 결합법칙
- ③ 교환법칙, 분배법칙
- ④ 결합법칙, 분배법칙
- ⑤ 분배법칙, 결합법칙

3. 다음 중  $(x - y)^2(x + y)^2$  을 전개한 식은?

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| ① $x^4 - y^4$           | ② $x^2 - y^2$          |
| ③ $x^4 - 2x^2y^2 + y^4$ | ④ $x^4 - x^2y^2 + y^4$ |
| ⑤ $x^4 - 4x^2y^2 + y^4$ |                        |

4.  $1999 \times 2001$  의 값을 구하려 할 때, 가장 적절한 곱셈공식은?

- ①  $m(a + b) = ma + mb$
- ②  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- ③  $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$
- ④  $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
- ⑤  $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$

5. 모든 실수  $x$ 에 대하여 등식  $3x^2 + 2x + 7 = a(x+1)^2 + b(x+1) + c$  가 성립할 때, 상수  $c$ 의 값은?

① -6      ② -7      ③ 6      ④ 7      ⑤ 8

6. 등식  $2x^2 - 6x - 2 = a(x + 1)(x - 2) + bx(x - 2) + cx(x + 1)$  가  $x$  의  
값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수  $a + b + c$  의 값을 구하면?

① 2      ② 1      ③ 0      ④ -1      ⑤ -2

7. 다항식  $x^3 + 5x^2 - kx - k$  가  $x - 1$  로 나누어 떨어지도록 상수  $k$  의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

8. 다항식  $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$  을 인수분해하면?

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ① $(x - 1)^2(x + 1)$ | ② $(x + 1)^2(x - 1)$ |
| ③ $(x - 1)(x + 1)$   | ④ $(x - 1)^3$        |
| ⑤ $(x + 1)^3$        |                      |

9. 다항식  $x^4 - 3x^2 + ax + 5$ 를  $x + 2$ 로 나누면 나머지가 3이다.  $a$ 의 값은?

① 0      ② 2      ③ 3      ④ -2      ⑤ -3

10. 다항식  $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + k$ 가 일차식  $x - 1$ 을 인수로 가질 때, 이  
다항식  $f(x)$ 를 인수분해 하면?

- ①  $(x - 2)(x - 1)(x + 1)$       ②  $(x - 1)x(x + 2)$   
③  $(x + 1)(x - 1)(x + 2)$       ④  $(x - 2)(x - 1)(x + 2)$   
⑤  $(x - 2)(x + 1)(x + 2)$

11. 다항식  $f(x) = x^3 + ax^2 + 3$  을 일차식  $x - 1$  로 나누어 떨어지도록  $a$ 의 값을 정하면?

① -2      ② -4      ③ -6      ④ -8      ⑤ -10

12. 등식  $3x^2 + 2x + 1 = a(x - 1)^2 + b(x - 1) + c$   $\diamond$   $x$ 에 관한 항등식일 때, 상수  $b$ 의 값은?

① 3      ② -4      ③ 2      ④ 8      ⑤ 6

13. 다항식  $8x^3 - 1$  을  $4x^2 + 2x + 1$  로 나누었을 때의 몫을  $Q(x)$  라 할 때  
 $Q(x)$  의 상수항의 계수는?

① -2      ② -1      ③ 0      ④ 1      ⑤ 2

14.  $(a - b + c)(a + b - c)$ 를 전개한 식은?

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ① $a^2 + b^2 + c^2 - 2bc$ | ② $a^2 - b^2 + c^2 - 2bc$ |
| ③ $a^2 - b^2 - c^2 + 2bc$ | ④ $a^2 + b^2 - c^2 - 2bc$ |
| ⑤ $a^2 + b^2 + c^2 + 2bc$ |                           |

15. 등식  $f(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6 = (x+a)(x+b)(x+c)$  일 때,  $a+b+c$ 의 값은?

- ① 2      ② 3      ③ 4      ④ 5      ⑤ 6

16. 자연수  $N = p^nq^mr^l$ 로 소인수분해될 때, 양의 약수의 개수는  $(n + 1)(m + 1)(l + 1)$ 이다. 이 때,  $38^3 + 3 \cdot 38^2 + 3 \cdot 38 + 1$ 의 양의 약수의 개수는?

- ① 9 개      ② 12 개      ③ 16 개      ④ 24 개      ⑤ 32 개

17. 두 다항식  $x^2 + ax + b$ ,  $x^2 + 3bx + 2a$ 의 최대공약수가  $x - 1$  일 때,  
 $a + b$ 의 값을 구하면?

- ① 2      ② 1      ③ 0      ④ -1      ⑤ -2

18. 다항식  $x^5 \left( x + \frac{1}{x} \right) \left( 1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} \right)$  의 차수는?

- ① 2차      ② 3차      ③ 6차      ④ 7차      ⑤ 8차

19. 다음  $\boxed{\quad}$  안에 알맞은 수를 차례대로 써 넣어라.

$$(x^3 + 4x^2 + 3x - 2) \div (\boxed{\quad}x^2 + \boxed{\quad}x + \boxed{\quad}) = x + 2$$

▶ 답: \_\_\_\_\_

▶ 답: \_\_\_\_\_

▶ 답: \_\_\_\_\_

20.  $x$ 에 대한 다항식  $x^3 + ax^2 + bx + 2$ 를  $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지가  $x + 3$ 이 되도록  $a, b$ 의 값을 정할 때,  $ab$  값을 구하여라.

▶ 답:  $ab = \underline{\hspace{1cm}}$

21. 다음 식을 인수분해하면  $x^4 - 3x^2y^2 + 4y^4 = (x^2 + axy + by^2)(x^2 + cxy + dy^2)$  일 때,  $a + b + c + d$ 의 값을 구하여라. ( $a, b, c, d$ 는 상수)

▶ 답: \_\_\_\_\_

22. 두 다항식  $x^3 + 2x^2 - x - 2$ ,  
 $(x - 1)(3x^2 + ax + 2a)$ 의 최대공약수가 이차식이 되도록 상수  $a$ 의  
값을 구하여라.

▶ 답:  $a = \underline{\hspace{2cm}}$

23. 정식  $f(x)$ 를  $x^2 - 3x + 2$ 로 나눌 때 3이 남고,  $x^2 - 4x + 3$ 으로 나눌 때 3이 남는다.  $f(x)$ 를  $x^2 - 5x + 6$ 으로 나눌 때, 나머지를 구하면?

- ①  $6x - 1$       ②  $6x - 2$       ③  $6x - 3$   
④  $6x - 5$       ⑤  $6x - 9$

24. 이차식  $f(x)$ 를 각각  $x-3, x+1$ 로 나눈 나머지는 같고,  $f(1) = 0$  일 때,

$$\frac{f(4)}{f(-4)} = \frac{n}{m} \quad (m, n \text{은 서로소}) \text{이다. 이 때, } m+n \text{의 값을 구하여라.}$$

▶ 답: \_\_\_\_\_

25. 다음은 다항식  $A$  를 다항식  $B$  로 나누었을 때, 몫이  $Q$  이고 나머지가  $R$  이면,  $A, B$  의 최대공약수는  $B, R$  의 최대공약수임을 보이는 과정을 나타낸 것이다.

$A = BQ + R$  이 성립한다.  $A, B$  의 공약수를  $g$  라 하면  
 $A = ag, B = bg$  ( $a, b, g$  는 다항식)…⑦로 쓸 수 있다.  
이 때,  $R = A - BQ = (a - bQ)g$  에서  $g$  는  $R$  의 약수이다.  
 $\therefore g$  는  $B, R$  의 공약수이다. …⑧  
역으로,  $B, R$  의 공약수를  $g'$  이라 하면  
 $B = b'g', R = r'g'$  ( $b', r', g'$  은 다항식)…⑨으로 쓸 수 있다.  
이 때,  $A = BQ + R = (b'Q + r')g'$  에서  $g'$  은  $A$  의 약수이다.  
 $\therefore g'$  은  $A, B$  의 공약수이다. …⑩  
이상에서  $\{g \mid g$  는  $A, B$  의 공약수 $\} = \{g' \mid g'$  은  $B, R$  의 공약수 $\}$ …⑪  
 $\therefore A, B$  의 최대공약수는  $B, R$  의 최대공약수이다. …⑫

위 과정에서 옳지 않은 것은?

- ① ⑦, ⑨      ② ⑧, ⑩      ③ ⑪  
④ ⑫      ⑤ 없다.