

1. 다항식  $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$  을 인수분해하면?

①  $(x - 1)^2(x + 1)$

②  $(x + 1)^2(x - 1)$

③  $(x - 1)(x + 1)$

④  $(x - 1)^3$

⑤  $(x + 1)^3$

해설

$$x^3 - x^2 - x + 1 = x^2(x - 1) - (x - 1)$$

$$= (x - 1)(x^2 - 1)$$

$$= (x - 1)^2(x + 1)$$

$$\therefore f(x) = (x - 1)(x^2 - 1) = (x - 1)^2(x + 1)$$

해설

인수정리를 이용하여 인수분해할 수 있다.

$$f(1) = 0 ,$$

즉  $x - 1$  로 나누어 떨어지므로

조립제법을 써서 인수분해하면 된다.

2.  $x^4 - 6x^2 + 8$ 를 인수분해하면? (단, 유리수 범위에서 인수분해 하여라.)

①  $(x^2 - 2)(x^2 - 4)$

②  $(x^2 - 2)(x - 4)(x + 4)$

③  $(x^2 - 2)(x - 2)(x + 2)$

④  $(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x - 2)(x + 2)$

⑤  $(x^2 - \sqrt{2})(x - 2)(x + 2)$

해설

$$\begin{aligned}x^4 - 6x^2 + 8 &= (x^2)^2 - 6x^2 + 8 \\&= (x^2 - 2)(x^2 - 4) \\&= (x + 2)(x - 2)(x^2 - 2)\end{aligned}$$

해설

인수정리를 이용할 수 있다.

$$f(x) = x^4 - 6x^2 + 8$$

$$f(2) = 0, \quad f(-2) = 0,$$

즉,  $(x - 2)(x + 2)$ 로 나누어 떨어지므로  
조립제법을 써서 인수분해하면 된다.

3.  $\frac{1000^2}{252^2 - 248^2}$  은?

① 62500

② 1000

③ 500

④ 250

⑤  $\frac{1}{2}$

해설

$$\begin{aligned}\frac{1000^2}{252^2 - 248^2} &= \frac{1000 \cdot 1000}{(252 + 248)(252 - 248)} \\&= \frac{1000}{500} \cdot \frac{1000}{4} \\&= 500\end{aligned}$$

4.  $(x^2 + x)(x^2 + x + 1) - 6$  을 인수분해하면?

- ①  $(x - 1)(x + 2)(x^2 + x + 3)$       ②  $(x - 1)(x + 2)(x^2 + x - 3)$
- ③  $(x - 2)(x + 1)(x^2 + x + 3)$       ④  $(x - 1)(x + 2)(x^2 - x + 3)$
- ⑤  $(x + 1)(x - 2)(x^2 - x + 3)$

해설

$x^2 + x = X$  라 하자.

$$\begin{aligned}(\text{준식}) &= X(X + 1) - 6 \\&= X^2 + X - 6 \\&= (X + 3)(X - 2) \\&= (x^2 + x + 3)(x^2 + x - 2) \\&= (x - 1)(x + 2)(x^2 + x + 3)\end{aligned}$$

5.  $(x^4 - 8x^2 - 9) \div (x^2 - 9)$  를 계산하여라.

- ①  $x^2 + 1$       ②  $x^2 - 1$       ③  $x^2 + 2$   
④  $x^2 - 2$       ⑤  $x^2 + 3$

해설

$$x^4 - 8x^2 - 9 = (x^2 - 9)(x^2 + 1)$$

$$\therefore (\text{준식}) = x^2 + 1$$

6.  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$  을 인수분해 하면?

- ①  $(x + 1)(x - 2)(x + 3)$       ②  $(x - 1)(x + 2)(x + 3)$   
③  $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$       ④  $(x + 1)(x + 2)(x - 3)$   
⑤  $(x - 1)(x - 2)(x + 3)$

해설

인수정리를 이용하면

$f(1) = 0, f(2) = 0, f(3) = 0$  이므로

(준식)  $= (x - 1)(x - 2)(x - 3)$

7. 다음 세 다항식에서 최대공약수를 구하면?

$$2x^2 - 3x + 1, \quad 3x^2 - x - 2, \quad x^2 + 3x - 4$$

- ①  $x - 1$       ②  $2x - 1$       ③  $x - 2$   
④  $x + 3$       ⑤  $x + 1$

해설

$$2x^2 - 3x + 1 = (2x - 1)(x - 1)$$

$$3x^2 - x - 2 = (3x + 2)(x - 1)$$

$$x^2 + 3x - 4 = (x + 4)(x - 1)$$

따라서 최대 공약수는  $x - 1$ 이다.

8. 두 다항식  $x^3 - 3x^2 + 2x$ ,  $x^4 - 4x^3 + 4x^2$ 의 최대공약수와 최소공배수를 각각  $f(x)$ ,  $g(x)$  라 할 때,  $f(3) + g(3)$ 의 값을 구하면?

① 18

② 19

③ 20

④ 21

⑤ 22

해설

$$x^3 - 3x^2 + 2x = x(x-2)(x-1)$$

$$x^4 - 4x^3 + 4x^2 = x^2(x-2)^2$$

$$\therefore f(x) = x(x-2), g(x) = x^2(x-1)(x-2)^2$$

$$\therefore f(3) + g(3) = 3 + 18 = 21$$

9. 두 다항식  $x^2 - 4x + 3a + b$ 와  $x^2 + bx - 6$ 의 최대공약수가  $x - 2$ 일 때,  
 $a + b$ 의 값은?

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 8

해설

$$f(x) = x^2 - 4x + 3a + b,$$

$$g(x) = x^2 + bx - 6 \text{이라 하면}$$

$f(x)$ 와  $g(x)$ 는 모두  $x - 2$ 로 나누어떨어지므로

$$f(2) = g(2) = 0 \text{에서}$$

$$f(2) = 4 - 8 + 3a + b = 0, g(2) = 4 + 2b - 6 = 0$$

$$\therefore a = 1, b = 1 \therefore a + b = 2$$

10. 두 다항식  $x^2 + ax + b$ ,  $x^2 + 3bx + 2a$ 의 최대공약수가  $x - 1$  일 때,  
 $a + b$ 의 값을 구하면?

① 2

② 1

③ 0

④ -1

⑤ -2

해설

최대공약수가  $x - 1$  이므로

$x^2 + ax + b$  와  $x^2 + 3bx + 2a$  는

모두  $x - 1$  로 나누어 떨어져야 한다.

$$\therefore 1 + a + b = 0 \text{ 이고 } 1 + 3b + 2a = 0$$

따라서,  $a = -2$ ,  $b = 1$

$$\therefore a + b = -1$$

11. 100개의 다항식  $x^2 - x - 1, x^2 - x - 2, \dots, x^2 - x - 100$  중에서 계수가 정수인 일차식의 곱으로 인수분해되는 것은 모두 몇 개인가?

① 5 개

② 7 개

③ 9 개

④ 11 개

⑤ 13 개

해설

$x^2 - x - n = (x + a)(x - b)$  ( $a, b$  는 자연수) 라 하면

$b = a + 1, ab = n$  ( $1 \leq n \leq 100$ )

$a$	1 2 3 4 5 6 7 8 9
$b$	2 3 4 5 6 7 8 9 10
$n=ab$	2 6 12 20 30 42 56 72 90

$\therefore 9(\text{개})$

12. 가로의 길이가  $x$  cm, 세로의 길이가  $y$  cm, 높이가  $z$  cm 인 직육면체에서  $x + y + z = 10$ ,  $x^2 + y^2 + z^2 = 46$  일 때, 이 직육면체의 겉넓이는 몇  $\text{cm}^2$  인가?

①  $45 \text{ cm}^2$

②  $50 \text{ cm}^2$

③  $54 \text{ cm}^2$

④  $58 \text{ cm}^2$

⑤  $60 \text{ cm}^2$

해설

공식  $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$  을 이용하여 주어진 조건을 대입하면  $xy + yz + zx = 27$   
겉넓이는  $2(xy + yz + zx)$  이므로 54

13. 두 다항식  $x^2 + 3x + a$ ,  $x^2 - 3x + b$ 의 최대공약수가  $x - 1$ 일 때, 두 다항식의 최소공배수를  $f(x)$ 라 하자.  $f(0)$ 의 값을 구하면?

① 8

② 10

③ 12

④ 14

⑤ 16

해설

$x - 1$ 이 최대 공약수라면 두 식에

$x = 1$ 을 대입하면 0이 된다.

$A : x^2 + 3x + a$  에  $x = 1$ 을 대입하면

$$1 + 3 + a = 0 \therefore a = -4$$

$B : x^2 - 3x + b$  에  $x = 1$ 을 대입하면

$$1 - 3 + b = 0 \therefore b = 2$$

$$A : x^2 + 3x - 4 = (x - 1)(x + 4)$$

$$B : x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$$

최소공배수  $f(x) = (x - 1)(x + 4)(x - 2)$  가 된다.

$$f(0) = (-1) \cdot (4) \cdot (-2) = 8$$

14.  $x^2 + ax - 9$  와  $x^2 + bx + c$  의 합은  $2x^2 - 4x - 6$ , 최소공배수는  $x^3 - x^2 - 9x + 9$ 이다.  $a - b + c$ 의 값을 구하여라. (단,  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 는 상수이다.)

▶ 답:

▷ 정답: 7

해설

$$A = x^2 + ax - 9 = Gp$$

$$B = x^2 + bx + c = Gq \text{ 라 하면}$$

$$A + B = (p + q)G = 2x^2 - 4x - 6 = 2(x + 1)(x - 3)$$

$$L = pqG = x^3 - x^2 - 9x + 9 = x^2(x - 1) - 9(x - 1)$$

$$= (x - 1)(x^2 - 9) = (x - 1)(x + 3)(x - 3)$$

따라서,  $G = x - 3$ ,  $p = x + 3$ ,  $q = x - 1$ 이다.

$$\therefore A = (x + 3)(x - 3) = x^2 - 9$$

$$B = (x - 1)(x - 3) = x^2 - 4x + 3$$

$$\therefore a = 0, b = -4, c = 3$$

$$\therefore a - b + c = 7$$

15. 차수가 같은 두 다항식의 합이  $2x^2 - 8$ 이고, 최소공배수가  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 일 때, 두 다항식의 최대공약수는  $ax + b$ 이다. 이 때,  $a + b$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▶ 정답: 3

해설

두 식  $A, B$ 의 최대공약수를  $G$ 라 하면

$$A = Ga, B = Gb \quad (a, b \text{는 서로소})$$

$$A + B = (a + b)G = 2(x + 2)(x - 2)$$

$$L = abG = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$$

$$\therefore G = x + 2$$

16.  $x^4 - 11x^2 + 1$  Ⓛ  $(x^2 + ax + b)(x^2 + 3x + b)$ 로 인수분해될 때,  $a + b$ 의 값은?

- ① -1      ② -2      ③ -3      ④ -4      ⑤ -5

해설

$$\begin{aligned}x^4 - 11x^2 + 1 &= (x^2 - 1)^2 - 9x^2 \\&= (x^2 - 1)^2 - (3x)^2 \\&= (x^2 - 3x - 1)(x^2 + 3x - 1) \\&= (x^2 + ax + b)(x^2 + 3x + b)\end{aligned}$$

$$\therefore a = -3, b = -1$$

$$\therefore a + b = -4$$

17.  $2x^2 + xy - y^2 + 10x + 4y + 12$ 를  $x, y$ 의 두 일차식의 곱으로 인수분해하면,  $(x + ay + b)(2x + cy + d)$ 가 된다고 할 때,  $a + b + c + d$ 의 값은? (단,  $a, b, c, d$ 는 상수)

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

해설

$$2x^2 + xy - y^2 + 10x + 4y + 12 \quad (\leftarrow x에 관하여 정리)$$

$$= 2x^2 + (y + 10)x - (y^2 - 4y - 12)$$

$$= 2x^2 + (y + 10)x - (y + 2)(y - 6)$$

$$= \{x + (y + 2)\}\{2x - (y - 6)\}$$

$$= (x + y + 2)(2x - y + 6)$$

$$\therefore a = 1, b = 2, c = -1, d = 6$$

$$\therefore a + b + c + d = 8$$

18. 0이 아닌 세 수가 있다. 이들의 합은 0, 역수의 합은  $\frac{3}{2}$ , 제곱의 합은 1 일 때, 이들 세 수의 세제곱의 합을 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : -1

해설

세 수를  $x, y, z$  라 하면 주어진 조건으로부터

$$x + y + z = 0 \cdots \textcircled{\text{①}}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{3}{2} \cdots \textcircled{\text{②}}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \cdots \textcircled{\text{③}}$$

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx) \text{ } \circ\text{[므로}$$

$$\textcircled{\text{①}}, \textcircled{\text{③}} \text{에서 } 0^2 = 1 + 2(xy + yz + zx)$$

$$\therefore xy + yz + zx = -\frac{1}{2} \cdots \textcircled{\text{④}}$$

$$\textcircled{\text{②}} \text{에서 } \frac{xy + yz + zx}{xyz} = \frac{3}{2} \text{ } \circ\text{[므로}$$

$$3xyz = 2(xy + yz + zx)$$

$$\therefore xyz = -\frac{1}{3}$$


$$\text{또, } x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

$$= (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$$

$$\textcircled{\text{①}} \text{에서 } x + y + z = 0 \text{ } \circ\text{[므로}$$

$$x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz = 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = -1$$

19. 다음 그림과 같이 세 변의 길이가  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 인  $\triangle ABC$ 에서  $a^3 + b^3 + c^3 - ab(a+b) + bc(b+c) - ca(c+a) = 0$ 이 성립할 때,  $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?



- ①  $a = b$ 인 이등변삼각형
- ②  $a = c$ 인 이등변삼각형
- ③  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ④  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

### 해설

$$\begin{aligned}
 & a^3 + b^3 + c^3 - ab(a+b) + bc(b+c) - ca(c+a) \\
 &= a^3 + b^3 + c^3 - a^2b - ab^2 + b^2c + bc^2 - c^2a - ca^2 \\
 &= a^3 - (b+c)a^2 - (b^2 + c^2)a + b^3 + b^2c + bc^2 + c^3 \\
 &= a^3 - (b+c)a^2 - (b^2 + c^2)a + b^2(b+c) + c^2(b+c) \\
 &= a^3 - (b+c)a^2 - (b^2 + c^2)a + (b+c)(b^2 + c^2) \\
 &= a^3 - (b+c)a^2 - (b^2 + c^2)(a - b - c) \\
 &= (a - b - c)a^2 - (b^2 + c^2)(a - b - c) \\
 &= (a - b - c)(a^2 - b^2 - c^2) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

이 때,  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 는 삼각형의 세 변의 길이이므로  $a \neq b + c$

$$\therefore a^2 - b^2 - c^2 = 0,$$

$$\text{즉 } a^2 = b^2 + c^2$$

따라서,  $\triangle ABC$ 는  $a$ 를 빗변으로 하는 직각삼각형,

즉  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

20.  $a + b + c = 0$  일 때, 다음 중  $2a^2 + bc$  와 같은 것은?

- ①  $(a - c)^2$       ②  $(b + c)^2$       ③  $(a + b)(b + c)$   
④  $(a - b)(a - c)$       ⑤  $(a - b)(a + c)$

해설

$$\begin{aligned}2a^2 + bc &= 2a^2 - b(a + b) \quad (\because c = -a - b) \\&= 2a^2 - ab - b^2 \\&= (a - b)(2a + b) \\&= (a - b)(a + b + a) \\&= (a - b)(a - c) \quad (\because a + b = -c)\end{aligned}$$