

1. 어느 은행은 정기예금에 대해 1년 예치시 500만원은 5% 이자를 지급하고, 100만원은 4%의 이자를 지급한다. 오늘 이자 지급일이 되어 이자를 찾아간 손님은 모두 30명이고, 지급 액수는 414만원이었다. 이때, 500만원을 예치한 손님의 수는? (단, 손님들은 원금을 제외한 이자만 지급받았으며, 이 이자에 대한 세금은 생각하지 않는다.)

① 12명    ② 14명    ③ 16명    ④ 18명    ⑤ 19명

해설

500만원을 예치한 손님 수를  $x$ 명, 100만원을 예치한 손님 수를  $y$ 명이라고 하자.

(이자) = (원금) × (이자율) 이므로, 500만원을 예치한 손님  $x$ 명의 이자는  $5000000 \times 0.05 \times x = 250000x$ 이고, 100만원을 예치한 손님  $y$ 명의 이자는  $1000000 \times 0.04 \times y = 40000y$ 이다.

$$\begin{cases} x + y = 30 & \cdots \textcircled{\text{1}} \\ 250000x + 40000y = 4140000 & \cdots \textcircled{\text{2}} \end{cases} \quad \text{을 간단히 하면}$$

$$\begin{cases} x + y = 30 & \cdots \textcircled{\text{1}}' \\ 25x + 4y = 414 & \cdots \textcircled{\text{2}}' \end{cases}$$

$$\textcircled{\text{1}}' \times 4 - \textcircled{\text{2}}' \text{을 하면 } -21x = -294, x = 14 \cdots \textcircled{\text{3}}$$

∴ 500만원을 예치한 손님의 수는 14명이다.

2. 다음 표는 빵과 버터에 들어있는 단백질과 지방의 백분율(%)이다.  
단백질 82g, 지방 90g을 섭취하려면 빵과 버터를 각각 몇 g씩 먹으면  
되는지 차례대로 구하여라.

	단백질(%)	지방(%)
빵	8	1
버터	2	80

▶ 답: g

▶ 답: g

▷ 정답: 1000g

▷ 정답: 100g

해설


구하는 빵의 양을  $x$  g, 버터의 양을  $y$  g이라 하면

$$\frac{8}{100}x + \frac{2}{100}y = 82$$

$$\frac{1}{100}x + \frac{80}{100}y = 90$$

두 방정식을 연립하면  $x = 1000$ ,  $y = 100$  이다.

3. 다음 그림의  $y = 2x$ ,  $y = -x + 6$  의 교점을 A 라 하고,  $\square PQRS$  는 정사각형이다. 점 P 의 x 좌표가  $a$  일 때, 점 A 를 지나면서 정사각형 PQRS 의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 구하면?



- ①  $y = 7x + 18$       ②  $y = 7x - 18$       ③  $y = -7x + 18$   
 ④  $y = -7x - 18$       ⑤  $y = 7x + 8$

해설

$P(a, 2a)$ ,  $Q(a, 0)$ ,  $R(3a, 0)$ ,  $S(3a, 2a)$

$S \not\in y = -x + 6$  위의 점이므로


$$2a = -3a + 6 \quad \therefore a = \frac{6}{5}$$

정사각형 PQRS 의 넓이를 이등분하는 직선은 P, R 의 중점  $(2a, a)$  를 지나므로

$$A(2, 4) \text{ 와 } \left(\frac{12}{5}, \frac{6}{5}\right) \text{ 을 지나는 직선의 방정식은 } y = -7x + 18$$

4. 다음 그림과 같이 일차방정식  $3x-y+12=0$  과  $x$  축,  $y$  축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 직선  $y=mx$ 에 의하여 이등분된다고 한다. 이 때,  $m$ 의 값은?

- ① -1      ② 0      ③ 1  
 ④ -3      ⑤ 3



**해설**

$$\begin{aligned}\text{오른쪽 그림에서 } \triangle OAB &= \frac{1}{2} \cdot \overline{OA} \cdot \overline{OB} \\ &= \frac{1}{2} \times 4 \times 12 \\ &= 24 \\ \therefore \triangle OAC &= \frac{1}{2} \cdot \overline{OA} \cdot y \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4 \times y \\ &= 12\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}y &= 6 \quad \text{으로 } x = -2 \\ y &= mx \quad \text{가 } (-2, 6) \text{ 을 지나므로 } 6 = -2m \\ \therefore m &= -3\end{aligned}$$