

1. 다음 방정식의 모든 근의 합을 구하여라.

$$x^3 - 13x + 12 = 0$$

▶ 답:

▷ 정답: 0

해설

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 0 & -13 & 12 \\ & & 1 & 1 & -12 \\ \hline & 1 & 1 & -12 & 0 \end{array}$$

$f(x) = x^3 - 13x + 12$ 라고 하면 $f(1) = 0$ |므로

$$(x-1)(x^2 + x - 12) = 0$$

$$(x-1)(x+4)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = -4 \text{ 또는 } x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

$$\therefore -4 + 1 + 3 = 0$$

2. 다음 식을 간단히 하면?

$$\begin{aligned} & \frac{a^2}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2}{(b-c)(b-a)} \\ & + \frac{c^2}{(c-a)(c-b)} \quad (\text{단. } a \neq b \neq c) \end{aligned}$$

- ① -1 ② 1 ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 5

해설

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \frac{a^2(c-b) + b^2(a-c) + c^2(b-a)}{(a-b)(b-c)(c-a)} \\ &= \frac{(c-b)a^2 - (c^2 - b^2)a + bc(c-b)}{(a-b)(b-c)(c-a)} \\ &= \frac{(c-b)(a-b)(a-c)}{(a-b)(b-c)(c-a)} = 1 \end{aligned}$$

3. 삼차방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근을 w 라 할 때, $-\frac{w+1}{w^2} + \frac{1+w^2}{w}$ 의 값을 구하면?

- Ⓐ 0 Ⓑ 1 Ⓒ -1 Ⓓ 2 Ⓔ -2

해설

$$\begin{aligned}x^3 &= 1, \\x^3 - 1 &= (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0 \\w &\text{는 } x^2 + x + 1 = 0 \text{의 한 근이 된다.} \\&\Rightarrow w^3 = 1, \quad w^2 + w + 1 = 0 \\-\frac{w+1}{w^2} + \frac{1+w^2}{w} &= \frac{\omega^2}{\omega^2} + -\frac{\omega}{\omega} \\&= 1 - 1 = 0\end{aligned}$$

4. x 보다 작거나 같은 정수 중에서 최대의 정수를 $[x]$, x 보다 크거나 같은 정수 중에서 최소의 정수를 (x) 로 나타낼 때, 방정식 $[x] + (x) = 7$ 을 만족하는 x 의 값을 모두 구하면?

- ① $\frac{7}{2}$ ② $3 \leq x \leq 4$ ③ $3 \leq x < 4$
④ $3 < x \leq 4$ ⑤ $3 < x < 4$

해설

$$[x] = \begin{cases} k & (x \geq \text{정수 } k \text{ 일 때}) \\ k & (k < x < k+1 \text{ 일 때}) \end{cases}$$
$$(x) = \begin{cases} k & (x \geq \text{정수 } k \text{ 일 때}) \\ k+1 & (k < x < k+1 \text{ 일 때}) \end{cases}$$

따라서, $[x] + (x) = 7$ 이고

$[x], (x)$ 는 정수이므로

$[x] = 3, (x) = 4$ ($\because [x] \leq (x)$)

$\therefore 3 < x < 4$

5. 점 $(1, -1)$ 에서 직선 $ax + by = 0$ ($a \neq 0, b \neq 0$) 까지의 거리가 $\sqrt{2}$ 일 때, 상수 a, b 의 관계를 바르게 설명한 것은?

① $a - b = 0$ ② $a - b = \sqrt{2}$ ③ $a + b = 0$
④ $ab = 0$ ⑤ $ab = \sqrt{2}$

해설

$$\frac{|a \times 1 + b \times (-1)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|a - b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sqrt{2}$$

$$|a - b| = \sqrt{2} \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } a^2 - 2ab + b^2 = 2a^2 + 2b^2$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = 0, (a + b)^2 = 0$$

$$\text{따라서 } a + b = 0$$