

1. $4\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) = Ax - 3$ 의 근이 $x = \frac{2 \pm \sqrt{B}}{2}$ 일 때, $\frac{A}{B}$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 4

해설

$$4\left(x^2 - \frac{1}{4}\right) = Ax - 3$$

$$4x^2 - 1 = Ax - 3$$

$$4x^2 - Ax + 2 = 0$$

두 근의 합이 2 이므로 $\frac{A}{4} = 2$

$$\therefore A = 8$$

두 근의 곱이 $\frac{4-B}{4} = \frac{2}{4}$ 이므로 $B = 2$

$$\therefore \frac{A}{B} = \frac{8}{2} = 4$$

2. 이차방정식 $4x - \frac{x^2 + 1}{4} = 3(x - a)$ 의 근이 $x = b \pm \sqrt{15}$ 일 때, $\frac{1}{2}ab$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

해설

$$\text{양변에 } 4 \text{ 를 곱하면 } 16x - (x^2 + 1) = 12(x - a)$$

$$x^2 - 4x + (1 - 12a) = 0$$

$$\text{근이 } x = b \pm \sqrt{15} \text{ 이므로}$$

$$\text{두 근의 합은 } 2b = 4 \quad \therefore b = 2$$

$$\text{두 근의 곱은 } b^2 - 15 = 1 - 12a \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore \frac{1}{2}ab = 1$$

3. 이차방정식 $x^2 - 4x + m - 3 = 0$ 이 근을 갖지 않을 때, m 의 값의 범위는?

- ① $m > 7$ ② $m < 7$ ③ $m \geq 7$
④ $m < -7$ ⑤ $m > -7$

해설

$$D = 4^2 - 4 \times 1 \times (m - 3) < 0, \quad m > 7$$

4. 이차방정식 $x^2 + 3x - a + 2 = 0$ 이 서로 다른 두 근을 가질 때, a 의 값의 범위를 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : $a > -\frac{1}{4}$

해설

$$D = 9 - 4(-a + 2) > 0$$

$$9 + 4a - 8 > 0, \quad 4a > -1$$

$$\therefore a > -\frac{1}{4}$$