

1. 함수 $f(x)$ 가 임의의 x, y 에 대하여 $f(x+y) + f(y-x) - 2f(y) = 2x^2$, $f(x) = f(-x)$ 를 만족시킬 때, $f(1) \cdot f(2)$ 의 값은? (단, $f(0) = 1$)

① 1

② 4

③ 8

④ 10

⑤ 12

해설

임의의 x, y 에 대하여 $f(x+y) + f(y-x) - 2f(y) = 2x^2$,
 $f(x) = f(-x)$ 일 때

i) $x = 1, y = 0$ 을 대입

$$f(1+0) + f(0-1) - 2f(0) = 2 \times 1 \quad (\because f(0) = 1)$$

$$f(1) + f(-1) - 2 \times 1 = 2 \times 1$$

$$2f(1) = 4 \quad (\because f(1) = f(-1)) \rightarrow f(1) = 2$$

ii) $x = 1, y = 1$ 을 대입

$$f(1+1) + f(1-1) - 2f(1) = 2 \times 1$$

$$f(2) + f(0) - 2 \times 2 = 2$$

$$f(2) + 1 - 4 = 2 \rightarrow f(2) = 5$$

$$\therefore f(1) \cdot f(2) = 2 \times 5 = 10$$

2. 정의역과 공역이 모두 자연수의 집합인 함수 $f(n)$ 이 있다. $f(n+2) = f(n+1) + f(n)$ 이고, $f(7) = 21$ 일 때, $f(9)$ 의 값을 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : 55

해설

$$f(1) = a, f(2) = b \text{ 라고 하면 } f(3) = a + b$$

$$f(4) = a + 2b$$

$$f(5) = 2a + 3b$$

$$f(6) = 3a + 5b$$

$$f(7) = 5a + 8b = 21 \text{ 을 만족하는 자연수는}$$

$$\therefore a = 1, b = 2$$

$$f(8) = 8a + 13b$$

$$f(9) = 13a + 21b = 13 + 42 = 55$$

3. 함수 $f(x) = |x - 1|$ 에 대하여 $(f \circ f)(x) = \frac{1}{2}$ 의 실근의 개수를 구하면?

① 0 개

② 1 개

③ 2 개


④ 3 개

⑤ 4 개

해설

$(f \circ f)(x) = |f(x) - 1|$ 이므로

$y = |f(x) - 1|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $y = |f(x) - 1|$ 의 그래프와

직선 $y = \frac{1}{2}$ 이 4 개의 점에서

만나므로 주어진 방정식의 실근의 개수는 4 개이다.

4. 실수 전체의 집합을 R , 유리수 전체의 집합을 Q 라 할 때, R 에서 R 로의 함수 f 가 다음과 같이 정의되어 있다.

$$f(x) \begin{cases} \sqrt{2} & (x \in Q \text{ 일 때}) \\ 1 & (x \notin Q \text{ 일 때}) \end{cases} \quad \text{함수 } f \text{ 에 대한 다음 <보기> 의 설명 중}$$

옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

㉠ $x \in Q$ 일 때, $(f \circ f)(x) = 1$

㉡ $x \in R$ 일 때, $f(x + f(x)) = 1$

㉢ $x_1, x_2 \in R$ 이고, $f(x_1) = f(x_2) = 1$ 이면
 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = 1$

① ㉠

② ㉡

③ ㉢

④ ㉠, ㉡

⑤ ㉡, ㉢

해설

㉠ $x \in Q$ 이면 $f(x) = \sqrt{2} \notin Q$

$\therefore (f \circ f)(x) = f(f(x)) = 1$

㉡ i) $x \in Q$ 이면 $x + f(x) = x + \sqrt{2} \notin Q$

$\therefore f(x + f(x)) = 1$

ii) $x \notin Q$ 이면 $x + f(x) = x + 1 \notin Q$

$\therefore f(x + f(x)) = 1$

따라서, $x \in R$ 이면 $f(x + f(x)) = 1$

㉢ $f(x_1) = f(x_2) = 1$ 이므로 $x_1 \notin Q$, $x_2 \notin Q$

그런데 $x_1 = 1 + \sqrt{2}$, $x_2 = 1 - \sqrt{2}$ 인 경우에는

$f(x_1) = f(x_2) = 1$ 이지만

$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = f(1) = \sqrt{2}$

따라서 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$ 가 반드시 1이라고 할 수는 없다.

5. 집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수 $f : A \rightarrow A$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \geq 2) \\ 4 & (x = 1) \end{cases} \quad \text{로 정의한다.}$$

이때, $f^{100}(1) - f^{100}(4)$ 의 값을 구하여라.

(단, $f^{n+1} = f \cdot f^n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$))

▶ 답 :

▷ 정답 : -3

해설

주어진 함수는 2 이상의 숫자는 1을 빼주고,

1은 4로 대응시킴을 의미한다.


다음 그림처럼 f 를 계속 합성하면

4번째에는 모든 원소가 자기자신으로 대응한다.



$$\therefore f^4(x) = x$$

$$\therefore f^{100}(x) = f^{96}(x) = f^{92}(x) = \dots = f^4(x) = x$$


$$\therefore f^{100}(1) - f^{100}(4) = 1 - 4 = -3$$




6. 실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수 f, g 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 의 그래프는?




①




②




③




④



⑤




해설



$$g(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases} \quad \text{이므로}$$

$$(g \circ f)(x) = \begin{cases} 1 & (-1 \leq x \leq 1, 2 \leq x) \\ -1 & (x < -1, 1 < x < 2) \end{cases}$$



7. 함수 $f(x) = 2x + 1$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 함수 $f(3x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 를 이용하여 나타낸 것은?

① $\frac{1}{2}g(x) - \frac{1}{2}$

② $\frac{1}{6}g(x) - \frac{1}{6}$

③ $2g(x) - 1$

④ $\frac{1}{3}g(x)$

⑤ $\frac{1}{2}g(x)$

해설

$f(x) = 2x + 1$ 에서 $y = 2x + 1$ 이라 놓고

x 에 대하여 정리하면 $x = \frac{y-1}{2}$

x 와 y 를 바꾸어 쓰면 $y = \frac{x-1}{2}$

$$\therefore f^{-1}(x) = g(x) = \frac{x-1}{2}$$

$f(3x) = 6x + 1$ 에서 $y = 6x + 1$ 이라 놓고

x 에 대하여 정리하면 $x = \frac{y-1}{6}$

x 와 y 를 바꾸어 쓰면 $y = \frac{x-1}{6}$

$$\therefore f^{-1}(3x) = g(3x) = \frac{x-1}{6}$$

$$\therefore g(3x) = \frac{1}{3} \times \frac{x-1}{2} = \frac{1}{3} \cdot g(x)$$

8. 정의역이 $\{x \mid x > 0\}$ 인 두 함수 $f(x) = x^2 - 2x$, $g(x) = \sqrt{x}$ 가 있다.
 $(f \circ g^{-1})(a) = -1$ 일 때, $(g \circ f)(4a)$ 의 값은 ?

① $\sqrt{2}$

② 2

③ $2\sqrt{2}$

④ 4

⑤ $3\sqrt{2}$

해설

$$g(x) = \sqrt{x} = y \text{ 의 역함수는 } x = \sqrt{y}$$

$$\therefore g^{-1}(x) = x^2 \ (x > 0)$$

$$\begin{aligned} (f \circ g^{-1})(a) &= f(a^2) \\ &= a^4 - 2a^2 = -1 \end{aligned}$$

$$(a^2 - 1)^2 = 0$$

$$\therefore a = 1 \leftarrow \text{정의역이 } \{x \mid x > 0\}$$

$$(g \circ f)(4a) = g(f(4)) = g(8) = 2\sqrt{2}$$

해설

$$(f \circ g^{-1})(a) = -1 \text{ 에서 } g^{-1}(a) = k \text{ 라 하면}$$

$$f(k) = k^2 - 2k = -1, (k-1)^2 = 0, k = 1 \text{ 이므로}$$

$$g^{-1}(a) = 1 \Leftrightarrow g(1) = a$$

$$g(1) = \sqrt{1} = a$$

$$\begin{aligned} \therefore (g \circ f)(4a) &= g(f(4a)) = g(f(4)) \\ &= g(4^2 - 2 \times 4) = g(8) = \sqrt{8} \end{aligned}$$

9. 수직선 위에 네 점 A(-2), B(0), C(1) 이 있다. 이 수직선 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC}$ 의 최솟값을 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : 3

해설

점 P 의 좌표를 $P(x)$ 라고 하면

$$\overline{PA} = |x + 2|, \overline{PB} = |x|, \overline{PC} = |x - 1|,$$


$$\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} = |x + 2| + |x| + |x - 1| \text{ 이므로}$$

$y = |x + 2| + |x| + |x - 1|$ 로 놓고

$x = -2, 0, 1$ 을 경계로 하여 구간을 나누면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$y = \begin{cases} -3x - 1 & (x < -2 \text{ 일 때}) \\ -x + 3 & (-2 \leq x < 0 \text{ 일 때}) \\ x + 3 & (0 \leq x < 1 \text{ 일 때}) \\ 3x + 1 & (x \geq 1 \text{ 일 때}) \end{cases}$$

따라서, $y = |x + 2| + |x| + |x - 1|$ 의 그래프가 다음 그림과 같으므로 구하는 최솟값은 3 이다.



10. $\frac{x+3}{x+2} - \frac{x+4}{x+3} - \frac{x+5}{x+4} + \frac{x+6}{x+5}$ 를 간단히 하면?

① $\frac{2(2x-1)}{(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)}$

② $\frac{2(2x+1)}{(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)}$

③ $\frac{2(2x+3)}{(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)}$

④ $\frac{2(x+5)}{(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)}$

⑤ $\frac{2(2x+7)}{(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)}$

해설

$$\begin{aligned}
 (\text{준 식}) &= \left(1 + \frac{1}{x+2}\right) - \left(1 + \frac{1}{x+3}\right) \\
 &\quad - \left(1 + \frac{1}{x+4}\right) + \left(1 + \frac{1}{x+5}\right) \\
 &= \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+4} + \frac{1}{x+5} \\
 &= \frac{2x+7}{(x+2)(x+5)} - \frac{2x+7}{(x+3)(x+4)} \\
 &= \frac{(2x+7)(x^2+7x+12-x^2-7x-10)}{(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)} \\
 &= \frac{2(2x+7)}{(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)}
 \end{aligned}$$

11. $\frac{x+y}{x} = \frac{y+z}{y} = \frac{z+x}{z} = k$ 일 때, $k^{2008} + \frac{1}{k^{2008}}$ 의 값을 구하면? (단, $xyz \neq 0, x \neq y \neq z$)

① -3

② -2

③ -1

④ 1

⑤ 5

해설

$$x+y=kx \cdots \textcircled{1}, y+x=kz \cdots \textcircled{2}, z+x=ky \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} \text{ 하면 } 2(x+y+z) = k(x+y+z)$$

$$\text{i) } x+y+z \neq 0 \text{ 이면 } k=2$$

$$\textcircled{1} \text{ 에 대입하면 } x+y=2x, x=y \text{ 이 되므로}$$

$$x \neq y \neq z \text{ 인 조건에 모순}$$

$$\therefore x+y+z=0$$

$$\text{ii) } x+y+z=0 \text{ 이면}$$

$$x+y=-z, y+z=-x, z+x=-y$$

$$-\frac{z}{x}=k, -\frac{x}{y}=k, -\frac{y}{z}=k$$

$$\text{세 식을 변변 곱하면 } k^3 = -1, (k+1)(k^2-k+1) = 0$$

$$k = -1 \text{ 이면 } x=z \text{ 가 되므로 조건에 모순}$$

$$\therefore k^2 - k + 1 = 0$$

$$\begin{cases} k^3 = -1 \\ k + \frac{1}{k} = 1 \end{cases}$$

$$k^{2008} + \frac{1}{k^{2008}} = (k^3)^{669} \times k + \frac{1}{(k^3)^{669} \times k}$$

$$= -(k + \frac{1}{k}) = -1$$

해설

$$\text{i) } 1 + \frac{y}{x} = 1 + \frac{z}{y} = 1 + \frac{x}{z} = k \text{ 에서}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{z}{y} = \frac{x}{z} = k-1$$

$$\therefore x = (k-1)z, y = (k-1)x, z = (k-1)y$$

$$xyz = (k-1)^3 xyz$$

$$xyz \neq 0 \text{ 이므로 } (k-1)^3 = 1, (k-1)^3 - 1 = 0,$$

$$\{(k-1)-1\} \{(k-1)^2 + (k-1) + 1\} = 0$$

$$\therefore (k-2)(k^2-k+1) = 0$$

$$x \neq y \neq z \text{ 이므로 } k \neq 2$$

$$\therefore k^2 - k + 1 = 0, k^3 = -1$$

$$k + \frac{1}{k} = 1$$

$$\text{ii) } k^{2008} + \frac{1}{k^{2008}}$$

$$= (k^3)^{669} \cdot k + \frac{1}{(k^3)^{669} \cdot k}$$

$$= -(k + \frac{1}{k}) = -1$$

12. 비례식 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} (\neq 1)$ 가 성립할 때, 다음 등식 중 성립하는 것의 개수를 구하면? (단, $mb + nd \neq 0, b + d + f \neq 0$)

$$\begin{aligned} \text{㉠} \quad & \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d} \\ \text{㉡} \quad & \frac{2a+3b}{a-b} = \frac{2c+3d}{c-d} \\ \text{㉢} \quad & \frac{a}{b} = \frac{ma+nc}{mb+nd} \\ \text{㉣} \quad & \frac{ab+cd}{a^3+\frac{c}{d}} = \frac{a^2+c^2}{e^3-c^2} \\ \text{㉤} \quad & \frac{a^3}{b^2} + \frac{c^3}{d^2} + \frac{e^3}{f^2} = \frac{(a+c+e)^3}{(b+d+f)^2} \end{aligned}$$

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

해설

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k \text{로 놓으면}$$

$$a = bk, c = dk, e = fk$$

$$\text{㉠ (좌변)} = \frac{bk+b}{bk-b} = \frac{k+1}{k-1}$$

$$\text{(우변)} = \frac{dk+d}{dk-d} = \frac{k+1}{k-1}$$

$$\therefore \text{(좌변)} = \text{(우변)}$$

$$\text{㉡ (좌변)} = \frac{2bk+3b}{bk-b} = \frac{2k+3}{k-1}$$

$$\text{(우변)} = \frac{2dk+3d}{dk-d} = \frac{2k+3}{k-1}$$

$$\therefore \text{(좌변)} = \text{(우변)}$$

$$\text{㉢ (좌변)} = \frac{bk}{b} = k$$

$$\text{(우변)} = \frac{mbk+ndk}{mb+nd} = k$$

$$\therefore \text{(좌변)} = \text{(우변)}$$

$$\text{㉣ (좌변)} = \frac{bk \cdot b + dk \cdot d}{bk \cdot b - dk \cdot d} = \frac{b^2 + d^2}{b^2 - d^2}$$

$$\text{(우변)} = \frac{b^2k^2 + d^2k^2}{b^2k^2 - d^2k^2} = \frac{b^2 + d^2}{b^2 - d^2}$$

$$\therefore \text{(좌변)} = \text{(우변)}$$

$$\text{㉤ (좌변)} = \frac{b^3k^3}{b^2} + \frac{d^3k^3}{d^2} + \frac{f^3k^3}{f^2} = (b+d+f)k^3$$

$$\text{(우변)} = \frac{(bk+dk+fk)^3}{(b+d+f)^2} = (b+d+f)k^3$$

$$\therefore \text{(좌변)} = \text{(우변)}$$

따라서, ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤ 모두 성립한다.

13. a 가 실수일 때, $f(a) = \sqrt{(a + \sqrt{a^2})^2} - \sqrt{(a - \sqrt{a^2})^2}$ 을 간단히 하면?

① a

② $2a$

③ $-a$

④ $-2a$

⑤ 0

해설

$\sqrt{a^2} = |a|$ 이므로 $f(a) = |a + |a|| - |a - |a||$

$a \geq 0$ 인 경우와 $a < 0$ 인 경우로 나누어 생각하면

(i) $a \geq 0$ 일 때,

$$f(a) = |a + a| - |a - a| = |2a| = 2a$$

(ii) $a < 0$ 일 때,

$$f(a) = |a - a| - |a - (-a)| = -|2a| = -2a$$

따라서 모든 실수 a 에 대하여 $f(a) = 2a$

14. 양수 x 의 소수 부분을 y 라 하면 $x^2 + y^2 = 27$ 이 성립한다. 이때, $y - \frac{1}{y}$ 의 값은?

① -5

② -3

③ -1

④ 2

⑤ 3

해설

$$0 \leq y < 1 \text{ 이므로 } 0 \leq y^2 < 1$$

$$0 \leq 27 - x^2 < 1, \quad 26 < x^2 \leq 27$$

$$\therefore \sqrt{26} < x \leq \sqrt{27} \text{ 에서 } x = 5. \times \times \times$$

$$\text{따라서, } x = 5 + y \text{ 이므로 } (5 + y)^2 + y^2 = 27$$

$$\therefore y^2 + 5y - 1 = 0 \text{ 양변을 } y \text{ 로 나누면}$$

$$y + 5 - \frac{1}{y} = 0$$

$$\therefore y - \frac{1}{y} = -5$$

15. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 8$ 일 때, $x^2 + \sqrt{6}x$ 의 값은? (단, $0 < x < 1$)

▶ 답 :

▷ 정답 : 1

해설

$x^2 + \frac{1}{x^2} = 8$ 의 양변에 x^2 을 곱하고 정리하면

$$(x^2)^2 - 8x^2 + 1 = 0$$

근의 공식으로 풀면

$$x^2 = 4 - \sqrt{15} \quad (\because 0 < x < 1) \cdots \textcircled{1}$$

$$x = \sqrt{4 - \sqrt{15}} \quad (\because 0 < x)$$

$$= \sqrt{\frac{8 - 2\sqrt{15}}{2}} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에 따라

$$x^2 + \sqrt{6}x$$

$$= (4 - \sqrt{15}) + \sqrt{6} \times \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

$$= 4 - \sqrt{15} + \sqrt{15} - 3 = 1$$

16. 두 집합 $A = \{(x, y) \mid y = \sqrt{4-x}\}$, $B = \{(x, y) \mid y = mx + 1, m \text{은 실수}\}$ 에 대하여 $n(A \cap B) = 2$ 일 때, m 의 값의 범위를 구하면?

① $-\frac{1}{2} \leq m < 0$

② $-\frac{1}{3} \leq m < 0$

③ $-\frac{1}{4} \leq m < 0$

④ $-\frac{1}{5} \leq m < 0$

⑤ $-\frac{1}{6} \leq m < 0$


해설

$y = \sqrt{4-x}$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

직선 $y = mx + 1$ 은 점 $(0, 1)$ 을 지나고
교점이 두 개이기 위해서는 $m < 0$ 이고
직선이 점 $(4, 0)$ 을 지날 때가 최소이므로


$$m = -\frac{1}{4}$$

$$\therefore -\frac{1}{4} \leq m < 0$$




17. 함수 $y = \sqrt{1 + |2x - x^2|}$ 의 그래프는 ?


①




②




③



④



⑤



해설

(i) $2x - x^2 \geq 0$

즉, $x^2 - 2x \leq 0$ 일 때,

$0 \leq x \leq 2$

이 때, $y = \sqrt{1 + 2x - x^2}$ 의 양변을 제곱하면,

$y^2 = 1 + 2x - x^2 \quad (y \geq 0)$

$(x - 1)^2 + y^2 = 2 \quad (y \geq 0) \dots\dots\dots \textcircled{\Gamma}$

(ii) $2x - x^2 < 0$ 즉, $x^2 - 2x > 0$ 일 때,

$x < 0$ 또는 $x > 2$

이 때,

$y = \sqrt{1 - 2x + x^2}$

$= \sqrt{(x - 1)^2}$

$= |x - 1| \dots\dots\dots \textcircled{\Delta}$

(i), (ii)에서 구하는 그래프는 다음 그림과 같다.

