1. $ax^2 - 2ax + 3 < 0$를 만족하는 x가 없도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a > 0$　② $-1 < a < 3$　③ $0 \le a \le 3$

④ $-1 < a < 4$　⑤ $-1 \le a \le 4$

해설

(i) $a = 0$일 때, 성립한다.

(ii) $a \neq 0$일 때, 함수 $y = ax^2 - 2ax + 3$에서 $D \le 0$이므로

$a^2 - 3a \le 0$

$\therefore 0 < a \le 3 (\because a \neq 0)$

2. x에 관한 이차부등식 $ax^2 - 2ax - 3a \geq bx^2 - 2bx - 3b$에 대하여 다음 중 옳은 것은?

① $a < b$일 때, $-1 \leq x \leq 3$이다.

② $a < b$일 때, $x \leq -1,\ x \leq 3$이다.

③ $a < 0$일 때, $-1 \leq x \leq 3$이다.

④ $b < 0$일 때, $x \leq -1,\ x \geq 3$이다.

⑤ $a \geq b$ 일 때, 부등식은 모든 실수 x에 대하여 성립한다.

해설

$ax^2 - 2ax - 3a \geq bx^2 - 2bx - 3b$을 이항하여 정리하면

$(a-b)x^2 - 2(a-b)x - 3(a-b) \geq 0$(이차부등식이므로 $a \neq b$)

i) $a < b$이면 $x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1) \leq 0$

$\therefore -1 \leq x \leq 3$

ii) $a > b$이면

$x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1) \geq 0$

$\therefore x \leq -1,\ x \geq 3$

3. 부등식 $3[x]^2 + [x] - 10 \le 0$의 해는? (단, $[x]$는 x를 넘지 않는 최대의 정수)

① $-3 \le x < 1$　② $-3 \le x < 2$　③ $-2 \le x < 1$

④ $-2 \le x < 2$　⑤ $-2 \le x < 3$

해설

$3[x]^2 + [x] - 10 \le 0$이므로

$([x] + 2)(3[x] - 5) \le 0$

$-2 \le [x] \le \frac{5}{3}$

$[x]$는 정수이므로

$-2 \le [x] \le 1$

$\therefore -2 \le x < 2$

4. 모든 실수 x에 대해 이차부등식 $x^2 - x(kx-3) + 3 > 0$이 항상 성립하기 위한 정수 k의 최댓값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 0

해설

주어진 부등식을 정리하면

$(1-k)x^2 + 3x + 3 > 0$

$D = 3^2 - 4 \times (1-k) \times 3 < 0$

$\therefore k < \dfrac{3}{12} = 0.25$

최대 정수 $k = 0$

5. x에 관한 이차부등식 $x^2+ax+2a-3>0$이 모든 실수 x에 대하여 성립하도록 상수 a의 범위를 구하면 $p<a<q$이다. 이 때, pq의 값을 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : $pq=12$

해설

$x^2+ax+2a-3>0$이 항상 성립할 조건은
판별식 이 $D<0$을 만족해야 한다.
$D=a^2-4(2a-3)<0$
$a^2-8a+12<0$
$(a-6)(a-2)<0$
$2<a<6 \quad \therefore p=2, q=6$
$\therefore \ pq=2\times 6=12$

6. 모든 실수 x에 대하여 부등식$(k-2)x^2+2(k-2)x+1>0$이 성립할 때, 실수 k값의 범위가 $m \le k < n$이다. $m+n$의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: $m+n=5$

해설

① $k=2$일 때 $1>0$ $\therefore$성립한다.

②  아래로 볼록 $(k-2)>0$, $k>2$

③ $\frac{D}{4}<0$에서 $(k-2)^2-(k-2)<0$

$(k-2)(k-3)<0$, $2<k<3$

①을 만족하거나 ②와 ③)을 동시에 만족해야 하므로 $2 \le k < 3$

$\therefore m=2, n=3$, $m+n=5$

7. 부등식 $ax^2 + 5x + b > 0$ 을 풀어서 $2 < x < 3$ 이라는 해가 구해졌다. 이 때, ab 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: $ab = 6$

해설

$ax^2 + 5x + b > 0$ ·····㉠
해가 $2 < x < 3$ 이 되는 이차부등식은
$(x-2)(x-3) < 0$ 전개하면
$x^2 - 5x + 6 < 0$ ·····㉡
㉠과 일차항의 계수를 맞추기위해
양변에 -1 을 곱하면
$-x^2 + 5x - 6 > 0$ ·····㉢
㉠, ㉢이 일치해야 하므로 $a = -1$, $b = -6$

8. x 에 대한 이차부등식 $x^2+ax+b>0$ 의 해가 $x<1$ 또는 $x>4$ 일 때 상수 $a+b$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -1

해설

$x^2+ax+b>0$ 의 해가 $x<1$ 또는 $x>4$ 이려면
$(x-1)(x-4)>0$ 에서 $x^2-5x+4>0$ 이므로
$a=-5$, $b=4$ 따라서 $a+b=-1$

9. x 에 대한 이차부등식 $ax^2+5x+b<0$ 의 해가 $x<2$ 또는 $x>3$ 일 때 상수 $a+b$ 의 값은?

① -7 ② -3 ③ 3 ④ 7 ⑤ 10

해설

해가 $x<2$ 또는 $x>3$ 이므로 $a<0$
해가 $x<2$ 또는 $x>3$ 이고 이차항의 계수가 1인 부등식은
$(x-2)(x-3)>0,\ x^2-5x+6>0$
양변에 -1을 곱하면
$-x^2+5x-6<0$
$\therefore a=-1,\ b=-6$
$a+b=-7$

10. 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근의 합이 10일 때, 방정식 $f(4x-3)=0$의 두 근의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

해설

$f(x)=0$의 두 근을 α, β 라 하면 $\alpha+\beta=10$
$f(x)=a(x-\alpha)(x-\beta)=0$로 놓으면
$f(4x-3)=a(4x-3-\alpha)(4x-3-\beta)=0$
$x=\dfrac{3+\alpha}{4}$, $\dfrac{3+\beta}{4}$
$\therefore$두 근의 합은 $\dfrac{6+\alpha+\beta}{4}=4$

11. 두 함수 $f(x) = mx^2 - 4x + 4$, $g(x) = -2x^2 + 2mx$ 가 있다. 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) < y < f(x)$ 를 만족시키는 실수 y 가 존재할 때, 실수 m 의 범위를 정하면?

① $-3 < m < 0$ ② $-2 < m \le 3$ ③ $0 \le m < 2$

④ $-2 \le m < 2$ ⑤ $-2 < m \le 4$

해설

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) - g(x) > 0$ 을
만족시키는 조건을 구한다.
$f(x) - g(x) = (m+2)x^2 - 2(m+2)x + 4 > 0$
(i) $m + 2 = 0$ 이면 $f(x) - g(x) = 4 > 0$
따라서 $m = -2$ 일 때, 성립한다.
(ii) $m + 2 > 0$, $\frac{D}{4} < 0$ 에서
$-2 < m < 2$
(i), (ii) 에서 $-2 \le m < 2$

12. 부등식 $|x^2-1|+3x<3$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, 상수 $\alpha+\beta$의 합을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -3

해설

절댓값 기호 안을 0으로 하는 x의 값을 경계로 하여 구간을 나누어 본다.

(ⅰ) $x^2-1\geq 0$,

즉 $x\leq -1$ 또는 $x\geq 1$일 때,

$|x^2-1|=x^2-1$이므로 주어진 부등식은

$x^2-1+3x<3,\ x^2+3x-4<0$

$(x+4)(x-1)<0$

$\therefore -4<x<1$

이 때 조건에서 $x\leq -1$ 또는 $x\geq 1$이므로

이를 만족하는 x값의 범위는 $-4\leq x\leq -1$

(ⅱ) $x^2-1<0$,

즉 $-1<x<1$일 때,

$|x^2-1|=-x^2+1$이므로 주어진 부등식은

$-x^2+1+3x<3,\ x^2-3x+2>0$

$(x-1)(x-2)>0$

$\therefore x<1$ 또는 $x>2$

이 때 조건에서 $-1<x<1$이므로

이를 만족하는 x의 값의 범위는 $-1<x<1$

(ⅰ), (ⅱ)로부터 주어진 부등식의 해는 $-4<x<1$

따라서 $\alpha=-4,\ \beta=1,\ \alpha+\beta=-3$

13. $x > 2$인 모든 실수 x에 대하여 $x^2 - 2kx + k - 1 > 0$을 성립하게 하는 실수 k의 최댓값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

해설

$D/4 = k^2 - k + 1 > 0$이므로 서로 다른 두 실근을 가진다.



문제의 조건을 만족하기 위해서는 대칭축이 2보다 왼쪽에 있어야 하고 $f(2) \geq 0$의 두 조건을 모두 만족해야 한다.

대칭축 조건에서 $k < 2$ ……㉠

$f(2) = 3 - 3k \geq 0$에서 $k \leq 1$ ……㉡

㉠, ㉡에서 $k \leq 1$

k의 최댓값은 1이다.

14. 세 변의 길이가 $x,\ x+1,\ x+2$인 삼각형이 둔각삼각형이 되는 x의 범위가 $\alpha < x < \beta$일 때,$\alpha+\beta$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

해설

$x > 0 \cdots\cdots$ ㉠
$x+2$가 최대변이므로
$x+2 < (x+1)+x \quad \therefore\ x > 1 \cdots\cdots$ ㉡
둔각삼각형이 되는 조건은
$(x+2)^2 > (x+1)^2 + x^2$
$\therefore\ -1 < x < 3 \cdots\cdots$ ㉢
㉠, ㉡, ㉢에서 공통범위를 구하면
$1 < x < 3$
$\therefore\ \alpha = 1,\ \beta = 3$
$\therefore\ \alpha+\beta = 4$

15. $-1 < x < 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^2 - 2ax + 2a + 3 > 0$ 이 항상 성립하도록 하는 정수 a 의 개수는?

① 2 개 ② 3 개 ③ 4 개 ④ 5 개 ⑤ 6 개

해설

$f(x) = x^2 - 2ax + 2a + 3$ 이라 하면

$f(x) = (x-a)^2 - a^2 + 2a + 3$



$-1 < x < 2$ 에서

부등식 $f(x) > 0$ 이 항상 성립하려면

(i)$a < -1$ 일 때,

다음 그림에서 $f(-1) > 0$

$4a + 4 > 0 \quad \therefore\ a > -1$

그런데 $a < -1$ 이므로 이를 만족시키는 a 의 값은 없다.

(ii) $-1 \le a < 2$ 일 때,



다음 그림에서 $f(a) > 0$

$-a^2 + 2a + 3 > 0$ 에서

$(a+1)(a-3) < 0$

$\therefore\ -1 < a < 3$

그런데 $-1 \le a < 2$ 이므로 $-1 < a < 2$

그런데 $a = -1$ 인 경우 $f(a) = 0$ 이어도

$-1 < x < 2$ 에서는 $f(x) > 0$ 이므로 성립한다.

따라서 $-1 \le a < 2$



(iii) $a \ge 2$ 일 때, 다음 그림에서

$f(2) > 0\ -2a + 7 > 0 \quad \therefore\ a < \frac{7}{2}$

그런데 $a \ge 2$ 이므로 $2 \le a < \frac{7}{2}$

(i), (ii), (iii) 에서 a 의 값의 범위는

$-1 \le a < \frac{7}{2}$

따라서, 정수 a 는 $-1, 0,\ 1,\ 2,\ 3$ 으로 5개다.