


1. 다음 그림에서  $x$ 의 값은?



- ①  $7 + 8\sqrt{2}$       ②  $7 + 8\sqrt{3}$       ③  $8 + 8\sqrt{2}$   
④  $8 + 8\sqrt{3}$       ⑤  $9 + 8\sqrt{2}$

해설

$$\overline{BD} = 16 \cos 60^\circ = 16 \times \frac{1}{2} = 8$$

$$\overline{DC} = \overline{AD} = 16 \sin 60^\circ = 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$$

$$\therefore x = \overline{BD} + \overline{CD} = 8 + 8\sqrt{3}$$

2. 허수단위  $i$ 에 대하여  $i + i^2 + i^3 + i^4 + i^5 + i^6$ 을 간단히하면?

①  $1+i$

④  $2+i$

②  $-1+i$

⑤ 2

해설

$$\begin{aligned}i + i^2 + i^3 + i^4 + i^5 + i^6 \\= i + (-1) + (-i) + 1 + i + (-1) \\= -1 + i\end{aligned}$$

3.  $\sin A = \frac{3}{5}$  일 때,  $\cos A + \tan A$  의 값은? (단,  $0^\circ \leq A \leq 90^\circ$ )


- ①  $\frac{5}{3}$       ②  $\frac{12}{5}$       ③  $\frac{23}{12}$       ④  $\frac{31}{20}$       ⑤  $\frac{39}{28}$

해설

$$\cos A + \tan A = \frac{4}{5} + \frac{3}{4} = \frac{16 + 15}{20} = \frac{31}{20}$$



4. 다음 그림에서  $\cos A = \frac{4}{5}$  이고,  $\overline{BH} = 3$ ,  $\overline{AH} = 4$  일 때,  $\overline{AC}$ 의 길이를 구하여라.



▶ 답:


▷ 정답:  $\frac{25}{4}$

해설

$$\cos A = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{5}{\overline{AC}} = \frac{4}{5}$$
$$\therefore \overline{AC} = \frac{25}{4}$$



5. 다음 그림의 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AB} = 6$ ,  $\angle C = 90^\circ$ ,  $\angle A = 60^\circ$  일 때,  $x + y$  의 값을 구하여라.



▶ 답:

▷ 정답:  $3 + 3\sqrt{3}$

해설

$$y = \overline{AC} = 6 \times \cos 60^\circ = 6 \times \frac{1}{2} = 3$$

또한,  $\angle B = 30^\circ$  이므로  $x = \overline{BC} = 6 \times \cos 30^\circ = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$  이다.

따라서  $x + y = 3 + 3\sqrt{3}$  이다.

6. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (단,  $0^\circ \leq A \leq 90^\circ$ )

①  $A$ 의 값이 커지면  $\tan A$ 의 값도 커진다.

②  $A$ 의 값이 커지면  $\cos A$ 의 값도 커진다.

③  $A$ 의 값이 커지면  $\sin A$ 의 값도 커진다.


④  $\sin A$ 의 최댓값은 1, 최솟값은 0이다.

⑤  $\tan 90^\circ$ 의 값은 정할 수 없다.

해설

$\angle A$ 의 크기가 커질수록  $\sin A, \tan A$ 의 값은 커지고  $\cos A$ 의 값은 작아진다.

7. 다음 삼각형의 넓이를 구하여라.




▶ 답:  $\underline{\text{cm}^2}$

▷ 정답:  $20\sqrt{2} \text{ cm}^2$

해설

$$\begin{aligned}| \text{넓이}| &= \frac{1}{2} \times 8 \times 10 \times \sin(180^\circ - 135^\circ) \\&= \frac{1}{2} \times 8 \times 10 \times \sin 45^\circ \\&= \frac{1}{2} \times 8 \times 10 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2} (\text{cm}^2)\end{aligned}$$

8. 다음 삼각형 중에서 넓이가 가장 큰 것을 골라라. (단,  $\sqrt{3} = 1.732$ 로 계산한다.)



▶ 답:

▷ 정답: ①

해설

$$\textcircled{1} S = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 \times \frac{1}{2} = \frac{25}{2}$$


$$\textcircled{2} S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 8$$

$$\textcircled{3} S < \frac{1}{2} \times 5 \times 3 = \frac{15}{2}$$

$$\textcircled{4} S = \frac{1}{2} \times 5 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} = 8.66$$

$$\textcircled{5} S = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} = 6.928$$

9. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 8cm인 원에 내접하는 정팔각형의 넓이를 구하여라.



▶ 답:  $\underline{\underline{\text{cm}^2}}$

▷ 정답:  $128\sqrt{2}\text{cm}^2$

해설

$$360^\circ \div 8 = 45^\circ$$

$$(\triangle AOH \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 8 \times 8 \times \sin 45^\circ \text{이므로}$$

$$(\text{정팔각형의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 8 \times 8 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times 8 = 128\sqrt{2} (\text{cm}^2)$$


10. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 합동인 두 원에서 중심각과 호의 길이는 정비례한다.
- ② 합동인 두 원에서 중심각과 현의 길이는 정비례한다
- ③ 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분한다.
- ④ 한 원에서 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.
- ⑤ 현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다.

해설

중심각과 현의 길이는 정비례하지 않는다.

11. 다음 그림에서  $y - x$ 의 값을 구하여라.




▶ 답:

▷ 정답: 5

해설

$$7 + y = 8 + 4 + x \quad \therefore y - x = 5$$

12. 다음 그림에서  $\angle x + \angle y$  의 크기는?



- ①  $97^\circ$     ②  $110^\circ$     ③  $117^\circ$     ④  $120^\circ$     ⑤  $125^\circ$

해설

$$\begin{aligned}\angle x &= 52^\circ \times 2 = 104^\circ \\ 2 : 8 &= y : 52, \quad \angle y = 13 \\ \therefore \angle x + \angle y &= 117^\circ\end{aligned}$$

13. 다음 그림의  $\square ABCD$  는 원에 내접하는 사각형일 때,  $\angle x + \angle y$  의 값은?



- ①  $200^\circ$     ②  $205^\circ$     ③  $210^\circ$     ④  $215^\circ$     ⑤  $220^\circ$

해설


$$\angle x = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$$

$$\angle y = 105^\circ$$

$$\therefore \angle x + \angle y = 220^\circ$$

14. 다음 그림에서 네 점 A, B, C, D 가 한 원 위에 있는 것을 모두 고르면?

①



②




③



④




⑤



해설

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \quad & 2 \times 12 = 3 \times 8 = 24 \\ \textcircled{5} \quad & \angle BAD = 105^\circ \\ \therefore \quad & \angle BAD + \angle BCD = 180^\circ \end{aligned}$$

15. 다음 그림에서 직선  $TT'$ 이 원  $O$ 의 접선이고, 점  $P$ 는 원의 접점일 때,  $\angle BPT$ 의 크기는?




- ①  $40^\circ$       ②  $45^\circ$       ③  $50^\circ$       ④  $55^\circ$       ⑤  $60^\circ$

해설

점  $P$  와 점  $A$  를 이으면  
 $\triangle ABP$  는 각  $APB$  가 직각인 삼각형이다.  
 $\therefore \angle BAP = 45^\circ$   
 $\therefore \angle BPT = \angle BAP = 45^\circ$

16. 다음 그림과 같이  $\triangle DEF$ 의 내접원  
과  $\triangle ABC$ 의 외접원이 같고  $\overline{DE} = \overline{DF}$  일 때,  $\angle ABC$ 의 크기는?



- ①  $30^\circ$       ②  $40^\circ$       ③  $50^\circ$       ④  $80^\circ$       ⑤  $100^\circ$


해설

이등변삼각형이므로  $\angle DFE = 80^\circ$  이고  $\overline{FC} = \overline{FB}, \overline{EA} = \overline{EB}$  이므로

$\angle FCB = \angle FBC = \angle ABE = \angle EAB = 50^\circ$

따라서,  $\angle ABC = 180^\circ - 50^\circ - 50^\circ = 80^\circ$  이다.

17. 다음 그림의 사각형 AGHE, 사각형 EFCD는 정사각형이고,  $\overline{AD} = a$ ,  $\overline{AB} = b$  일때, 사각형 GBFH의 넓이는?



- ①  $a^2 - 2ab - b^2$       ②  $a^2 + 3b^2 - 2ab$   
③  $-a^2 + 3ab - 2b^2$       ④  $-a^2 + 3ab - b^2$   
⑤  $-a^2 + 2ab - b^2$

해설

$$\begin{aligned}\square GBFH &= \square ABCD - \square AGHE - \square EFCD \\ &= ab - (a-b)^2 - b^2 = ab - (a^2 - 2ab + b^2) - b^2 \\ &= -a^2 + 3ab - 2b^2\end{aligned}$$

18. 등식  $2x^2 - 3x - 2 = a(x-1)(x-2) + bx(x-2) + cx(x-1)$   $\diamond | x$ 에 관한 항등식이 되도록 할 때,  $2ab$ 의 값은?

① -6      ② -4      ③ -2      ④ 2      ⑤ 4

해설

양변에  $x = 0$ 을 대입하면,  $-2 = 2a \quad \therefore a = -1$

양변에  $x = 1$ 을 대입하면,  $-3 = -b \quad \therefore b = 3$

$\therefore 2ab = -6$

19.  $x^4 + 3x^2 + 4 = (x^2 + x + 2)(x^2 + ax + b)$  일 때, 상수  $a, b$ 의 곱을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -2

해설

$$\begin{aligned}(좌변) &= (x^2 + 2)^2 - x^2 \\&= (x^2 + x + 2)(x^2 - x + 2)\end{aligned}$$

$$\therefore a = -1, b = 2$$

$$\therefore ab = -1 \times 2 = -2$$

20.  $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2008}$  을 간단히 하면?

- ① -1      ② 0      ③ 1      ④  $i$       ⑤  $-i$

해설

$$\begin{aligned}\frac{1+i}{1-i} &= \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} \\ &= \frac{2i}{2} = i \\ \therefore \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2008} &= i^{2008} \\ &= (i^4)^{502} = 1\end{aligned}$$

21. 복소수  $z$ 와 그 켤레복소수  $\bar{z}$ 에 대하여 다음을 만족하는  $z$ 를 구하면?

$$z + \bar{z} = 4, z \cdot \bar{z} = 7$$

- ①  $z = 1 \pm \sqrt{3}i$       ②  $z = 2 \pm \sqrt{3}i$       ③  $z = 3 \pm \sqrt{3}i$   
④  $z = 1 \pm 2\sqrt{3}i$       ⑤  $z = 2 \pm 2\sqrt{3}i$

해설

$$\begin{aligned} z &= a + bi \\ z + \bar{z} &= 2a = 4, z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = 7 \\ \therefore a &= 2, b = \pm \sqrt{3} \\ \therefore z &= 2 \pm \sqrt{3}i \end{aligned}$$

22.  $x$ 에 대한 이차방정식  $2mx^2 + (5m+2)x + 4m + 1 = 0$ 이 중근을 갖도록 하는 실수  $m$ 의 값은?

①  $-\frac{3}{2}, -2$       ②  $-\frac{7}{12}, -\frac{1}{2}$       ③  $-\frac{7}{2}, 2$   
④  $-\frac{2}{7}, 2$       ⑤  $\frac{2}{7}, \frac{3}{2}$

해설

주어진 이차방정식의 판별식을  $D$ 라고 하면 중근을 가질 조건은

$D = 0$ 이므로

$$D = (5m+2)^2 - 4 \cdot 2m \cdot (4m+1) = 0$$

$$25m^2 + 20m + 4 - 32m^2 - 8m = 0$$

$$7m^2 - 12m - 4 = 0$$

$$(7m+2)(m-2) = 0$$

$$\therefore m = -\frac{2}{7} \text{ 또는 } 2$$

23. 계수가 실수인  $x$ 에 대한 이차방정식  $x^2 + 2(k-a)x + k^2 + b - 3 = 0$ 이  $k$ 의 값에 관계없이 항상 중근을 갖도록 하는 상수  $a, b$ 의 값은?

- ①  $a = 1, b = 2$       ②  $a = 0, b = 3$       ③  $a = -1, b = 2$   
④  $a = 0, b = 2$       ⑤  $a = -1, b = 3$

해설

중근을 가지려면, 편별식이 0이다.

$$D' = (k-a)^2 - (k^2 + b - 3) = 0$$

$$\Rightarrow -2ak + a^2 - b + 3 = 0$$

모든  $k$ 에 대해 성립하려면

$$-2a = 0, a^2 - b + 3 = 0$$


$$\therefore a = 0, b = 3$$

24. 다음 그림의  $\triangle ABC$  에서  $\overline{AB} = 12\text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 24\text{ cm}$ ,  $\angle B = 60^\circ$  일 때,  $\overline{AC}$  의 길이는?

①  $10\sqrt{6}\text{ cm}$     ②  $11\sqrt{4}\text{ cm}$

③  $12\sqrt{3}\text{ cm}$     ④  $13\sqrt{5}\text{ cm}$

⑤  $14\sqrt{2}\text{ cm}$



**해설**

$\triangle ABC$  의 꼭짓점 A에서  $\overline{BC}$ 에

내린 수선의 발을 H 라 놓으면

$$\triangle ABH \text{에서 } \overline{AH} = 12 \sin 60^\circ =$$

$$6\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

또,  $\triangle AHC$ 에서


$$\overline{CH} = \overline{BC} - \overline{BH} = 24 - 6 = 18 \text{ (cm)}$$

$$x^2 = \overline{AH}^2 + \overline{CH}^2 = (6\sqrt{3})^2 + 18^2 = 432$$

$$\therefore x = \sqrt{432} = 12\sqrt{3} \text{ (cm)}$$



25. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 8cm인 원 O에 내접하는 삼각형 ABC에서  $\angle BAC = 75^\circ$  일 때,  $\triangle OBC$ 의 넓이는?



- ①  $8 \text{ cm}^2$       ②  $8\sqrt{3} \text{ cm}^2$       ③  $16 \text{ cm}^2$   
④  $16\sqrt{2} \text{ cm}^2$       ⑤  $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$

해설

원주각  $\angle BAC = 75^\circ$  이므로 중심각  $\angle BOC = 150^\circ$  이다.

따라서  $\triangle OBC = \frac{1}{2} \times 8 \times 8 \times \sin 30^\circ = 16 \text{ cm}^2$  이다.

26. 다음  $\boxed{\quad}$  안에 알맞은 수를 차례대로 써 넣어라.

$$(x^3 + 4x^2 + 3x - 2) \div (\boxed{\quad}x^2 + \boxed{\quad}x + \boxed{\quad}) = x + 2$$

▶ 답:

▶ 답:

▶ 답:

▷ 정답: 1

▷ 정답: 2

▷ 정답: -1

해설

$$\boxed{\quad}x^2 + \boxed{\quad}x + \boxed{\quad} = A \text{ 라 하면}$$

$$(x^3 + 4x^2 + 3x - 2) \div A = x + 2$$

$$\therefore A = (x^3 + 4x^2 + 3x - 2) \div (x + 2)$$

$$\therefore A = x^2 + 2x - 1 \text{ 이므로}$$

$\boxed{\quad}$ 안에 알맞은 수는 차례대로 1, 2, -1이다.

27.  $a = 2004$ ,  $b = 2001$  일 때,  $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$  의 값은?

- ① 21      ② 23      ③ 25      ④ 27      ⑤ 29

해설

준 식은  $(a - b)^3$  이다.

$$a - b = 2004 - 2001 = 3$$

$$\therefore (a - b)^3 = 3^3 = 27$$

28.  $(10^5 + 2)^3$ 의 각 자리의 숫자의 합을 구하여라.

- ① 15      ② 18      ③ 21      ④ 26      ⑤ 28

해설

$$\begin{aligned} \text{준식을 전개하면} \\ & 10^{15} + 2^3 + 3 \times 2 \times 10^5(10^5 + 2) \\ & = 10^{15} + 2^3 + 6 \times 10^{10} + 12 \times 10^5 \\ & = 10^{15} + 10^{10} \times 6 + 10^5 \times 12 + 8 \\ \therefore & 1 + 6 + 1 + 2 + 8 = 18 \end{aligned}$$

29.  $a + b + c = 0$ ,  $a^2 + b^2 + c^2 = 1$  일 때,  $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{4}$       ②  $\frac{1}{2}$       ③ 0      ④ 1      ⑤ 4

해설

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) \text{ 이면}$$

$$ab + bc + ca = -\frac{1}{2}$$

$$(ab + bc + ca)^2 = a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 + 2abc(a + b + c)$$

$$\frac{1}{4} = a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 + 2abc(a + b + c)$$

$$\text{따라서 } a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 = \frac{1}{4}$$

30.  $\frac{2x + ay - b}{x - y - 1} \geq k$  라 놓으면  $x, y$ 의 값에 대하여도 항상 일정한 값을 가질 때,  $a - b$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -4

해설

$$\begin{aligned}\frac{2x + ay - b}{x - y - 1} &= k \text{ 라 놓으면} \\ 2x + ay - b &= k(x - y - 1) \\ x, y \text{에 대하여 정리하면,} \\ (2 - k)x + (a + k)y - b + k &= 0 \\ \text{위의 식이 } x, y \text{에 대한 항등식이어야 하므로} \\ 2 - k &= 0, a + k = 0, -b + k = 0 \\ \therefore k &= 2, a = -2, b = 2 \\ \therefore a - b &= -4\end{aligned}$$

31.  $(x-3)(x-1)(x+2)(x+4)+24$  를 인수분해하면  $(x+a)(x+b)(x^2+cx+d)$  이다.  $a+b+c-d$  의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 10

해설

$$\begin{aligned}x^2 + x &= A \text{로 치환하면} \\(x-3)(x-1)(x+2)(x+4) + 24 &= ((x-1)(x+2))((x-3)(x+4)) + 24 \\&= (x^2 + x - 2)(x^2 + x - 12) + 24 \\&= (A-2)(A-12) + 24 \\&= A^2 - 14A + 48 = (A-6)(A-8) \\&= (x^2 + x - 6)(x^2 + x - 8) \\&= (x-2)(x+3)(x^2 + x - 8) \\∴ a+b+c-d &= -2 + 3 + 1 - (-8) = 10\end{aligned}$$

32.  $a^2 - b^2 - c^2 + 2bc$ 의 인수가 아닌 것은?

- ①  $a - b + c$       ②  $a + b - c$       ③  $-a + b - c$   
④  $\textcircled{4} -a + b + c$       ⑤  $-a - b + c$

해설

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 - c^2 + 2bc &= a^2 - (b^2 + c^2 - 2bc) \\ &= a^2 - (b - c)^2 \\ &= (a + b - c)(a - b + c) \end{aligned}$$

인수 :  $(a + b - c)$ ,  $(a - b + c)$ (단, 복부호 동순)

33. 다음 중  $x^4 + x^3 - 11x^2 - 9x + 18$ 의 인수가 아닌 것은?

- ①  $x - 1$     ②  $x + 1$     ③  $x - 3$     ④  $x + 3$     ⑤  $x + 2$

해설

준식을 인수정리와 조립제법을 이용하여 정리하면

$$(x - 1)(x - 3)(x + 2)(x + 3) = 0$$

※ 최고차항의 계수가 1인 다항식에서 인수정리를 사용할 때,  
상수항의 약수 중에서 대입하여 0이 되는 정수를 찾아본다.

34.  $\frac{2012^3 + 1}{2012 \times 2011 + 1}$ 의 값을  $a$ 라 할 때,  $\frac{a+1}{a-1}$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답:  $\frac{1007}{1006}$

해설

$$\begin{aligned} a &= \frac{(2012+1)(2012^2 - 2012 + 1)}{(2012^2 - 2012 + 1)} \\ &= 2013 \text{이므로} \\ \therefore \frac{a+1}{a-1} &= \frac{2013+1}{2013-1} = \frac{2014}{2012} = \frac{1007}{1006} \end{aligned}$$

35.  $a+b+c=1$ ,  $a^2+b^2+c^2=5$ ,  $a^3+b^3+c^3=2$  일 때,  $abc$ 의 값은?

- ①  $-\frac{5}{3}$       ② 0      ③  $\frac{5}{3}$       ④  $\frac{5}{2}$       ⑤ 1

해설

$$\begin{aligned} & a^2 + b^2 + c^2 \\ &= (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca) \quad | \text{므로} \\ & 5 = 1 - 2(ab+bc+ca) \\ & \therefore ab+bc+ca = -2 \\ & a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \\ &= (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \quad | \text{므로} \\ & 2 - 3abc = 1 \cdot (5 + 2) \\ & \therefore abc = -\frac{5}{3} \end{aligned}$$

36.  $x = 1001$  일 때,  $\frac{x^6 - x^4 + x^2 - 1}{x^5 + x^4 + x + 1}$  의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 1000

해설

$$\begin{aligned}\frac{x^6 - x^4 + x^2 - 1}{x^5 + x^4 + x + 1} &= \frac{(x^4 + 1)(x^2 - 1)}{(x^4 + 1)(x + 1)} \\&= x - 1 \\&= 1001 - 1 \\&= 1000\end{aligned}$$

37.  $a + b + c = 4$ ,  $ab + bc + ca = 3$ ,  $abc = 1$  일 때,  $a^3 + b^3 + c^3$ 의 값을 구하면?

- ① 30      ② 31      ③ 32      ④ 33      ⑤ 34

해설

$$\begin{aligned}(a + b + c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) \\ \text{위 식에 따라 } a^2 + b^2 + c^2 + 6 &= 16 \\ \therefore a^2 + b^2 + c^2 &= 10 \\ a^3 + b^3 + c^3 &= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) + 3abc \\ &= 4 \times (10 - 3) + 3 \times 1 \\ &= 31\end{aligned}$$

38.  $x + y + z = 1$ ,  $xy + yz + zx = 2$ ,  $xyz = 3$  일 때,  $(x + y)(y + z)(z + x)$ 의 값은?

① -1      ② -2      ③ -3      ④ -4      ⑤ -5

해설

$$\begin{aligned}x + y + z = 1 \text{을 변형하면} \\(\text{준식}) &= (1 - z)(1 - x)(1 - y) \\&= 1 - (x + y + z) + (xy + yz + zx) - xyz \\&= 1 - 1 + 2 - 3 = -1\end{aligned}$$

39.  $x^2 + ax - 9$  와  $x^2 + bx + c$  의 합은  $2x^2 - 4x - 6$ , 최소공배수는  $x^3 - x^2 - 9x + 9$ 이다.  $a - b + c$ 의 값을 구하여라. (단,  $a, b, c$ 는 상수이다.)

▶ 답:

▷ 정답: 7

해설

$$A = x^2 + ax - 9 = Gp$$

$B = x^2 + bx + c = Gq$  라 하면

$$A + B = (p + q)G = 2x^2 - 4x - 6 = 2(x + 1)(x - 3)$$

$$L = pqG = x^3 - x^2 - 9x + 9 = x^2(x - 1) - 9(x - 1)$$

$$= (x - 1)(x^2 - 9) = (x - 1)(x + 3)(x - 3)$$

따라서,  $G = x - 3$ ,  $p = x + 3$ ,  $q = x - 1$ 이다.

$$\therefore A = (x + 3)(x - 3) = x^2 - 9$$

$$B = (x - 1)(x - 3) = x^2 - 4x + 3$$

$$\therefore a = 0, b = -4, c = 3$$

$$\therefore a - b + c = 7$$

40. 최고차항의 계수가 1인 두 이차다항식의 최소공배수가  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 이고, 최대공약수가  $x + 2$ 일 때, 두 다항식의 합은?

- ①  $2x^2 + x - 6$       ②  $2x^2 - 2x + 3$       ③  $2x^2 - 3x + 4$   
④  $2x^2 - 6$       ⑤  $2x^2 - 8$

해설

두 다항식을  $A = aG$ ,  $B = bG$  ( $a, b$ 는 서로소)라고 하면  
 $L = abG = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

이 때, 최대공약수  $G$  가  $x + 2$  이므로 조립제법을 하여  $L$  을  
인수분해하면

$$\therefore L = (x^3 - 4x + 3)(x + 2)$$
$$= (x - 1)(x - 3)(x + 2)$$

따라서, 구하는 두 이차 다항식은

$$(x - 1)(x + 2) \text{ 와 } (x - 3)(x + 2),$$

즉  $x^2 + x - 2$ ,  $x^2 - x - 6$  이다.

따라서, 두 다항식의 합은  $2x^2 - 8$  이다.

41.  $z \cdot \bar{z} = 1$  을 만족하는 복소수  $z_1, z_2$  에 대하여  $z_1 + z_2 = 2$  일 때,  $z_1 \cdot z_2$  의 값은? (단,  $\bar{z}_1, \bar{z}_2$  는 각각  $z_1, z_2$  의 결례복소수이다.)

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

해설

$$z_1 = a + bi, z_2 = c + di$$

( $a, b, c, d$  는 실수)로 놓으면

$$\bar{z}_1 = a - bi, \bar{z}_2 = c - di \text{ 이므로}$$

$z_1 \cdot \bar{z}_1 = 1$ 에서

$$a^2 + b^2 = 1 \cdots ⑦$$

$z_2 \cdot \bar{z}_2 = 1$ 에서

$$c^2 + d^2 = 1 \cdots ⑧$$

$$\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = 2 \text{에서 } a + c + (b + d)i = 2$$

복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$$a + c = 2, b + d = 0$$

⑦ - ⑧을 하면

$$a^2 - c^2 + b^2 - d^2 = 0$$

$$(a + c)(a - c) + (b + d)(b - d) = 0$$

그런데  $b + d = 0$ 이므로  $(a + c)(a - c) = 0$

$$\therefore a = -c \text{ 또는 } a = c$$

그런데  $a + c = 2$ 이므로  $a = c = 1$

⑦, ⑧에서  $a = c, c = 1$ 을 각각 대입하면  $d = b = 0$

따라서  $z_1 = 1, z_2 = 1$ 이므로

$$z_1 \cdot z_2 = 1$$

42.  $\alpha, \beta$  가 복소수일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (단,  $\bar{\beta}$  는  $\beta$  의  
켤레복소수이고  $i = \sqrt{-1}$ )

[보기]

Ⓐ  $\alpha = \bar{\beta}$  이면  $\alpha + \beta, \alpha\beta$  는 모두 실수이다.

Ⓑ  $\alpha = \bar{\beta}$  일 때,  $\alpha\beta = 0$  이면  $\alpha = 0$  이다.

Ⓒ  $\alpha^2 + \beta^2 = 0$  이면  $\alpha = 0, \beta = 0$  이다.

Ⓐ Ⓛ

Ⓑ Ⓛ, Ⓜ

Ⓒ Ⓛ, Ⓝ

Ⓓ Ⓛ, Ⓝ

Ⓔ Ⓛ, Ⓜ, Ⓝ

[해설]

$$\alpha = a + bi \Rightarrow \bar{\beta} = a - bi$$

Ⓐ  $\alpha + \beta = (a + bi) + (a - bi) = 2a$  는 실수 (T),  $\alpha\beta = a^2 + b^2 =$   
실수

Ⓑ  $\alpha\beta = a^2 + b^2 = 0 \Rightarrow a = 0, b = 0$

$$\therefore \alpha = 0 \text{ (T)}$$

Ⓔ 반례:  $\alpha = 1, \beta = i$  일 때,  $\alpha^2 + \beta^2 = 0$

43. 복소수  $z$ 에 대하여  $3z + \bar{z}(1+i) = 3 - i$ 가 성립할 때,  $z\bar{z}$ 의 값은?

- ① -3      ② 0      ③  $\frac{1}{2}$       ④ 2      ⑤ 4

해설

$$z = a + bi \quad (a, b \text{는 실수}) \text{로 놓으면 } \bar{z} = a - bi$$

이것을 주어진 식에 대입하면

$$3(a+bi) + (a-bi)(1+i) = 3 - i$$

$$3a + 3bi + a + ai - bi + b = 3 - i$$

$$(4a+b) + (a+2b)i = 3 - i$$

복소수가 서로 같은 조건에 의하여  $4a+b=3$ ,  $a+2b=-1$

$$\begin{cases} 4a+b=3 & \cdots \textcircled{\text{R}} \\ a+2b=-1 & \cdots \textcircled{\text{L}} \end{cases} \text{에서}$$

$\textcircled{\text{R}} \times 2 - \textcircled{\text{L}}$  을 하면  $7a=7$ ,

$$\therefore a=1$$

$$a=1 \stackrel{\text{을}}{\text{을}} \textcircled{\text{R}} \text{에 대입하면 } b=-1$$

$$\text{따라서 } z = a + bi = 1 - i \stackrel{\text{으로}}{\text{으로}} z\bar{z} = (1-i)(1+i) = 2$$

44. 등식  $x(3 + 4i) + \overline{y(1 + i)} = 5 + 2i$ 를 만족하는 실수  $x, y$ 에 대하여  $x + y$ 의 값은? (단,  $\bar{z}$ 는  $z$ 의 콜레복소수이다.)

① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

해설

$$\begin{aligned}x(3 + 4i) + \overline{y(1 + i)} \\= 3x + 4xi + y - yi \\= (3x + y) + (4x - y)i \\= 5 + 2i\end{aligned}$$

$$\therefore 3x + y = 5, 4x - y = 2$$

$$x = 1, y = 2$$

$$\therefore x + y = 3$$

45.  $x^2 - 2x + 3 = 0$  의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라고 할 때,  $(\alpha^2 - 2\alpha)(\beta^2 - 2\beta)$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 9

해설

$x^2 - 2x + 3 = 0$ 에서 근과 계수의 관계에 의해

$$\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = 3$$

$$(\alpha^2 - 2\alpha)(\beta^2 - 2\beta)$$

$$= \alpha^2\beta^2 - 2\alpha^2\beta - 2\alpha\beta^2 + 4\alpha\beta$$

$$= (\alpha\beta)^2 - 2\alpha\beta(\alpha + \beta) + 4\alpha\beta$$

$$= 9 - 6 \cdot 2 + 12 = 9$$