

1.  $x$ 에 대한 다항식  $3x^3y + 5y - xz + 9xy - 4$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

Ⓐ 내림차순으로 정리하면  
 $3yx^3 + (9y - z)x + 5y - 4$ 이다.

Ⓑ 오름차순으로 정리하면  
 $5y - 4 + (9y - z)x + 3yx^3$ 이다.

Ⓒ 주어진 다항식은  $x$ 에 대한 3 차식이다.

Ⓓ  $x^3$ 의 계수는 3이다.

Ⓔ 상수항은 -4이다.

① Ⓐ, Ⓑ

② Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ

③ Ⓐ, Ⓒ

④ Ⓐ, Ⓑ, Ⓓ, Ⓔ

⑤ Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ

해설

Ⓓ  $x^3$ 의 계수는  $3y$ 이다.

Ⓔ 상수항은  $5y - 4$ 이다.

2. 다항식  $x^3 - 3x - 3$ 을 다항식  $x^2 - 2x - 1$ 로 나누었을 때의 몫이  $ax + b$ 이고, 나머지가  $cx + d$ 이었다. 이 때,  $a + b + c + d$ 의 값은?

① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

해설

$$x^3 - 3x - 3 = (x^2 - 2x - 1)(ax + b) + cx + d$$

에서 계수를 비교하면

$$a = 1, -b + d = -3, -a - 2b + c = -3, b - 2a = 0$$

에서  $a = 1, b = 2, d = -1, c = 2$

$$\therefore a + b + c + d = 1 + 2 + (-1) + 2 = 4$$

3. 다음 그림은 한변의 길이가  $x$ 인 정사각형을

대각선을 따라 자른 후 직각이등변삼각형 2개를 떼어낸 도형이다. 이때, 색칠한 부분의 넓이를  $x, y$ 에 관한 식으로 나타내어라.



①  $xy - y^2$

④  $\frac{xy - y^2}{2}$

②  $x^2 - y^2$

⑤  $\frac{x - y}{2}$

③  $x^2 - y$

해설

$$x^2 - 2 \times \frac{1}{2} \times y \times y = x^2 - y^2$$

4.  $a^2 + b^2 + c^2 = 9$ ,  $ab + bc + ca = 9$ ,  $a + b + c$ 의 값은?

- ①  $-3\sqrt{2}$       ②  $-2\sqrt{3}$       ③  $\pm 3\sqrt{3}$   
④  $\pm 3\sqrt{2}$       ⑤  $\sqrt{6}$

해설

$$\begin{aligned}(a+b+c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) \\&= 9 + 18 = 27\end{aligned}$$

$$\therefore a+b+c = \pm 3\sqrt{3}$$

5.  $f(x) = 3x^3 + px^2 + qx + 12$  가  $x+2$  로도 나누어떨어지고,  $x-1$  로도 나누어떨어질 때,  $\frac{q}{p}$  의 값은?

① 9      ② 4      ③ -9      ④ -3      ⑤ -12

해설

$$f(-2) = -24 + 4p - 2q + 12 = 0$$

$$f(1) = 3 + p + q + 12 = 0$$

$$p = -3, q = -12, \frac{q}{p} = \frac{-12}{-3} = 4$$

6.  $x^2 - 2x - y^2 + 2y$ 를 인수분해하였더니,  $(x+ay)(x-by+c)$ 가 되었다.  
○ 때,  $a, b, c$ 를 순서대로 쓴 것은?

- ① -1, 0, 1      ② -1, 1, 2      ③ -2, -1, 1  
**④ -1, -1, -2**      ⑤ -1, 2

해설

$$x^2 - 2x - y^2 + 2y = (x+y)(x-y) - 2(x-y)$$

$$= (x-y)(x+y-2)$$

$$\therefore a = -1, b = -1, c = -2$$

7.  $x^2 - 2x - y^2 + 2y$ 를 인수분해 하였더니  $(x + ay)(x - by + c)$ 가 된다고 할 때,  $a + b + c$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -4

해설

$$\begin{aligned}x^2 - 2x - y^2 + 2y \\&= (x^2 - y^2) - 2(x - y) \\&= (x + y - 2)(x - y) \\&= (x + ay)(x - by + c) \\&\text{계수를 비교하면} \\a = -1, b = -1, c = -2 \\&\therefore a + b + c = -1 - 1 - 2 = -4\end{aligned}$$

8. 두 다항식  $x^3 + 1$ ,  $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ 의 최대공약수를 구하면?

- ①  $x$       ②  $x + 1$       ③  $x + 2$       ④  $x - 1$       ⑤  $x - 2$

해설

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$$

$$x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = (x - 2)(x + 1)(x + 3)$$

따라서 최대공약수는  $x + 1$

9. 두 다항식  $x^2 - 4x + 3a + b$  와  $x^2 + bx - 6$ 의 최대공약수가  $x - 2$  일 때,  
 $a + b$  의 값은?

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 8

해설

$f(x) = x^2 - 4x + 3a + b$ ,  
 $g(x) = x^2 + bx - 6$ 이라 하면  
 $f(x)$ 와  $g(x)$ 는 모두  $x - 2$ 로 나누어떨어지므로  
 $f(2) = g(2) = 0$ 에서  
 $f(2) = 4 - 8 + 3a + b = 0$ ,  $g(2) = 4 + 2b - 6 = 0$   
 $\therefore a = 1$ ,  $b = 1 \therefore a + b = 2$

10.  $\frac{2x+3a}{4x+1} \nparallel x$ 에 관계없이 일정한 값을 가질 때,  $12a$ 의 값을 구하시오.

▶ 답:

▷ 정답:  $12a = 2$

해설

$$\frac{2x+3a}{4x+1} = k \text{ (일정값 } k = k \text{ ) 라 놓으면 } 2x+3a = k(4x+1) \text{에서}$$

$$(2-4k)x + 3a - k = 0$$

이 식은  $x$ 에 대한 항등식이므로,

$$2-4k = 0, 3a-k = 0$$

$$k = \frac{1}{2} \text{이므로 } 3a = k \text{에서 } a = \frac{1}{6}$$

$$\therefore 12a = 2$$

11.  $x$ 의 다항식  $f(x)$ 를  $x - 2$ 로 나누면  $-3$ 이 남고,  $x + 3$ 으로 나누면  $27$ 이 남는다. 이  $f(x)$ 를  $(x - 2)(x + 3)$ 으로 나눌 때, 그 나머지는?

- ①  $6x - 9$       ②  $\textcircled{2} -6x + 9$       ③  $2x + 3$   
④  $-2x - 3$       ⑤  $2x - 3$

해설

$f(x)$ 를  $(x - 2)(x + 3)$ 으로 나눈 몫을  $Q(x)$ , 나머지를  $ax + b$ 라 하면

$$f(x) = (x - 2)(x + 3)Q(x) + ax + b$$

문제의 조건으로부터

$$f(2) = -3, f(-3) = 27 \text{이므로}$$

$$2a + b = -3, -3a + b = 27$$

$$\therefore a = -6, b = 9$$

따라서 구하는 나머지는  $-6x + 9$ 이다.

12. 다항식  $f(x)$  를  $2x - 1$  로 나누면 나머지는  $-4$  이고, 그 몫을  $x + 2$  로 나누면 나머지는  $2$  이다. 이때,  $f(x)$  를  $x + 2$  로 나눌 때의 나머지를 구하시오.

▶ 답:

▷ 정답:  $-14$

해설

$$f(x) = (2x - 1)Q(x) - 4 \text{ 라 하면}$$
$$f(-2) = -5Q(-2) - 4$$

그런데  $Q(-2) = 2$  이므로  $f(-2) = -14$

13. 다항식  $f(x)$ 를  $(x-1)(x-2)$ 로 나눈 나머지가  $4x+3$  일 때  $f(2x)$ 를  $x-1$ 로 나눈 나머지는?

- ① -1      ② 0      ③ 3      ④ 7      ⑤ 11

해설

$$f(x) = (x-1)(x-2)Q(x) + 4x + 3$$

$x=2$ 를 대입하면  $f(2)=11$

$f(2x)$ 를  $x-1$ 로 나눈 나머지를  $R$ 이라 하면

$$f(2x) = (x-1)Q'(x) + R$$

$x=1$ 을 대입하면  $f(2)=R$

$$\therefore R=11$$

14.  $x$ 에 대한 다항식  $x^3 + ax^2 + bx + c$ 를  $x-1$ 로 나누었을 때 몫과 나머지를 다음과 같은 조립제법으로 구하려고 한다.  $i = 1$  일 때,  $a + b + c$ 의 값을 옳게 구한 것은?

$$\begin{array}{c|cccc} 1 & 1 & a & b & c \\ & & d & e & f \\ \hline 1 & g & h & i \end{array}$$

- ① -2      ② -1      ③ 0      ④ 1      ⑤ 2

해설

다항식  $x^3 + ax^2 + bx + c$ 를  $x-1$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하면 다음과 같다.

$$\begin{array}{c|ccccc} 1 & 1 & a & b & c \\ & & 1 & a+1 & a+b+1 \\ \hline 1 & a+1 & a+b+1 & a+b+c+1 \end{array}$$

○] 때  $a+b+c+1 = 1$  이므로

$$a+b+c = 0$$

따라서 ③이다.

15. 등식  $3x^3 - x + 2 = a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d$  가  $x$ 에 관한 항등식이 되도록 상수  $a, b, c, d$ 의 값을 정하면?

①  $a = 3, b = 7, c = -4, d = 4$

②  $\textcircled{a} a = 3, b = 9, c = 8, d = 4$

③  $a = 2, b = 9, c = 6, d = 4$

④  $a = 1, b = 3, c = 8, d = 4$

⑤  $a = 2, b = -9, c = 6, d = 4$

해설

$$\begin{array}{c|cccc} & 3 & 0 & -1 & 2 \\ & 3 & 3 & 2 & 4 \\ \hline 1 & 3 & 3 & 2 & 4 \\ & 3 & 6 & 6 & \\ \hline 1 & 3 & 6 & 8 & \\ & 3 & & 8 & \\ \hline & 3 & 9 & & \\ & & & \leftarrow b & \\ & & \uparrow & & \\ & a & & & \end{array}$$

$\therefore a = 3, b = 9, c = 8, d = 4$

해설

(i)  $x-1 = y$ 로 놓으면  $x = y+1$  이므로

$$3(y+1)^3 - (y+1) + 2 = ay^3 + by^2 + cy + d$$

$$\therefore 3y^3 + 9y^2 + 8y + 4 = ay^3 + by^2 + cy + d$$

$$\therefore a = 3, b = 9, c = 8, d = 4$$

(ii)  $x$  대신  $-1, 0, 1, 2$ 를 대입하면,

$$x = 0 \text{ 대입} : 2 = -a + b - c + d \cdots ①$$

$$x = -1 \text{ 대입} : 0 = -8a + 4b - 2c + d \cdots ②$$

$$x = 1 \text{ 대입} : 4 = d \cdots ③$$

$$x = 2 \text{ 대입} : 24 = a + b + c + d \cdots ④$$

①, ②, ③, ④를 연립하여 풀면,

$$\therefore a = 3, b = 9, c = 8, d = 4$$

16.  $(x-3)(x-1)(x+2)(x+4)+24$  를 인수분해하면  $(x+a)(x+b)(x^2+cx+d)$  이다.  $a+b+c-d$  의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 10

해설

$$\begin{aligned}x^2 + x &= A \text{로 치환하면} \\(x-3)(x-1)(x+2)(x+4) + 24 &= ((x-1)(x+2))((x-3)(x+4)) + 24 \\&= (x^2 + x - 2)(x^2 + x - 12) + 24 \\&= (A-2)(A-12) + 24 \\&= A^2 - 14A + 48 = (A-6)(A-8) \\&= (x^2 + x - 6)(x^2 + x - 8) \\&= (x-2)(x+3)(x^2 + x - 8) \\∴ a+b+c-d &= -2 + 3 + 1 - (-8) = 10\end{aligned}$$

17. 다음 중  $x^4 - 4x^3 - 7x^2 + 34x - 24$  를 인수분해 하였을 때, 인수가 아닌 것은?

- ①  $x - 1$     ②  $x - 2$     ③  $x + 3$     ④  $x + 4$     ⑤  $x - 4$

해설

$$f(x) = x^4 - 4x^3 - 7x^2 + 34x - 24 \text{ 라 하면}$$

$$f(1) = f(2) = 0 \text{ 이므로}$$

$f(x)$  는  $x - 1, x - 2$  를 인수로 갖는다.

조립제법을 해 보면 즉,

$$x^4 - 4x^3 - 7x^2 + 34x - 24$$

$$= (x - 1)(x - 2)(x^2 - x - 12)$$

$$= (x - 1)(x - 2)(x - 4)(x + 3)$$

18. 삼각형의 세 변의 길이  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 에 대하여  $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ 가 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① 직각삼각형      ② 이등변삼각형  
③ 정삼각형      ④ 직각이등변삼각형  
⑤ 둔각삼각형

해설

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 &= ab + bc + ca \text{에서} \\ a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca &= 0 \\ \frac{1}{2}(2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca) &= 0 \\ \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} &= 0 \end{aligned}$$

$a$ ,  $b$ ,  $c$ 는 실수이므로

$$a - b = 0, b - c = 0, c - a = 0$$

$$\therefore a = b = c$$

따라서, 주어진 삼각형은 정삼각형이다.

19. 다음 식을 인수분해하면  $x^4 - 3x^2y^2 + 4y^4 = (x^2 + axy + by^2)(x^2 + cxy + dy^2)$  일 때,  $a + b + c + d$ 의 값을 구하여라. ( $a, b, c, d$ 는 상수)

▶ 답:

▷ 정답: 4

해설

$$\begin{aligned}(\text{준식}) &= x^4 + 4x^2y^2 + 4y^4 - 7x^2y^2 \\&= (x^2 + 2y^2)^2 - 7x^2y^2 \\&= (x^2 + \sqrt{7}xy + 2y^2)(x^2 - \sqrt{7}xy + 2y^2) \\∴ a + b + c + d &= 4\end{aligned}$$

20. 이차항의 계수가 1인 두 이차다항식  $A, B$ 의 최대공약수가  $x + 2$ 이고  
최소공배수가  $x^3 + x^2 - 4x - 4$ 이다.  $A + B = ax^2 + bx + c$ 를 만족하는  
상수  $a + b + c$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 3

해설

$$\begin{aligned}x^3 + x^2 - 4x - 4 &= (x+2)(x+1)(x-2) \\ \text{두 다항식은 각각 } (x+2)(x+1), (x+2)(x-2) \\ A + B &= (x+2)(x-2) + (x+2)(x+1) \\ &= 2x^2 + 3x - 2 = ax^2 + bx + c \\ \therefore a &= 2, b = 3, c = -2 \\ \therefore a + b + c &= 3\end{aligned}$$

21. 차수가 같은 두 다항식의 합이  $2x^2 - 5x - 3$ 이고 최소공배수가  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 일 때, 두 다항식의 최대공약수를 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답:  $x - 3$

해설

두 다항식을  $A, B$ 라고 하면

$$A + B = (a + b)G, L = abG,$$

즉, 최대공약수는 두 식의 합과 최소공배수의 공약수이다.

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 1)(x + 2)$$

$$2x^2 - 5x - 3 = (x - 3)(2x + 1)$$

$$\therefore G = x - 3$$

22.  $x+y+z = 4$ ,  $xy+yz+zx = 1$ ,  $xyz = 2$  일 때,  $(xy+yz)(yz+zx)(zx+xy)$ 의 값을 구하면?

- ① 16      ② 8      ③ 4      ④ 2      ⑤ 1

해설

$$\begin{aligned} & (xy + yz)(yz + zx)(zx + xy) \text{ 을} \\ & xy + yz + zx = 1 \text{ 을 이용하여 변형하면} \\ & (xy + yz)(yz + zx)(zx + xy) \\ & = (1 - zx)(1 - xy)(1 - yz) \\ & = 1 - (xy + yz + zx) + (x^2yz + xy^2z + xyz^2) - (xyz)^2 \\ & = 1 - (xy + yz + zx) + xyz(x + y + z) - (xyz)^2 \\ & = 1 - 1 + 2 \cdot 4 - 4 \\ & = 4 \end{aligned}$$

※ 위에서 아래의 전개식을 이용하였다.

$$(x - a)(x - b)(x - c)$$

$$= x^3 - (a + b + c)x^2 + (ab + bc + ca)x - abc$$

23. 다음 식의 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수  $x$ 에 대하여 다음 식이 성립할 때,  $a_1 + a_2 + \dots + a_{10}$ 의 값은?

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)\cdots(x-10)} = \frac{a_1}{x-1} + \frac{a_2}{x-2} + \cdots + \frac{a_{10}}{x-10}$$

- ① 0      ② -1      ③ 1      ④ -10      ⑤ 10

해설

우변을 통분하여  $x$ 에 대한 내림차순으로 정리하면,

$$(우변) = \frac{(a_1 + a_2 + \cdots + a_{10})x^9 + \cdots}{(x-1)(x-2)\cdots(x-10)}$$

양변의 계수를 비교하면

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{10} = 0$$

24.  $\frac{2005^3 + 1}{2005 \times 2004 + 1}$  의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 2006

해설

$$\begin{aligned} 2005 &= x \text{ 로 놓으면} \\ (\text{준 식}) &= \frac{x^3 + 1^3}{x(x-1) + 1} \\ &= \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{x^2 - x + 1} \\ &= x + 1 \\ &= 2006 \end{aligned}$$

25. 모든 실수  $x$ 에 대하여 등식  $x^{100} - 1 = a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + \cdots + a_{100}(x-1)^{100}$ 이 성립할 때,  $a_0 + a_2 + a_4 + \cdots + a_{100} = 2^m + k$ 이다.  $m + k$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 98

해설

$x = 0$ 을 대입하면

$$a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + a_{100} = -1 \quad \textcircled{\text{①}}$$

$x = 2$ 를 대입하면

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{100} = 2^{100} - 1 \quad \textcircled{\text{②}}$$

$$\textcircled{\text{①}} + \textcircled{\text{②}}: 2(a_0 + a_2 + a_4 + \cdots + a_{100}) = 2^{100} - 2$$

$$\therefore a_0 + a_2 + a_4 + \cdots + a_{100} = 2^{99} - 1$$

$$\therefore m = 99, k = -1$$

므로  $m + k = 98$

26. 다항식  $f(x)$ 를  $\left(x - \frac{2}{3}\right)$ 로 나눌 때의 몫을  $Q(x)$ , 나머지를  $R$ 이라고 할 때, 다음 중  $f(x)$ 를  $3x - 2$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지는?

- ①  $Q(x), R$       ②  $3Q(x), R$       ③  $Q(x), 3R$   
④  $\frac{1}{3}Q(x), R$       ⑤  $Q(x), \frac{1}{3}R$

해설

$$\begin{aligned}f(x) &= \left(x - \frac{2}{3}\right) Q(x) + R \\&= 3\left(x - \frac{2}{3}\right) \cdot \frac{1}{3}Q(x) + R \\&= (3x - 2)\frac{1}{3}Q(x) + R\end{aligned}$$

이므로 구하는 몫과 나머지는

몫:  $\frac{1}{3}Q(x)$  나머지:  $R$

27. 자연수  $N = 5 \cdot 29^3 + 15 \cdot 29^2 + 15 \cdot 29 + 5$ 의 양의 약수의 개수는?

- ① 20 개      ② 40 개      ③ 60 개  
④ 80 개      ⑤ 100 개

해설

주어진  $N$ 의 값을 직접 계산하여 다시 소인수분해 하기는 너무 복잡하므로,

주어진 수들을 하나의 문자로 생각하여 5로 묶으면

$$N = 5(29^3 + 3 \cdot 29^2 + 3 \cdot 29 + 1)$$

$$= 5(29 + 1)^3$$

$$= 5 \cdot 30^3$$

$$= 5 \cdot (2 \cdot 3 \cdot 5)^3$$

$$= 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^4$$

따라서  $N$ 의 양의 약수의 개수는

$$(3+1)(3+1)(4+1) = 80$$

28.  $a + b = 1$  이고  $a^2 + b^2 = -1$  일 때,  $a^{2005} + b^{2005}$ 의 값은?

- ① -2      ② -1      ③ 0      ④ 1      ⑤ 2

해설

$b = 1 - a$  를  $a^2 + b^2 = -1$ 에 대입하여 정리하면

$$a^2 - a + 1 = 0 \quad (a+1)(a^2 - a + 1) = 0$$

$$a^3 + 1 = 0 \quad \therefore a^3 = -1$$

마찬가지 방법으로  $b^3 = -1$

$$a^{2005} + b^{2005} = (a^3)^{668} \cdot a + (b^3)^{668} \cdot b = a + b = 1$$

해설

$a^3, b^3$ 의 값을 다음과 같이 구해도 된다.

$$a^2 - a + 1 = 0 \text{에서 } a^2 = a - 1$$

$$a^3 = a^2 \cdot a = (a - 1) \cdot a = a^2 - a = -1$$

마찬가지 방법으로  $b^3 = -1$

29.  $x$ 의 다항식  $f(x)$ 가 임의의 실수  $u, v$ 에 대하여  $f(u)f(v) = f(u+v) + f(u-v)$ 가 성립할 때,  $f(3)$ 의 값은? (단,  $f(1) = 1$ 이라고 한다.)

- ① -1      ② 2      ③ -2      ④ 1      ⑤ 5

해설

$$\begin{aligned}f(u)f(v) &= f(u+v) + f(u-v) \text{ 가 } \\u, v \text{에 대한 항등식이므로 } \\u = 1, v = 0 \text{ 일 때도 이 등식이 성립한다.} \\∴ f(1)f(0) &= f(1) + f(1) \\f(1) = 1 \text{ 이므로 } f(0) &= 2 \\또, } u = v = 1 \text{ 일 때는} \\f(1)f(1) &= f(2) + f(0) ∴ f(2) = -1 \\∴ f(3) &= f(2+1) = f(2)f(1) - f(2-1) \\&= f(2)f(1) - f(1) = -1 - 1 \\&= -2\end{aligned}$$

30. 다항식  $f(x) = x^4 + ax + b$  가  $(x - 1)^2$  으로 나누어떨어지도록  $a, b$  의 값을 정할 때,  $a + b$  의 값을 구하면?

① 1      ② -1      ③ 3      ④ -4      ⑤ -3

해설

$$(i) f(x) = x^4 + ax + b = (x - 1)^2 Q(x)$$

$$f(1) = 1 + a + b = 0$$

$$\therefore b = -(a + 1)$$

$$(ii) f(x) = x^4 + ax - (a + 1) = (x - 1)^2 Q(x)$$

$$(x^4 - 1) + a(x - 1) = (x - 1)^2 Q(x)$$

$$(x - 1)(x^3 + x^2 + x + 1) + a(x - 1)$$

$$= (x - 1)^2 Q(x)$$

$$\therefore x^3 + x^2 + x + 1 + a = (x - 1)Q(x)$$

$$x = 1 \text{ 을 대입하면 } 4 + a = 0 \quad \therefore a = -4$$

$$b = -(a + 1) \text{ 에서 } b = 3$$

$$\therefore a + b = -1$$