

1. 포물선 $y = x^2 - x + 1$ 위의 점 중에서 직선 $y = x - 3$ 에의 거리가
최소인 점을 (a, b) 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하면?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

해설

직선 $y = x - 3$ 에 평행인 직선 $y = x + k$ 와
포물선 $y = x^2 - x + 1$ 과의 접점이 구하는 점이다.

$$x^2 - x + 1 = x + k \text{에서 } \frac{D}{4} = 1 - (1 - k) = 0$$

$$\therefore k = 0$$

이때, $x = 1, y = 1$ 으므로

구하는 점은 $(1, 1)$

$$\therefore a = 1, b = 1$$

$$\therefore a + b = 2$$

2. 두 원 $(x + 1)^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2 = 0$ 의 공통접선의 개수는?

- ① 0 개 ② 1 개 ③ 2 개 ④ 3 개 ⑤ 4 개

해설

$(x + 1)^2 + y^2 = 1$ 에서 이 원의 중심을 C_1 이라 하면 점 C_1 의 좌표는 $(-1, 0)$ 이고

반지름의 길이는 1이다.

$x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2 = 0$ 에서

$(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 16$ 이므로

이 원의 중심을 C_2 이라 하면

점 C_2 의 좌표는 $(3, 3)$ 이고

반지름의 길이는 4이다.

$\overline{C_1C_2} = 5$ 이고

두 원의 반지름의 길이는 1, 4이므로

두 원은 서로 외접하게 된다.

따라서 공통접선은 3개이다.

3. 평행이동 $f : (x, y) \rightarrow (x-1, y+3)$ 에 의하여 점 $(3, 1)$ 은 어떤 점으로 옮겨지는가?

- ① $(2, 4)$ ② $(4, 2)$ ③ $(2, -4)$
④ $(-2, 4)$ ⑤ $(4, -2)$

해설

f 는 x 축의 방향으로 -1 , y 축의 방향으로 $+3$ 만큼 평행이동하는 변환이므로 $(3-1, 1+3) = (2, 4)$ 로 옮겨진다.

4. 함수 $f(x)$ 가 $f(2x+1) = 3x+2$ 를 만족할 때, $f(3)$ 의 값을 구하면?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

해설

$$f(2x+1) = 3x+2 \text{ 에서 } 2x+1 = 3 \text{ 이므로}$$

$x = 1$ 을 대입하면

$$f(2 \cdot 1 + 1) = f(3) = 3 \cdot 1 + 2 = 5$$

5. 두 점 A(-2, 5), B(1, 1)과 y축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은?

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

해설

점 P의 좌표를 P(0, b)라 하면

$$\begin{aligned}\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 \\ &= [(0 - (-2))^2 + (b - 5)^2] \\ &\quad + [(0 - 1)^2 + (b - 1)^2] \\ &= 2b^2 - 12b + 31 \\ &= 2(b - 3)^2 + 13\end{aligned}$$

따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 은 $b = 3$

즉 점 P의 좌표가 P(0, 3)일 때, 최솟값 13을 갖는다.

6. 중심이 A(3, k)이고 x 축에 접하는 원 C_1 과 중심이 B(k, 3)이고 y 축에 접하는 원 C_2 에 대하여 두 원 C_1, C_2 가 서로 접할 때, 양수 k의 값을 구하면?

① $-1 + \sqrt{2}$ ② $-2 + 2\sqrt{2}$ ③ $\textcircled{3} -3 + 3\sqrt{2}$
 ④ $-4 + 4\sqrt{2}$ ⑤ $-5 + 5\sqrt{2}$

해설

중심이 A(3, k)이고 x 축에 접하는 원은 반지름의 길이가 k이므로

$$C_1 : (x - 3)^2 + (y - k)^2 = k^2$$

중심이 B(k, 3)이고 y 축에 접하는 원은 반지름의 길이가 k이므로

$$C_2 : (x - k)^2 + (y - 3)^2 = k^2$$

두 원의 중심 A, B 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(k - 3)^2 + (3 - k)^2} = \sqrt{2(k - 3)^2}$$

이 때, 두 원이 외접하려면 중심거리 \overline{AB} 가 두 원의 반지름의 길이의 합과 같아야 하므로

$$\sqrt{2(k - 3)^2} = 2k \text{ } \circ \text{ 식의 양변을 제곱하여 정리하면 } k^2 + 6k - 9 = 0$$

$\therefore k = -3 \pm 3\sqrt{2}$ 그런데 k는 양수이므로

$$k = -3 + 3\sqrt{2} (k = -3 - 3\sqrt{2} < 0)$$



7. 직선 $3x + 4y + a = 0$ 이 원 $x^2 + y^2 = 4$ 와 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 a 의 개수를 구하여라.

▶ 답:

개

▷ 정답: 19개

해설

직선이 원과 서로 다른 두 점에서 만나려면
원의 중심에서 직선까지의 거리(d) 보다
원의 반지름 (r) 이 크다.

$$d = \frac{|3 \times 0 + 4 \times 0 + a|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|a|}{5} < 2 = r$$

$$\frac{|a|}{5} < 2, |a| < 10, -10 < a < 10$$

$$a = -9, -8, -7, -6, \dots, 6, 7, 8, 9 \therefore 19 \text{개}$$

8. 집합 A, B, C, D 에서 다음 중 성립하지 않는 것은?

- ① $A \cap (A \cup B) = A$
- ② $A \cup (A \cap B) = A$
- ③ $(A - B) - C = A - (B \cup C)$
- ④ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- ⑤ $A \cap B = \emptyset, A \subset C, B \subset D \Rightarrow C \cap D = \emptyset$ 이다.

해설

⑤ 주어진 조건대로 벤다이어그램을 그려보면 다음과 같을 수 있다. $C \cap D \neq \emptyset$ 이므로 옳지 않다.



9. m 이 실수 일 때, $2m^2 + \frac{8}{m^2} - 2 \geq k$ 를 만족하는 k 의 최댓값을 구하시오.

(단, $m \neq 0$)

▶ 답:

▷ 정답: 6

해설

m 이 실수이고, $m \neq 0$ 으로 $m^2 > 0$ 이다.

$$\begin{aligned} \text{따라서, } 2m^2 + \frac{8}{m^2} - 2 &\geq 2\sqrt{2m^2 \cdot \frac{8}{m^2}} - 2 \\ &= 2\sqrt{16} - 2 = 8 - 2 = 6 \end{aligned}$$

해설

$(f \circ f)(-1) = f(-(-1)^2 + 3) = f(2) = 2 + 5 = 7$

$f^{-1}(2) = t$ 라 하면 $f(t) = 2$

그런데 $x + 5 \geq 5$ ($\because x \geq 0$) 이고

$-x^2 + 3 < 3$ ($\because x < 0$) 이므로 $-t^2 + 3 = 2$

파티시